

Geometria z Algebrą Liniową (semestr I)

Zbiór zadań

Uwagi proszę kierować na adres lukasz.kubat@mimuw.edu.pl

Spis treści

Oznaczenia i konwencje	ii
1 Układy równań liniowych (20 zadań)	1
2 Ciała (30 zadań)	4
3 Liczby zespolone (40 zadań)	9
4 Przestrzenie wektorowe (100 zadań)	16
5 Macierze (50 zadań)	31
6 Odwzorowania liniowe (100 zadań)	41
7 Funkcjonały i przestrzeń dualna (60 zadań)	64
8 Wyznacznik i macierz odwrotna (100 zadań)	73
Podręczniki, wykłady i zbiory zadań	92

Oznaczenia i konwencje

Rozdział ten służy zestawieniu (prawie) wszystkich użytych w tym zbiorze zadań oznaczeń (większość z nich jest standardowa). W przypadku braku wyjaśnienia danego oznaczenia w poniższym zestawieniu warto zajrzeć do zadania o numerze podanym w nawiasie.

\mathbb{P}	zbiór liczb pierwszych
\mathbb{N}	zbiór liczb naturalnych (umawiamy się, że $0 \notin \mathbb{N}$; ponadto $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$)
\mathbb{Z}	pierścień liczb całkowitych
\mathbb{Z}_n	pierścień reszt modulo n (2.13)
\mathbb{Q}	ciało liczb wymiernych
\mathbb{R}	ciało liczb rzeczywistych
\mathbb{C}	ciało liczb zespolonych
\mathbb{F}_p	ciało reszt modulo p
\mathbb{H}	algebra z dzieleniem (rzeczywistych) kwaternionów (3.39)
\mathbb{O}	alternatywna algebra z dzieleniem (rzeczywistych) oktonionów (3.40)
\mathbb{T}	półciało tropikalne (2.30)
Δ_n	sympleks otwarty w przestrzeni \mathbb{R}^n (4.3)
S_n	grupa permutacji zbioru $\{1, \dots, n\}$
$\text{sgn } \sigma$	znak permutacji $\sigma \in S_n$
$\min S$	minimum zbioru $\emptyset \neq S \subseteq \mathbb{R}$
$\max S$	maksimum zbioru $\emptyset \neq S \subseteq \mathbb{R}$
$ S $	moc zbioru S
$\mathcal{P}(S)$	rodzina wszystkich podzbiorów zbioru S
$\mathcal{F}(S)$	rodzina wszystkich skończonych podzbiorów zbioru S
$\text{Map}(S, T)$	zbiór odwzorowań z S w T (oznaczany też jako T^S)
id_S	odwzorowanie identycznościowe zbioru S (czasem piszemy też id)
l^2	przestrzeń sumowalnych z kwadratem ciągów rzeczywistych (7.39)
l^∞	przestrzeń ograniczonych ciągów rzeczywistych
$C(X)$	przestrzeń rzeczywistych funkcji ciągłych na X (dla nas $\emptyset \neq X \subseteq \mathbb{C}$)
$C^\infty(\mathbb{R})$	przestrzeń rzeczywistych funkcji gładkich na \mathbb{R} (6.7)
$f^{(n)}$	n -ta pochodna funkcji f (np. $f^{(0)} = f$, $f^{(1)} = f'$ oraz $f^{(2)} = f''$)
B_n	n -ta liczba Bernoulliego (8.27)
E_n	n -ta liczba Eulera (8.26)
F_n	n -ta liczba Fibonacciego (8.24)
$o(a)$	rząd elementu $a \in G$ w grupie G (2.22)
$a \mid b$	liczba $a \in \mathbb{Z}$ dzieli liczbę $b \in \mathbb{Z}$ (tzn. $b \in a\mathbb{Z}$; gdy a nie dzieli b , to piszemy $a \nmid b$)
$\text{gcd}(a, b)$	największy wspólny dzielnik liczb $a, b \in \mathbb{Z}$ spełniających $(a, b) \neq (0, 0)$
$a \bmod n$	reszta z dzielenia liczby $a \in \mathbb{Z}$ przez $n \in \mathbb{N}$
φ	funkcja φ Eulera (8.53)
$[x]$	część całkowita liczby $x \in \mathbb{R}$, tzn. $[x] = \max\{n \in \mathbb{Z} : n \leq x\}$
K^\times	grupa multiplikatywna ciała K , tzn. $K^\times = K \setminus \{0\}$
$K(S)$	rozszerzenie podciała $K \subseteq L$ o zbiór $S \subseteq L$ (2.17)
$K(a_1, \dots, a_n)$	rozszerzenie podciała $K \subseteq L$ o skończony zbiór $\{a_1, \dots, a_n\} \subseteq L$ (2.17)

$\text{char } K$	charakterystyka ciała K (2.21)
$K[x_1, \dots, x_n]$	pierścień wielomianów zmiennych x_1, \dots, x_n o współczynnikach w ciele K
$K(x)$	ciało funkcji wymiernych zmiennej x o współczynnikach w ciele K
$K[[x]]$	pierścień szeregów formalnych zmiennej x o współczynnikach w ciele K (6.7)
$K((x))$	ciało szeregów Laurenta zmiennej x o współczynnikach w ciele K (2.12)
$\deg f$	stopień wielomianu $f \in K[x]$ (umawiamy się, że $\deg f = -\infty$ dla $f = 0$)
$\text{Re } z$	część rzeczywista liczby zespolonej $z \in \mathbb{C}$
$\text{Im } z$	część urojona liczby zespolonej $z \in \mathbb{C}$
$\text{Arg } z$	argumenty liczby zespolonej $0 \neq z \in \mathbb{C}$ (umawiamy się, że $0 \leq \text{Arg } z < 2\pi$)
$\bar{z}, \bar{q}, \bar{x}$	sprzężenie liczby $z \in \mathbb{C}$, kwaternionu $q \in \mathbb{H}$, oktonionu $x \in \mathbb{O}$ (3.39, 3.40)
$ z , q , x $	moduł liczby $z \in \mathbb{C}$, kwaternionu $q \in \mathbb{H}$, oktonionu $x \in \mathbb{O}$ (3.39, 3.40)
$M_{n,m}(K)$	przestrzeń macierzy $n \times m$ o wyrazach w ciele K
$M_n(K)$	algebra macierzy $n \times n$ o wyrazach w ciele K
$\text{GL}_n(K)$	grupa odwracalnych macierzy $n \times n$ o wyrazach w ciele K
$C(A)$	centralizator macierzy $A \in M_n(K)$ (5.33)
$\text{diag}(x_1, \dots, x_n)$	macierz diagonalna o elementach $x_1, \dots, x_n \in K$ na diagonalu
$\text{diag}(A_1, \dots, A_n)$	macierz blokowo-diagonalna z macierzami A_1, \dots, A_n na diagonalu
δ_{ij}	symbol (delta) Kroneckera ($\delta_{ij} = 1$ gdy $i = j$ oraz $\delta_{ij} = 0$ gdy $i \neq j$)
ε_{abc}	symbol Levi-Civity (3.40, 5.47)
I_n	macierz identycznościowa $n \times n$ (czasem piszemy też I)
E_{ij}	jedynki macierzowe (5.16)
$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$	macierze Pauliego (5.47)
\bar{A}	sprzężenie zespolone macierzy $A \in M_{n,m}(\mathbb{C})$ (5.42)
A^t	transpozycja macierzy $A \in M_{n,m}(K)$
A^h	sprzężenie hermitowskie macierzy $A \in M_{n,m}(\mathbb{C})$ (5.42)
A^{-1}	macierz odwrotna do macierzy $A \in \text{GL}_n(K)$
$\text{adj } A$	macierz dołączona macierzy $A \in M_n(K)$ (8.65)
$\exp A$	eksponenta macierzy $A \in M_n(\mathbb{C})$ (5.45)
$\text{rank } A$	rzęd macierzy $A \in M_{n,m}(K)$
$\det A$	wyznacznik macierzy $A \in M_n(K)$ (oznaczany też jako $ A $)
$\text{tr } A$	śląd macierzy $A \in M_n(K)$
$\text{pf } A$	pfaffian macierzy antysymetrycznej $A \in M_{2n}(K)$ (8.99)
χ_A	wielomian charakterystyczny macierzy $A \in M_n(K)$ (8.56)
$[A, B]$	komutator macierzy $A, B \in M_n(K)$ (5.29)
$\{A, B\}$	antykomutator macierzy $A, B \in M_n(K)$ (5.47)
$A \otimes B$	iloczyn Kroneckera macierzy $A \in M_{p,q}(K)$ oraz $B \in M_{r,s}(K)$ (5.48)
$A \oplus B$	suma Kroneckera macierzy $A \in M_n(K)$ oraz $B \in M_m(K)$ (5.48)
$V(x_1, \dots, x_n)$	wyznacznik Vandermonde'a elementów $x_1, \dots, x_n \in K$ (8.36)
$W(f_1, \dots, f_n)$	wyznacznik Wrońskiego funkcji $f_1, \dots, f_n \in C^\infty(\mathbb{R})$ (8.51)
$\lambda \vdash m$	partycja $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ liczby $m \in \mathbb{N}_0$ (8.48)
$s_\lambda(x_1, \dots, x_n)$	wielomian Schura partycji $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ (8.48)
$e_k(x_1, \dots, x_n)$	k -ty elementarny wielomian symetryczny (8.48)
$h_k(x_1, \dots, x_n)$	k -ty zupełny jednorodny wielomian symetryczny (8.48)
$p_k(x_1, \dots, x_n)$	suma k -tych potęg elementów $x_1, \dots, x_n \in K$ (8.46)

$\text{Supp } f$	nośnik funkcji $f \in \text{Map}(X, K)$ (4.12)
KX	przestrzeń funkcji o skończonym nośniku (oznaczana też jako $K^{(X)}$) (4.12)
$\text{Lat}(V)$	rodzina (krata) podprzestrzeni przestrzeni V (4.30, 7.40)
$\text{Lat}_0(V)$	rodzina (krata) skończenie wymiarowych podprzestrzeni przestrzeni V (4.99)
$\text{Con}(V)$	rodzina (krata) kongruencji na przestrzeni V (4.30)
$V_1 + \dots + V_n$	suma algebraiczna podprzestrzeni V_1, \dots, V_n
$V_1 \times \dots \times V_n$	iloczyn prosty (produkt) przestrzeni V_1, \dots, V_n
$V_1 \oplus \dots \oplus V_n$	suma prosta (koprodukt) przestrzeni V_1, \dots, V_n
$\sum_{i \in I} V_i$	suma algebraiczna rodziny podprzestrzeni $(V_i)_{i \in I}$
$\prod_{i \in I} V_i$	iloczyn prosty (produkt) rodziny przestrzeni $(V_i)_{i \in I}$
$\bigoplus_{i \in I} V_i$	suma prosta (koprodukt) rodziny przestrzeni $(V_i)_{i \in I}$
V/ρ	iloraz przestrzeni V przez kongruencję ρ (4.30)
V/U	iloraz przestrzeni V przez podprzestrzeń U (4.30)
$[v]$	klasa abstrakcji wektora $v \in V$ względem kongruencji ρ (4.30)
$v + U$	warstwa wektora $v \in V$ względem podprzestrzeni $U \subseteq V$ (4.30)
$\text{Lin}(S)$	podprzestrzeń rozpięta (generowana) przez zbiór S
$\dim V$	wymiar przestrzeni V
$\text{codim } U$	kowymiar podprzestrzeni U w przestrzeni V (4.64, 6.71)
$\text{Hom}(U, V)$	przestrzeń odwzorowań liniowych (homomorfizmów) z U w V
$\text{End}(V)$	algebra endomorfizmów przestrzeni V
$\text{Aut}(V)$	grupa automorfizmów przestrzeni V
f^n	n -krotne złożenie endomorfizmu $f \in \text{End}(V)$ (gdy $n = 0$, to $f^n = \text{id}_V$)
$f_1 \oplus \dots \oplus f_n$	suma prosta homomorfizmów $f_i \in \text{Hom}(U_i, V_i)$ dla $1 \leq i \leq n$ (7.58)
$M_{AB}(f)$	macierz homomorfizmu $f \in \text{Hom}(U, V)$ w bazach $A \subseteq U$ oraz $B \subseteq V$
$M_B(f)$	macierz endomorfizmu $f \in \text{End}(V)$ w bazie $B \subseteq V$
st	baza standardowa (kanoniczna) przestrzeni K^n
$\text{Im } f$	obraz homomorfizmu $f \in \text{Hom}(U, V)$
$\text{Ker } f$	jądro homomorfizmu $f \in \text{Hom}(U, V)$
$\text{Coker } f$	kojądro homomorfizmu $f \in \text{Hom}(U, V)$ (6.31)
$\text{rank } f$	rzęd homomorfizmu $f \in \text{Hom}(U, V)$
$\det f$	wyznacznik endomorfizmu $f \in \text{End}(V)$
$\text{tr } f$	śląd endomorfizmu $f \in \text{End}(V)$
$\text{ind } f$	indeks homomorfizmu $f \in \text{Hom}(U, V)$ (6.80)
$B_n(C)$	przestrzeń n -tych brzegów kompleksu łańcuchowego C (6.77)
$Z_n(C)$	przestrzeń n -tych cykli kompleksu łańcuchowego C (6.77)
$H_n(C)$	przestrzeń n -tych homologii kompleksu łańcuchowego C (6.77)
$\chi(C)$	charakterystyka Eulera–Poincarégo kompleksu łańcuchowego C (6.79)
$\text{Hom}(U, V; W)$	przestrzeń odwzorowań dwuliniowych z $U \times V$ w W (6.85)
$\text{Hom}_a^2(U, V)$	przestrzeń antysymetrycznych odwzorowań dwuliniowych z $U \times U$ w V (6.94)
$U \otimes V$	iloczyn tensorowy przestrzeni U, V (6.84)
$u \otimes v$	iloczyn tensorowy wektorów $u \in U$ oraz $v \in V$ (tensor prosty) (6.84)
$f \otimes g$	iloczyn tensorowy homomorfizmów $f \in \text{Hom}(U_1, V_1)$ oraz $g \in \text{Hom}(U_2, V_2)$ (6.89)
$\text{rank } t$	rzęd tensora $t \in U \otimes V$ (6.93)
$\Lambda^2 V$	(druga) potęga zewnętrzna przestrzeni V (6.94)

$u \wedge v$	iloczyn zewnętrzny wektorów $u, v \in V$ (2-wektor prosty) (6.94)
$\Lambda^2 f$	(druga) potęga zewnętrzna homomorfizmu $f \in \text{Hom}(U, V)$ (6.96)
$\Lambda^n(m)$	zbiór $\{(j_1, \dots, j_n) \in \mathbb{N}^n : 1 \leq j_1 < \dots < j_n \leq m\}$ (6.96, 8.88)
$\text{rank } \omega$	rzęd 2-wektora $\omega \in \Lambda^2 V$ (6.100)
$\ v\ $	norma wektora $v \in V$ (7.39, 8.34)
$\langle u, v \rangle$	iloczyn skalarny wektorów $u, v \in \mathbb{C}^n$ (8.91)
$\langle \omega, \eta \rangle$	iloczyn skalarny 2-wektorów $\omega, \eta \in \Lambda^2 \mathbb{C}^n$ (8.91)
V^*	przestrzeń dualna (sprzężona) przestrzeni V
$V^{\mathbb{C}}$	kompleksyfikacja rzeczywistej przestrzeni liniowej V (7.17)
f^*	odwzorowanie dualne (sprzężone) homomorfizmu $f \in \text{Hom}(U, V)$
$(e_i^*)_{i \in I}$	rodzina funkcjonałów sprzężonych do bazy $(e_i)_{i \in I}$ przestrzeni V
V^{**}	przestrzeń bidualna (bisprzężona) przestrzeni V (7.59)
f^{**}	odwzorowanie bidualne (bisprzężone) homomorfizmu $f \in \text{Hom}(U, V)$ (7.59)

1 Układy równań liniowych

Zadanie 1.1. Wyznacz zredukowaną postać schodkową macierzy:

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 4 \\ 5 & 7 & 1 \\ 3 & 4 & -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & -1 \\ 5 & -1 & 1 & 2 \\ 7 & 8 & 1 & -7 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Zadanie 1.2. Wyznacz zredukowaną postać schodkową macierzy:

$$\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & t \\ -1 & 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & t \\ 2 & 3 & t & 4 \\ 1 & 2 & 5 & -3 \end{bmatrix}$$

w zależności od parametrów $a, b \in \mathbb{R}$ oraz $t \in \mathbb{R}$.

Zadanie 1.3. Rozwiąż układy równań:

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = -2 \\ 3x + 2y + 4z = -3, \end{cases} \quad \begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 4x + 5y + 6z = 1 \\ 7x + 8y + 9z = 1, \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 2 \\ -x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 = -1 \\ 2x_1 + 7x_2 - x_3 + 9x_4 = 8 \\ 3x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 4x_4 = -6. \end{cases}$$

Zadanie 1.4. Opisz wszystkie trójki $(x, y, z) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ spełniające układ równań

$$\begin{cases} 5x + 6y + 8z = 1 \\ 6x - 11y + 7z = 9. \end{cases}$$

Zadanie 1.5. Rozważmy układ równań

$$\begin{cases} 3x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 6x_4 + 4x_5 = 4 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 + 3x_5 = 1 \\ 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + x_5 = 4 \\ x_2 + 2x_4 + 2x_5 = -1. \end{cases}$$

- (1) Zapisz powyższy układ równań w postaci macierzowej.
- (2) Sprawdź, czy piętko $(1, 1, 1, 0, -1)$ jest rozwiązaniem tego układu równań.

Zadanie 1.6. Znajdź rozwiązania układów równań liniowych zadanych macierzami:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -3 & -3 \\ 2 & 4 & 1 & 1 \end{array} \right], \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & -5 & 7 \\ 3 & 4 & -9 & 9 \\ 5 & 2 & -8 & 8 \\ 8 & 7 & -1 & 12 \end{array} \right], \quad \left[\begin{array}{ccccc|c} 3 & 9 & -2 & 17 & -13 & 16 \\ 2 & 7 & 0 & 7 & -2 & 11 \\ 2 & 5 & -2 & 13 & -13 & 11 \\ 1 & 3 & -1 & 5 & -4 & 5 \end{array} \right].$$

Zadanie 1.7. Wyznacz wartości parametru $a \in \mathbb{R}$, dla których układ równań

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = a \\ x_1 + ax_2 + x_3 + ax_4 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 2 \end{cases}$$

jest niesprzeczny.

Zadanie 1.8. Dla jakich $a \in \mathbb{R}$ układ równań

$$\begin{cases} ax + y + z = a - 1 \\ x + ay + z = 1 - a \\ x + y + az = 0 \end{cases}$$

jest oznaczony/nieoznaczony/sprzeczny?

Zadanie 1.9. Wyznacz rozwiązania układów równań liniowych, danych przez macierze:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2b \\ 1 & a & 1 & 2b \\ a & 1 & 1 & b \end{array} \right], \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & a & a^2 & 1 \\ 1 & b & b^2 & 0 \\ 1 & c & c^2 & 0 \end{array} \right], \quad \left[\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & a \\ 1 & b & 1 & b \\ 1 & 1 & c & c \end{array} \right],$$

w zależności od parametrów $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Zadanie 1.10. Niech $n \geq 3$. Rozwiąż układ równań

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_i + x_{i+1} + x_{i+2} = 0 \quad (1 \leq i \leq n-2) \\ x_{n-1} + x_n = 0. \end{cases}$$

Zadanie 1.11. Opisz wszystkie wielomiany $f \in \mathbb{R}[x]$ spełniające $\deg f \leq 3$ oraz:

$$f(-2) = 2, \quad f(-1) = 1, \quad f(1) = 5, \quad f(2) = -2.$$

Zadanie 1.12. Znajdź układ równań liniowych nad \mathbb{R} , którego wszystkie rozwiązania są postaci $(-2t + 3, -t + 2, t + 1, 2t)$ dla $t \in \mathbb{R}$.

Zadanie 1.13. Czy układy równań liniowych zadane przez macierze

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -2 & 2 \\ -1 & -2 & -1 & -1 \\ -1 & -5 & 8 & -3 \end{array} \right] \quad \text{oraz} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 4 & 0 \\ -1 & -1 & -4 & 1 \end{array} \right]$$

są równoważne?

Zadanie 1.14. Niech U będzie układem trzech równań liniowych (nad \mathbb{R}) o czterech niewiadomych. Załóżmy, że układ równań V powstaje z U przez zastąpienie każdego równania w U sumą dwóch pozostałych. Zbadaj czy układy równań U oraz V są zawsze równoważne.

2 Ciała

Zadanie 2.1. Czy działanie $*$ określone w zbiorze liczb wymiernych \mathbb{Q} jako:

- (1) $a * b = a - b$ (odejmowanie),
- (2) $a * b = \frac{a+b}{2}$ (średnia arytmetyczna),
- (3) $a * b = a + ab + b$

jest łączne, przemienne, posiada element neutralny? W przypadku gdy $*$ posiada element neutralny, dla jakich $x \in \mathbb{Q}$ istnieje element odwrotny?

Zadanie 2.2. Niech $K = \{0, 1, a, b\}$ będzie zbiorem 4-elementowym. Uzupełnij tabele

+	0	1	a	b
0				
1				
a				
b				

oraz

·	0	1	a	b
0				
1				
a				
b				

tak, aby trójka $(K, +, \cdot)$ była ciałem, w którym 0 oraz 1 są elementami neutralnymi, odpowiednio, dodawania oraz mnożenia. Na ile sposobów można to zrobić?

Zadanie 2.3. Niech K będzie ciałem oraz $a, b \in K$. Stosując aksjomaty ciała pokaż, że:

- (1) $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$ oraz $-(-a) = a$.
- (2) $(-a)b = a(-b) = -ab$ oraz $(-a)(-b) = ab$.
- (3) Jeśli $ab = 0$, to $a = 0$ lub $b = 0$.

Zadanie 2.4. Pokaż, że przemienność dodawania wynika z pozostałych aksjomatów ciała.

Zadanie 2.5. Wykaż, że w każdym ciele K spełniającym $|K| = 4$ zachodzi $1 + 1 = 0$.

Zadanie 2.6. Dowiedz, że dla dowolnego ciała K następujące warunki są równoważne:

- (1) $1 + 1 = 0$.
- (2) $a + a = 0$ dla dowolnego $a \in K$.
- (3) $a + a = 0$ dla pewnego $0 \neq a \in K$.

Zadanie 2.7. Czy trójka $(\mathbb{Q}, +, \circ)$ jest ciałem, gdzie $+$ to zwykłe dodawanie w \mathbb{Q} , zaś $a \circ b = a + ab + b$ dla $a, b \in \mathbb{Q}$? Czy istnieje takie „dodawanie” \oplus w zbiorze \mathbb{Q} , że trójka $(\mathbb{Q}, \oplus, \circ)$ jest ciałem?

Zadanie 2.8. Czy istnieje taki zbiór K oraz trzy działania \oplus, \odot, \otimes w K , że (K, \oplus) jest grupą (z elementem neutralnym $0 \in K$) oraz (K^\times, \odot) i (K^\times, \otimes) są grupami (gdzie $K^\times = K \setminus \{0\}$), natomiast tylko jedna z trójek (K, \oplus, \odot) , (K, \oplus, \otimes) jest ciałem?

Zadanie 2.9. Mówimy, że ciało K jest *algebraicznie domknięte*, gdy dowolny wielomian $f \in K[x]$ spełniający $\deg f > 0$ ma pierwiastek w K , tzn. $f(a) = 0$ dla pewnego $a \in K$.

- (1) Udowodnij, że każde ciało algebraicznie domknięte jest nieskończone.
- (2) Wskaż przykład nieskończonego ciała, które nie jest algebraicznie domknięte.

Zadanie 2.10. W zbiorze $K = \{x \in \mathbb{R} : x < 1\}$ określmy działania \oplus oraz \odot wzorami

$$x \oplus y = x + y - xy \quad \text{oraz} \quad x \odot y = 1 - e^{\ln(1-x)\ln(1-y)}.$$

Dowiedź, że trójka (K, \oplus, \odot) jest ciałem.

Zadanie 2.11. Wprowadźmy w zbiorze $K = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ działania \oplus oraz \odot formułami

$$\begin{aligned} (x_1, y_1) \oplus (x_2, y_2) &= (x_1 + x_2, y_1 + y_2), \\ (x_1, y_1) \odot (x_2, y_2) &= (x_1x_2 + ay_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1). \end{aligned}$$

Dla jakich liczb $a \in \mathbb{R}$ trójka (K, \oplus, \odot) jest ciałem?

Zadanie 2.12. Niech K będzie ciałem oraz

$$L = \{f \in \text{Map}(\mathbb{Z}, K) : \text{istnieje takie } N = N(f) \in \mathbb{Z}, \text{ że } f(n) = 0 \text{ dla } n < N\}.$$

Zdefiniujmy dodawanie i mnożenie w L wzorami

$$(f + g)(n) = f(n) + g(n) \quad \text{oraz} \quad (f \cdot g)(n) = \sum_{p+q=n} f(p)g(q).$$

Uzasadnij, że trójka $(L, +, \cdot)$ jest ciałem.

Uwaga. Element $f \in L$ identyfikujemy zazwyczaj z szeregiem formalnym zmiennej x postaci

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f_n x^n = \sum_{n \geq N(f)} f_n x^n, \quad \text{gdzie } f_n = f(n) \text{ dla } n \in \mathbb{Z}.$$

Ciało L (z wprowadzonymi powyżej działaniami) oznaczamy wtedy symbolem $K((x))$ i nazywanym *ciałem szeregów Laurenta* zmiennej x o współczynnikach w ciele K .

Zadanie 2.13. Niech $n \geq 2$. W zbiorze $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\} \subseteq \mathbb{Z}$ definiujemy działania \oplus oraz \odot wzorami

$$a \oplus b = (a + b) \bmod n \quad \text{oraz} \quad a \odot b = (a \cdot b) \bmod n$$

(działania $+$ oraz \cdot to zwykle dodawanie i mnożenie liczb całkowitych; zapis $a \bmod n$ oznacza resztę z dzielenia liczby $a \in \mathbb{Z}$ przez n). Wyznacz te liczby n , dla których trójka $(\mathbb{Z}_n, \oplus, \odot)$ jest ciałem.

Zadanie 2.14. Pokaż, że każdy niezerowy element ciała \mathbb{F}_7 jest postaci 3^n dla pewnego $n \in \mathbb{N}$. Czy każdy niezerowy element ciała \mathbb{F}_{11} też jest tej postaci? Jeśli nie, to czy istnieje taki element $a \in \mathbb{F}_{11}$, że $\mathbb{F}_{11}^\times = \{a^n : n \in \mathbb{N}\}$? Jeżeli istnieje takie a , to ile jest elementów w \mathbb{F}_{11} o tej własności co a ?

Zadanie 2.15. Niech $p \in \mathbb{P}$. Rozwiąż układ równań

$$\begin{cases} 5x + 3y = 4 \\ 3x + 6y = 1 \end{cases}$$

w ciele \mathbb{F}_p .

Zadanie 2.16. Załóżmy, że układ równań liniowych U o współczynnikach całkowitych ma dla dowolnej liczby $p \in \mathbb{P}$ dokładnie jedno rozwiązanie w ciele \mathbb{F}_p . Czy układ równań U posiada rozwiązanie w pierścieniu \mathbb{Z} ?

Zadanie 2.17. Udowodnij, że:

- (1) gdy $(K_i)_{i \in I}$ jest rodziną podciała ciała L , to $\bigcap_{i \in I} K_i$ jest podciałem ciała L .
- (2) gdy K jest podciałem ciała L oraz $S \subseteq L$, to istnieje najmniejsze (w sensie inkluzji) podciało ciała L zawierające K oraz S .

Uwaga. Podciało z punktu (2) oznaczamy symbolem $K(S)$ i nazywamy *rozszerzeniem ciała K o zbiór S* (lub *podciałem generowanym nad K przez zbiór S*). Gdy zbiór S jest skończony, np. $S = \{a_1, \dots, a_n\}$, to piszemy $K(a_1, \dots, a_n) = K(S)$.

Zadanie 2.18. Uzasadnij, że zbiór K jest podciałem ciała \mathbb{R} , gdy:

- (1) $K = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$.
- (2) $K = \{a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} : a, b, c \in \mathbb{Q}\}$.
- (3) $K = \{a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} : a, b, c, d \in \mathbb{Q}\}$.

Czy w każdym z punktów (1), (2) oraz (3) prawdą jest, że $K = \mathbb{Q}(a)$ dla pewnego $a \in \mathbb{R}$?

Zadanie 2.19. Pokaż, że ciało \mathbb{R} posiada nieskończenie wiele różnych podciał.

Zadanie 2.20. Rozwiąż równania w podanych ciałach:

- (1) $4x + 3 = 0$ w $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_3, \mathbb{F}_5, \mathbb{F}_7, \mathbb{F}_{13}$.
- (2) $x^2 = 2$ w $\mathbb{F}_5, \mathbb{F}_7, \mathbb{Q}, \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \mathbb{Q}(\sqrt{3})$.
- (3) $x^2 + x + 1 = 0$ w $\mathbb{F}_3, \mathbb{F}_7, \mathbb{Q}(i\sqrt{3}), \mathbb{R}, \mathbb{C}$.
- (4) $3tx + 5t - 2 = 0$ w $\mathbb{F}_2(t), \mathbb{F}_3(t), \mathbb{F}_5(t), \mathbb{Q}(t), \mathbb{C}(t)$.

Zadanie 2.21. Załóżmy, że K jest ciałem.

- (1) Udowodnij, że $n \cdot 1 \neq 0$ dla dowolnego $n \in \mathbb{N}$ ($n \cdot 1$ oznacza sumę n egzemplarzy elementu $1 \in K$) albo $p \cdot 1 = 0$ dla pewnej, jednoznacznie wyznaczonej, liczby $p \in \mathbb{P}$. W pierwszym przypadku piszemy $\text{char } K = 0$, zaś w drugim $\text{char } K = p$. Liczbę $\text{char } K$ nazywamy *charakterystyką* ciała K . W szczególności gdy ciało K jest skończone, to $\text{char } K > 0$.
- (2) Gdy $|K| = q < \infty$ oraz $0 \neq a \in K$, to $a^n = 1$ dla pewnego $n \in \mathbb{N}$. Uzasadnij, że gdy n jest najmniejszą liczbą naturalną o tej własności, to $n \mid q - 1$.

Zadanie 2.22. Załóżmy, że G jest skończoną podgrupą grupy multiplikatywnej K^\times ciała K . Rząd elementu $a \in G$ definiujemy jako

$$o(a) = \inf\{n \in \mathbb{N} : a^n = 1\}.$$

- (1) Pokaż, że gdy rzędy elementów $a, b \in G$ są względnie pierwsze, to $o(ab) = o(a)o(b)$.
- (2) Dowiedź, że gdy $m = \max\{o(a) : a \in G\}$, to każda z liczb $o(a)$ dla $a \in G$ dzieli m .
- (3) Wywnioskuj z punktu (2), że każdy element $a \in G$ jest pierwiastkiem wielomianu $x^m - 1 \in K[x]$. Następnie uzasadnij, że $m = |G|$ oraz, że $G = \{a^j : 0 \leq j < m\}$ dla pewnego $a \in G$.

Uwaga. Powyższe zadanie dowodzi, że skończona podgrupa grupy multiplikatywnej ciała jest *cykliczna*. W szczególności grupa multiplikatywna ciała skończonego jest cykliczna.

Zadanie 2.23. Załóżmy, że K jest ciałem charakterystyki $p > 0$.

- (1) Dowiedź, że $(a + b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n}$ dla dowolnych $a, b \in K$ oraz $n \geq 1$.
- (2) Wywnioskuj z punktu (1), że odwzorowanie $F: K \rightarrow K$ dane wzorem $F(x) = x^p$ jest *morfizmem ciał*, tzn. spełnia $F(a + b) = F(a) + F(b)$ oraz $F(ab) = F(a)F(b)$ dla dowolnych $a, b \in K$ i ponadto $F(0) = 0$ oraz $F(1) = 1$.
- (3) Uzasadnij, że odwzorowanie F z punktu (2) jest iniektywne. W szczególności gdy ciało K jest skończone, to F jest bijekcją oraz $K = K^p = \{a^p : a \in K\}$.
- (4) Wskaż przykład ciała K , dla którego $K \neq K^p$, tzn. odwzorowanie F z punktu (2) nie jest surjektywne.

Uwaga. Odwzorowanie F nazywane jest *morfizmem Frobeniusa*.

Zadanie 2.24. Niech K będzie ciałem. Załóżmy, że $p \in \mathbb{P}$ i rozważmy odwzorowanie $F: K \rightarrow K$ dane wzorem $F(x) = x^p$. Wiemy (skąd?), że gdy $\text{char } K = p$, to F jest iniekcją. Dla jakich liczb $p \in \mathbb{P}$ prawdziwa jest implikacja odwrotna?

Zadanie 2.25. Pokaż, że żaden właściwy podzbiór zbioru \mathbb{Q} nie jest podciałem ciała \mathbb{Q} .

Zadanie 2.26. Mówimy, że ciało K jest *proste*, gdy K nie zawiera podciał właściwych. Opisz wszystkie ciała proste.

Zadanie 2.27. Załóżmy, że K jest ciałem skończonym. Wykaż, że dla dowolnego $x \in K$ istnieją takie $a, b \in K$, że $x = a^2 + b^2$ (tzn. x jest sumą dwóch kwadratów).

Zadanie 2.28. Udowodnij, że dla ciała K następujące warunki są równoważne:

- (1) $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$ dla pewnego $n \geq 1$ oraz $x_1, \dots, x_n \in K$ nie wszystkich równych zeru.
- (2) $\sum_{i=1}^n x_i^2 = -1$ dla pewnego $n \geq 1$ oraz $x_1, \dots, x_n \in K$.

Wykaż ponadto, że gdy $\text{char } K \neq 2$ oraz K spełnia (1) lub (2), to dla dowolnego $x \in K$ istnieją takie $n \geq 1$ oraz $x_1, \dots, x_n \in K$, że $x = \sum_{i=1}^n x_i^2$ (tzn. każdy element ciała K jest sumą kwadratów).

Zadanie 2.29. Mówimy, że ciało K jest *porządkowalne*, gdy istnieje taki podzbiór $P \subseteq K$ (nazywany *stożkiem dodatnim* ciała K), że: $P + P \subseteq P$ (tzn. $a, b \in P \implies a + b \in P$), $P \cdot P \subseteq P$ (tzn. $a, b \in P \implies a \cdot b \in P$), $K^\times = P \cup (-P)$ oraz $P \cap (-P) = \emptyset$, gdzie $-P = \{-a : a \in P\}$.

- (1) Uzasadnij, że podciało ciała porządkowalnego jest porządkowalne.
- (2) Dowiedz, że każde ciało porządkowalne K spełnia $\text{char } K = 0$. W szczególności żadne ciało skończone nie jest porządkowalne.
- (3) Czy ciało \mathbb{R} jest porządkowalne? A ciało \mathbb{C} ?
- (4) Udowodnij, że ciało K jest porządkowalne wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje taki porządek liniowy \leq w K , że $a \leq b \implies a + c \leq b + c$ oraz $0 \leq a, b \implies 0 \leq a \cdot b$ dla dowolnych $a, b, c \in K$.

Zadanie 2.30 (półciało tropikalne). Niech $\mathbb{T} = \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$. Zdefiniujmy w zbiorze \mathbb{T} dodawanie \oplus oraz mnożenie \odot wzorami

$$x \oplus y = \max\{x, y\} \quad \text{oraz} \quad x \odot y = x + y.$$

Gdy $x, y \in \mathbb{R}$, to prawe strony powyższych wyrażeń oznaczają zwykle maksimum oraz sumę liczb rzeczywistych. Gdy zaś x lub y jest równe $-\infty$, to wynik dodawania \oplus oraz mnożenia \odot pozostaje w zgodzie z intuicyjną interpretacją symbolu $-\infty$ (doprecyzuj znaczenie tego stwierdzenia).

- (1) Które z aksjomatów ciała spełnia trójka $(\mathbb{T}, \oplus, \odot)$? Przedyskutuj szczegółowo wszystkie warunki. W szczególności wyznacz elementy neutralne działań \oplus i \odot oraz, o ile istnieje, element przeciwny/odwrotny do $x \in \mathbb{T}$.
- (2) Wiemy, że każda prosta na płaszczyźnie \mathbb{R}^2 jest opisana równaniem $ax + by = c$ dla pewnych $a, b, c \in \mathbb{R}$. Czym, geometrycznie, jest na „płaszczyźnie tropikalnej” \mathbb{T}^2 „prosta tropikalna” dana równaniem $a \odot x \oplus b \odot y = c$, gdzie $a, b, c \in \mathbb{T}$?
- (3) Rozwiąż w zbiorze \mathbb{T} „równanie liniowe” $a \odot x \oplus b = c$, gdzie $a, b, c \in \mathbb{T}$.

3 Liczby zespolone

Zadanie 3.1. Wyznacz część rzeczywistą, część urojoną, sprzężenie, moduł i argument liczb zespolonych:

$$\frac{4+5i}{3i-4}, \quad \frac{(1-i)^4-i}{(1+i)^4+i}, \quad \left(\frac{\sqrt{3}-i}{1-i}\right)^{13}, \quad \sqrt{5} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}\right)^{15}.$$

Zadanie 3.2. Wyznacz wszystkie liczby zespolone $z \neq 0$, dla których $z + 1/z \in \mathbb{R}$.

Zadanie 3.3. Niech $z_1, z_2, z_3, z_4 \in \mathbb{C}$. Wykaż, że:

- (1) $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$.
- (2) $||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 \pm z_2|$.
- (3) $|z_1 \pm z_2|^2 = |z_1|^2 \pm 2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) + |z_2|^2$.
- (4) $|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$.
- (5) $|z_1 - z_2|^2 + |z_1 - z_3|^2 = 2|z_1 - \frac{1}{2}(z_2 + z_3)|^2 + \frac{1}{2}|z_2 - z_3|^2$.
- (6) $(|z_1|^2 + |z_2|^2)(|z_3|^2 + |z_4|^2) = |z_1 z_3 - z_2 \bar{z}_4|^2 + |z_1 z_4 + z_2 \bar{z}_3|^2$.

Uwaga. Równość (4) nosi nazwę *tożsamości równoległoboku*, równość (5) nazywana jest *tożsamością Apoloniusza*, natomiast równość (6) nosi nazwę *tożsamości Eulera*.

Zadanie 3.4. Załóżmy, że $a, b \in \mathbb{Z}$ oraz $n \geq 1$. Uzasadnij, że $(a^2 + b^2)^n = x^2 + y^2$ dla pewnych $x, y \in \mathbb{Z}$.

Zadanie 3.5. Niech $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$. Pokaż, że:

- (1) $|z_1 + z_2| \cdot |z_1 + z_3| \leq |z_1| \cdot |z_1 + z_2 + z_3| + |z_2| \cdot |z_3|$.
- (2) $|z_1 + z_2| + |z_2 + z_3| + |z_3 + z_1| \leq |z_1| + |z_2| + |z_3| + |z_1 + z_2 + z_3|$.
- (3) $|z_1 + z_2|^2 + |z_2 + z_3|^2 + |z_3 + z_1|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + |z_3|^2 + |z_1 + z_2 + z_3|^2$.

Uwaga. Nierówność (2) nazywana jest *nierównością Hlawki*.

Zadanie 3.6. Niech $n \geq 1$ oraz $z_j, w_j \in \mathbb{C}$ dla $1 \leq j \leq n$. Załóżmy, iż

$$|\varepsilon_1 z_1 + \dots + \varepsilon_n z_n| \leq |\varepsilon_1 w_1 + \dots + \varepsilon_n w_n|$$

dla dowolnych $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \in \{-1, 1\}$. Dowiedz, że $|z_1|^2 + \dots + |z_n|^2 \leq |w_1|^2 + \dots + |w_n|^2$.

Zadanie 3.7. Załóżmy, że liczby $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ spełniają $|z_1| = |z_2| = 1$ oraz $z_1 z_2 \neq -1$. Uzasadnij, że liczba

$$\frac{z_1 + z_2}{1 + z_1 z_2}$$

jest rzeczywista.

Zadanie 3.8. Niech $\varphi \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$ oraz $n \geq 1$. Pokaż, że

$$\sin \varphi + \dots + \sin n\varphi = \frac{\sin \frac{n\varphi}{2} \sin \frac{(n+1)\varphi}{2}}{\sin \frac{\varphi}{2}}.$$

Zadanie 3.9. Opisz wszystkie pary $(n, m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, dla których

$$(1 - i)^n(1 - i\sqrt{3})^m = 32.$$

Ile jest par $(n, m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ spełniających powyższe równanie?

Zadanie 3.10. Wyznacz wszystkie pary $(n, a) \in \mathbb{N} \times \mathbb{R}$ o tej własności, że wielomian $(x - 2)^n - a$ jest podzielny przez $x^2 - 2x + 2$.

Zadanie 3.11. Niech

$$z = \frac{\sqrt{2}(1 - i)}{1 - i\sqrt{3}} \in \mathbb{C}.$$

Uzasadnij, że zbiór $Z = \{z^n : n \in \mathbb{Z}\}$ jest skończony oraz wyznacz liczbę jego elementów.

Zadanie 3.12. Załóżmy, że liczba $0 \neq z \in \mathbb{C}$ spełnia równanie $z + 1/z = 2 \cos \varphi$, gdzie $\varphi \in \mathbb{R}$. Oblicz $z^n + 1/z^n$ dla dowolnego $n \geq 1$.

Zadanie 3.13. Rozwiąż w zbiorze \mathbb{C} równania

$$|z + i| + |z - i| = 2 \quad \text{oraz} \quad |z + |z - 1|| = |z - |z + 1||.$$

Zadanie 3.14. Rozwiąż w zbiorze \mathbb{C} równania:

(1) $(2 + i)z + 5\bar{z} - 4 \operatorname{Re}(iz) - 3 \operatorname{Im}(iz) = 3 - i$.

(2) $z^2 = -5 + 12i$.

(3) $|z| + 3\bar{z} = 2 + 6i$.

(4) $(1 + i)z^3 + (3 - 5i)z^2 - 6z = 0$.

(5) $z^4 = -16i$.

(6) $z^4 - 6z^3 + 18z^2 - 30z + 25 = 0$.

(7) $z^7 + 8z^4 + 4z^3 + 32 = 0$.

(8) $z^{12} - z^{10} + 4z^8 + 60z^6 - 64z^4 + 256z^2 - 256 = 0$.

Zadanie 3.15. Załóżmy, że $0 \neq a, b, c, d \in \mathbb{C}$. Przypuśćmy, że $z \in \mathbb{C}$ spełnia równania $az^3 + bz^2 + cz + d = 0$ oraz $bz^3 + cz^2 + dz + a = 0$. Co można powiedzieć o liczbie z ?

Zadanie 3.16. Niech $n \geq 1$. Pokaż, że każde rozwiązanie równania $z^n = (iz + 2i)^n$ jest postaci $z = -1 + it$, gdzie $t \in \mathbb{R}$. Wyznacz wszystkie rozwiązania tego równania.

Zadanie 3.17. Niech $n \geq 1$. Uzasadnij, że gdy dla $z \in \mathbb{C}$ zachodzi $(z + 1)^n = (z - 1)^n$, to $\operatorname{Re} z = 0$.

Zadanie 3.18. Wyznacz wszystkie pierwiastki $z \in \mathbb{C}$ równania $8z^4(z^2 + 1) = z^{10} + 1$ spełniające $|z| = 1$.

Zadanie 3.19. Wykaż, że gdy $z \in \mathbb{C}$ spełnia $|z + 1| \leq 1$ oraz $|z^2 + 1| \leq 1$, to $|z| \leq 1$.

Zadanie 3.20. Uzasadnij, że gdy $z \in \mathbb{C}$ spełnia $|z + 1| > 2$, to $|z^3 + 1| > 1$.

Zadanie 3.21. Niech $P(z) = z^8 - iz^5 + 4z^2 - 8(i + 1)$ dla $z \in \mathbb{C}$. Oznaczmy przez $z_1, \dots, z_8 \in \mathbb{C}$ pierwiastki wielomianu P . Oblicz $z_1 + \dots + z_8$ oraz $z_1^2 + \dots + z_8^2$.

Zadanie 3.22. Niech $a, b \in \mathbb{C}$ oraz $P(z) = z^2 + az + b$ dla $z \in \mathbb{C}$. Udowodnij, że gdy dla dowolnego $z \in \mathbb{C}$ zachodzi $|z| = 1 \implies |P(z)| = 1$, to $a = b = 0$.

Zadanie 3.23. Niech $n \geq 1$. Wykaż, że gdy $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$ są wszystkimi różnymi od 1 rozwiązaniami równania $z^{n+1} = 1$, to $(1 - z_1) \cdots (1 - z_n) = n + 1$ oraz $z_1 \cdots z_n = (-1)^n$.

Zadanie 3.24. Załóżmy, że $n \geq 1$ oraz $a \in [-1, 1]$. Niech $P(z) = z^{n+1} - az^n - az + 1$ dla $z \in \mathbb{C}$. Pokaż, że każdy pierwiastek $z_0 \in \mathbb{C}$ wielomianu P spełnia $|z_0| = 1$.

Zadanie 3.25. Niech $n \geq 2$ oraz $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Przypuśćmy, że liczba $z = e^{i\varphi} \in \mathbb{C}$ dla pewnego $\varphi \in \mathbb{R}$ spełnia równanie $z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \dots + a_n = 0$. Dowiedz, że

$$a_1 \sin \varphi + a_2 \sin 2\varphi + \dots + a_n \sin n\varphi = 0.$$

Zadanie 3.26. Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$, danej wzorem

$$f(z) = |1 + z| + |1 - z + z^2|,$$

na okręgu $S = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, tzn. znajdź $\min f(S)$ oraz $\max f(S)$.

Zadanie 3.27. Rozwiąż równanie

$$\sin x + \sin 2x + \sin 3x = \cos x + \cos 2x + \cos 3x$$

o niewiadomej $x \in \mathbb{R}$.

Zadanie 3.28. Załóżmy, że liczby $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ spełniają równości

$$\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma = \cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = 0.$$

Dowiedz, że $\sin 2\alpha + \sin 2\beta + \sin 2\gamma = \cos 2\alpha + \cos 2\beta + \cos 2\gamma = 0$.

Zadanie 3.29. Udowodnij, że dla dowolnego $n \geq 1$ zachodzi równość

$$\prod_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{2n+1} = \frac{\sqrt{2n+1}}{2^n}.$$

Zadanie 3.30. Niech $n \geq 1$ oraz $U_n = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\}$. Wykaż, że

$$\prod_{z \in U_n} \left(z + \frac{1}{z} \right) \in \{-4, 0, 2\}.$$

Wyznacz podzbiory liczb naturalnych, dla których iloczyn $\prod_{z \in U_n} (z + 1/z)$ jest równy, odpowiednio, -4 , 0 oraz 2 .

Zadanie 3.31. Równanie $z^{10} + (13z - 1)^{10} = 0$ ma dziesięć pierwiastków zespolonych postaci $z_1, \dots, z_5, \bar{z}_1, \dots, \bar{z}_5$ (dlaczego?). Wyznacz wartość wyrażenia

$$\frac{1}{|z_1|^2} + \frac{1}{|z_2|^2} + \frac{1}{|z_3|^2} + \frac{1}{|z_4|^2} + \frac{1}{|z_5|^2}.$$

Zadanie 3.32. Rozłóż wielomiany:

$$x^4 + 2x^2 + 9, \quad x^4 - 6x^3 + 18x^2 - 30x + 25, \quad x^5 - 1, \quad x^8 + x^4 + 1$$

na czynniki będące wielomianami rzeczywistymi stopni ≤ 2 .

Zadanie 3.33. Naszkcuj na płaszczyźnie zbiory liczb $z \in \mathbb{C}$ spełniających warunki:

- (1) $\operatorname{Re}(z^2) \geq -1$.
- (2) $\operatorname{Im}(z^3) < \operatorname{Re}(z^3)$.
- (3) $2 \leq |z| < |z - 2| < 4$.
- (4) $|1 + i - \bar{z}| < 2 - \operatorname{Re} z$.
- (5) $z \neq 0$ oraz $\operatorname{Im}(2/z) < 1$.
- (6) $6 < |z + 1| + |z - 3| \leq 8$.
- (7) $z \neq 0$ oraz $\operatorname{Re}(1/z) < \operatorname{Im}(iz)$.
- (8) $z \neq 1 + i$ oraz $\pi/4 < \operatorname{Arg}(z - 1 - i) \leq 5\pi/6$.

Zadanie 3.34. Niech $A = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}(z^4) > 0\}$. Naszkcuj na płaszczyźnie zbiory A oraz $f(A)$, gdzie funkcja $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ dana jest formułą

$$f(z) = (1 + i)\bar{z} + 2.$$

Niech $P(z) = z^3 + 1$ dla $z \in \mathbb{C}$. Ile pierwiastków wielomianu P leży w zbiorze A ?

Zadanie 3.35. Niech $A = \{z \in \mathbb{C} : 0 \leq \operatorname{Im} z < \sqrt{3} \operatorname{Re} z\}$. Rozważmy funkcje $f, g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ określone wzorami

$$f(z) = (1 + i\sqrt{3})z^2 + 1 + i \quad \text{oraz} \quad g(z) = (z - i)^3.$$

Naszkcuj na płaszczyźnie zbiory $f(A)$ oraz $g^{-1}(A)$.

Zadanie 3.36. Załóżmy, że $z_1, z_2, z_3, z_4 \in \mathbb{C}$ są parami różne (tzn. $z_j \neq z_k$ dla $j \neq k$). Interpretując liczby z_1, z_2, z_3, z_4 jako punkty płaszczyzny udowodnij, że:

- (1) jeżeli $[z_j, z_k]$ oznacza odcinek na płaszczyźnie wyznaczony przez parę liczb (z_j, z_k) , to $[z_1, z_2] \perp [z_3, z_4] \iff \operatorname{Re} \frac{z_1 - z_2}{z_3 - z_4} = 0$ oraz $[z_1, z_2] \parallel [z_3, z_4] \iff \operatorname{Im} \frac{z_1 - z_2}{z_3 - z_4} = 0$.
- (2) punkty z_1, z_2, z_3 leżą na jednej prostej (są współliniowe) $\iff \operatorname{Im} \frac{z_1 - z_2}{z_2 - z_3} = 0$.
- (3) punkty z_1, z_2, z_3, z_4 są współliniowe lub leżą na okręgu $\iff \operatorname{Im} \frac{(z_3 - z_1)(z_4 - z_2)}{(z_3 - z_2)(z_4 - z_1)} = 0$.

Zadanie 3.37. Załóżmy, że liczby $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ są wierzchołkami trójkąta ostrokątnego T . Wyznacz liczbę $z \in \mathbb{C}$ będącą:

- (1) ortocentrum (tzn. miejscem przecięcia wysokości) trójkąta T .
- (2) środkiem okręgu wpisanego w trójkąt T .

Zadanie 3.38. Udowodnij, że gdy A_1, \dots, A_7 są kolejnymi wierzchołkami siedmiokąta foremnego, to

$$\frac{1}{|A_1 A_2|} = \frac{1}{|A_1 A_3|} + \frac{1}{|A_1 A_4|}.$$

Zadanie 3.39 (kwaterniony). Niech $\mathbb{H} = \mathbb{C} \times \mathbb{C}$. Zdefiniujmy dodawanie i mnożenie elementów zbioru \mathbb{H} wzorami

$$(z_1, w_1) + (z_2, w_2) = (z_1 + z_2, w_1 + w_2),$$

$$(z_1, w_1) \cdot (z_2, w_2) = (z_1 z_2 - \bar{w}_2 w_1, w_1 \bar{z}_2 + w_2 z_1).$$

- (1) Uzasadnij, że $(z, 0) + (w, 0) = (z + w, 0)$ oraz $(z, 0) \cdot (w, 0) = (zw, 0)$ dla $z, w \in \mathbb{C}$. Fakt ten pozwala identyfikować liczbę $z \in \mathbb{C}$ z kwaternionem $(z, 0) \in \mathbb{H}$ oraz traktować \mathbb{C} jako *podstrukturę* \mathbb{H} (dokładnie tak, jak \mathbb{R} uważamy za podciała ciała \mathbb{C}). Niech $j = (0, 1) \in \mathbb{H}$. Używając powyższej identyfikacji kwaternion $q = (z, w) \in \mathbb{H}$ można zapisać w postaci

$$q = (z, w) = (z, 0) + (0, w) = (z, 0) + (w, 0) \cdot (0, 1) = z + wj.$$

Jeśli $z = x_0 + x_1 i$ oraz $w = x_2 + x_3 i$ dla pewnych $x_0, x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$, to

$$q = x_0 + x_1 i + x_2 j + x_3 k,$$

gdzie $k = ij \in \mathbb{H}$. Przy tej interpretacji suma $p + q$ kwaternionów $p, q \in \mathbb{H}$ jest zdefiniowana w sposób naturalny, zaś iloczyn $p \cdot q$ jest wyznaczony przez reguły mnożenia

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1.$$

Wyjaśnij precyzyjnie co znaczy powyższe zdanie. Ponadto pokaż, że

$$ij = -ji = k, \quad jk = -kj = i, \quad ki = -ik = j.$$


- (2) Zdefiniujmy *sprzężenie kwaternionu* $q = (z, w) = x_0 + x_1 i + x_2 j + x_3 k \in \mathbb{H}$ jako

$$\bar{q} = (\bar{z}, -w) = x_0 - x_1 i - x_2 j - x_3 k \in \mathbb{H}.$$

Sprawdź, że $q \cdot \bar{q} = \bar{q} \cdot q = x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \geq 0$, co pozwala zdefiniować *moduł kwaternionu* q wzorem $|q| = \sqrt{q \cdot \bar{q}}$. Pokaż, że dla $p, q \in \mathbb{H}$ zachodzi $\overline{p \cdot q} = \bar{q} \cdot \bar{p}$ (uwaga na kolejność czynników) oraz $|p \cdot q| = |p| \cdot |q|$.

- (3) Wykaż, że trójka $(\mathbb{H}, +, \cdot)$ spełnia wszystkie aksjomaty ciała oprócz przemienności mnożenia (w tej sytuacji mówimy, że kwaterniony stanowią *ciało nieprzemienne* lub *algebrę z dzieleniem*). Wyznacz elementy neutralne dodawania i mnożenia w \mathbb{H} oraz opisz element odwrotny (względem mnożenia) do $0 \neq q \in \mathbb{H}$.
- (4) Wiemy, że równanie $x^2 + 1 = 0$ nie ma rozwiązań w \mathbb{R} oraz ma dokładnie dwa rozwiązania w \mathbb{C} . Ile rozwiązań ma to równanie w \mathbb{H} ? Opisz je wszystkie.

Uwaga. W zapamiętaniu reguł mnożenia *kwaternionów jednostkowych* $i, j, k \in \mathbb{H}$ pomóc może poniższy rysunek.



Zadanie 3.40 (oktoniony). Niech $\mathbb{O} = \mathbb{H} \times \mathbb{H}$. Zdefiniujmy dodawanie oraz mnożenie elementów zbioru \mathbb{O} wzorami

$$\begin{aligned}(p_1, q_1) + (p_2, q_2) &= (p_1 + p_2, q_1 + q_2), \\ (p_1, q_1) \cdot (p_2, q_2) &= (p_1 p_2 - \bar{q}_2 q_1, q_1 \bar{p}_2 + q_2 p_1).\end{aligned}$$

- (1) Uzasadnij, że $(p, 0) + (q, 0) = (p + q, 0)$ oraz $(p, 0) \cdot (q, 0) = (pq, 0)$ dla $p, q \in \mathbb{H}$. Fakt ten pozwala identyfikować kwaternion $p \in \mathbb{H}$ z oktonionem $(p, 0) \in \mathbb{O}$ oraz traktować \mathbb{H} jako *podstrukturę* \mathbb{O} . Niech $\varepsilon = (0, 1) \in \mathbb{O}$. Używając powyższej identyfikacji oktonion $x = (p, q) \in \mathbb{O}$ można zapisać w postaci

$$x = (p, q) = (p, 0) + (0, q) = (p, 0) + (q, 0) \cdot (0, 1) = p + q\varepsilon.$$

Zapisując $p = x_0 + x_1 i + x_2 j + x_3 k$ oraz $q = x_4 + x_5 i + x_6 j + x_7 k$ dla pewnych $x_0, \dots, x_7 \in \mathbb{R}$ otrzymujemy

$$x = x_0 + x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3 + x_4 e_4 + x_5 e_5 + x_6 e_6 + x_7 e_7,$$

gdzie $e_1, \dots, e_7 \in \mathbb{O}$ są postaci:

$$e_1 = i, \quad e_2 = j, \quad e_3 = k, \quad e_4 = \varepsilon, \quad e_5 = i\varepsilon, \quad e_6 = j\varepsilon, \quad e_7 = k\varepsilon.$$

Przy tej interpretacji suma $x + y$ oktonionów $x, y \in \mathbb{O}$ jest zdefiniowana w sposób naturalny, natomiast iloczyn $x \cdot y$ jest wyznaczony przez poniższą tabelę (wyjaśnij precyzyjnie co to znaczy).

\cdot	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7
e_1	-1	e_3	$-e_2$	e_5	$-e_4$	$-e_7$	e_6
e_2	$-e_3$	-1	e_1	e_6	e_7	$-e_4$	$-e_5$
e_3	e_2	$-e_1$	-1	e_7	$-e_6$	e_5	$-e_4$
e_4	$-e_5$	$-e_6$	$-e_7$	-1	e_1	e_2	e_3
e_5	e_4	$-e_7$	e_6	$-e_1$	-1	$-e_3$	e_2
e_6	e_7	e_4	$-e_5$	$-e_2$	e_3	-1	$-e_1$
e_7	$-e_6$	e_5	e_4	$-e_3$	$-e_2$	e_1	-1

Udowodnij ponadto, że reguły mnożenia z powyżej tabeli mogą być ujęte we wzór

$$e_a e_b = -\delta_{ab} + \sum_{c=1}^7 \varepsilon_{abc} e_c$$

dla dowolnych $1 \leq a, b \leq 7$, gdzie ε_{abc} jest *symbolem całkowicie antysymetrycznym* (tzn. zamiana miejscami dwóch indeksów w symbolu ε_{abc} zmienia wartość tego symbolu na przeciwną; w szczególności gdy dwa indeksy w symbolu ε_{abc} są równe, to $\varepsilon_{abc} = 0$). Opisz, możliwie zwięźle, wszystkie wartości ε_{abc} dla $1 \leq a, b, c \leq 7$.


(2) Zdefiniujmy sprzężenie oktonionu $x = (p, q) = x_0 + \sum_{a=1}^7 x_a e_a \in \mathbb{O}$ jako

$$\bar{x} = (\bar{p}, -q) = x_0 - \sum_{a=1}^7 x_a e_a \in \mathbb{O}.$$

Sprawdź, że $x \cdot \bar{x} = \bar{x} \cdot x = \sum_{a=0}^7 x_a^2 \geq 0$, co pozwala zdefiniować moduł oktonionu x wzorem $|x| = \sqrt{x \cdot \bar{x}}$. Pokaż, że dla $x, y \in \mathbb{O}$ zachodzi $\overline{x \cdot y} = \bar{y} \cdot \bar{x}$ (uwaga na kolejność czynników) oraz $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$.

- (3) Udowodnij, że trójka $(\mathbb{O}, +, \cdot)$ spełnia wszystkie aksjomaty ciała oprócz łączności oraz przemienności mnożenia (oktoniony są przykładem tzw. *alternatywnej algebry z dzieleniem*). Wyznacz elementy neutralne dodawania i mnożenia w \mathbb{O} oraz opisz element odwrotny (względem mnożenia) do $0 \neq x \in \mathbb{O}$.
- (4) Znajdź wszystkie rozwiązania równania $x^2 + 1 = 0$ w \mathbb{O} .

Uwaga. Sposób definiowania liczb zespolonych jako par liczb rzeczywistych i podobnie kwaternionów jako par liczb zespolonych, czy oktonionów jako par kwaternionów nosi nazwę *konstrukcji Cayleya–Dixona*. Konstrukcję tę można kontynuować otrzymując np. tzw. *sedeniony*, lecz uzyskiwane w kolejnych krokach struktury algebraiczne posiadają coraz mniej „dobrych” własności (np. mnożenie w \mathbb{H} nie jest przemienne, zaś mnożenie w \mathbb{O} nie jest nawet łączne). W zapamiętaniu reguł mnożenia *oktonionów jednostkowych* $e_1, \dots, e_7 \in \mathbb{O}$ pomóc może poniższy rysunek (tzw. *plaszczyna Fano*).



4 Przestrzenie wektorowe

Zadanie 4.1. Niech $X = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$. Zdefiniujmy dodawanie \oplus elementów zbioru X oraz mnożenie \odot elementów zbioru X przez liczby rzeczywiste wzorami

$$x \oplus y = xy \quad \text{oraz} \quad \lambda \odot x = x^\lambda.$$

Wykaż, że trójka (X, \oplus, \odot) jest przestrzenią wektorową nad ciałem \mathbb{R} .

Zadanie 4.2. Niech S będzie dowolnym zbiorem, zaś $V = \mathcal{P}(S)$. Zdefiniujmy dodawanie w V wzorem

$$A + B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Udowodnij, że gdy mnożenie elementów zbioru V przez skalary ciała dwuelementowego \mathbb{F}_2 zadamy wzorem

$$\lambda \cdot A = \begin{cases} \emptyset & \text{gdy } \lambda = 0, \\ A & \text{gdy } \lambda = 1, \end{cases}$$

to trójka $(V, +, \cdot)$ będzie przestrzenią liniową nad ciałem \mathbb{F}_2 .

Zadanie 4.3. Niech $n \geq 1$ oraz

$$V = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1, \dots, x_n > 0\}.$$

Rozważmy odwzorowanie $f: \mathbb{R}^n \rightarrow V$ dane wzorem $f(x_1, \dots, x_n) = (e^{x_1}, \dots, e^{x_n})$.

- (1) Uzasadnij, że f jest bijekcją i wykorzystując ten fakt zdefiniuj taką strukturę (V, \oplus, \odot) przestrzeni liniowej nad \mathbb{R} w zbiorze V , aby f było izomorfizmem.
- (2) Rozważmy podprzestrzeń $U = \text{Lin}(f(1, \dots, 1))$ przestrzeni V . Opisz przestrzeń ilorazową V/U i uzasadnij, że jest ona w bijekcji z *sympleksem otwartym*

$$\Delta_n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1, \dots, x_n > 0 \text{ oraz } x_1 + \dots + x_n = 1\}.$$

- (3) Wykorzystaj bijekcję z punktu (2), aby zdefiniować strukturę przestrzeni liniowej nad \mathbb{R} w zbiorze Δ_n . Sprawdź, że dodawanie \oplus wektorów w Δ_n ma postać

$$(x_1, \dots, x_n) \oplus (y_1, \dots, y_n) = \frac{(x_1 y_1, \dots, x_n y_n)}{x_1 y_1 + \dots + x_n y_n},$$

natomiast mnożenie \odot wektorów z Δ_n przez liczby rzeczywiste dane jest formułą

$$\lambda \odot (x_1, \dots, x_n) = \frac{(x_1^\lambda, \dots, x_n^\lambda)}{x_1^\lambda + \dots + x_n^\lambda}.$$

Jak wygląda wektor zerowy przestrzeni Δ_n ?

Zadanie 4.4. Uzasadnij, że grupy $(\mathbb{Z}, +)$ nie da się wyposażyć w strukturę przestrzeni liniowej nad jakimkolwiek ciałem.

Zadanie 4.5. Pokaż, iż grupie $(\mathbb{Q}, +)$ nie można nadać struktury przestrzeni liniowej nad ciałem $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ (działania w K pochodzą z \mathbb{R}).

Zadanie 4.6. Niech $V = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. Zdefiniujmy dodawanie \oplus w V wzorem

$$z_1 \oplus z_2 = z_1 z_2.$$

Wykaż, że jeżeli K jest (dowolnym) ciałem, to nie istnieje takie mnożenie \odot elementów zbioru V przez skalary z K , aby trójka (V, \oplus, \odot) była przestrzenią wektorową nad K .

Zadanie 4.7. Rozważmy podciało $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ ciała \mathbb{R} . Czy można zdefiniować takie mnożenie \odot elementów zbioru $V = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$ przez skalary z ciała K , by trójka $(V, +, \odot)$ (symbol $+$ oznacza tu zwykle dodawanie w \mathbb{R}) była przestrzenią wektorową nad K ?

Zadanie 4.8. Załóżmy, że trójka $(\mathbb{Q}(\sqrt{5}), +, \odot)$ (symbol $+$ oznacza tu zwykle dodawanie w \mathbb{R}) jest przestrzenią liniową nad ciałem $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ (z działaniami dziedziczonymi z \mathbb{R}). Wiedząc, że $\sqrt{3} \odot 1 = 2 + \sqrt{5}$ oblicz $\sqrt{3} \odot \sqrt{5}$.

Zadanie 4.9. Sprawdź czy podzbiór S przestrzeni V jest jej podprzestrzenią, gdy:

- (1) $V = \mathbb{Q}^2$ oraz $S = \{(x, y) \in V : x, y > 0\}$.
- (2) $V = \mathbb{R}^2$ oraz $S = \{(x, y) \in V : x - y \in \mathbb{Z}\}$.
- (3) $V = \mathbb{R}^2$ oraz $S = \{(x, y) \in V : x + 3y = 1\}$.
- (4) $V = \mathbb{C}^2$ oraz $S = \{(x, y) \in V : x^2 + y^2 = 0\}$.
- (5) $V = \mathbb{Q}^3$ oraz $S = \{(x, y, z) \in V : x = y = 2z\}$.
- (6) $V = \mathbb{R}^3$ oraz $S = \{(x, y, z) \in V : z \neq 0 \text{ oraz } (x + y)/z = 1\}$.
- (7) $V = \mathbb{C}^3$ oraz $S = \{(x, y, z) \in V : x^2 + y^2 + z^2 = 2xy - 2yz + 2zx\}$.
- (8) $V = \mathbb{F}_3^3$ oraz $S = \{(x, y, z) \in V : x + y + z = 0 \text{ oraz } x - y + z = z^3\}$.

W przypadku gdy S nie jest podprzestrzenią w V , wskaż który z warunków definiujących podprzestrzeń nie jest spełniony.

Zadanie 4.10. Rozważmy przestrzeń $V = \text{Map}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ z naturalnymi działaniami. Czy zbiór S , gdy:

- (1) $S = \{f \in V : f(0) = 1\}$,
- (2) $S = \{f \in V : f(1) = 0\}$,
- (3) $S = \{f \in V : f(x) > 0 \text{ dla dowolnego } x > 0\}$,
- (4) $S = \{f \in V : f(-x) = -f(x) \text{ dla dowolnego } x \in \mathbb{R}\}$,
- (5) $S = \{f \in V : f \text{ jest funkcją ciągłą}\}$,
- (6) $S = \{f \in V : f \text{ jest funkcją wielomianową}\}$,
- (7) $S = \{f \in V : f \text{ jest funkcją okresową}\}$,
- (8) $S = \{f \in V : f \text{ jest funkcją okresową o okresie } \omega > 0\}$

jest podprzestrzenią przestrzeni V ? Jeśli S nie jest podprzestrzenią w V , to dlaczego?

Zadanie 4.11. Dla dowolnych $a, b \in \mathbb{R}$ zdefiniujmy funkcje $f_{a,b}, g_{a,b}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ wzorami

$$f_{a,b}(x) = a \sin(x + b) \quad \text{oraz} \quad g_{a,b}(x) = a \sin(bx).$$

Który ze zbiorów $F = \{f_{a,b} : a, b \in \mathbb{R}\}$ oraz $G = \{g_{a,b} : a, b \in \mathbb{R}\}$ jest podprzestrzenią przestrzeni $\text{Map}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$?

Zadanie 4.12. Załóżmy, że $X \neq \emptyset$ jest dowolnym zbiorem, natomiast K jest ciałem. Dla funkcji $f \in \text{Map}(X, K)$ zdefiniujmy jej *nośnik*

$$\text{Supp } f = \{x \in X : f(x) \neq 0\}.$$

Uzasadnij, że

$$V = \{f \in \text{Map}(X, K) : |\text{Supp } f| < \infty\}$$

jest podprzestrzenią przestrzeni $\text{Map}(X, K)$.

Uwaga. Podprzestrzeń V oznaczamy czasem przez KX lub $K^{(X)}$.

Zadanie 4.13. Załóżmy, że $X = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ jest zbiorem ciągów o wyrazach rzeczywistych. Wprowadźmy dodawanie w X i mnożenie elementów X przez liczby rzeczywiste wzorami

$$(x_n)_{n=1}^{\infty} + (y_n)_{n=1}^{\infty} = (x_n + y_n)_{n=1}^{\infty} \quad \text{oraz} \quad \lambda \cdot (x_n)_{n=1}^{\infty} = (\lambda x_n)_{n=1}^{\infty}.$$

Sprawdź, że $(X, +, \cdot)$ jest przestrzenią wektorową nad \mathbb{R} . Które z podzbiorów:

$$\begin{aligned} S_1 &= \{(x_n)_{n=1}^{\infty} \in X : x_n \neq 0 \text{ dla skończenie wielu } n\}, \\ S_2 &= \{(x_n)_{n=1}^{\infty} \in X : x_n = 0 \text{ dla nieskończenie wielu } n\}, \\ S_3 &= \{(x_n)_{n=1}^{\infty} \in X : \text{ciąg } (x_n)_{n=1}^{\infty} \text{ jest monotoniczny}\}, \\ S_4 &= \{(x_n)_{n=1}^{\infty} \in X : \text{ciąg } (x_n)_{n=1}^{\infty} \text{ jest zbieżny do zera}\}, \\ S_5 &= \{(x_n)_{n=1}^{\infty} \in X : \text{ciąg } (x_n)_{n=1}^{\infty} \text{ jest zbieżny}\}, \\ S_6 &= \{(x_n)_{n=1}^{\infty} \in X : \text{ciąg } (x_n)_{n=1}^{\infty} \text{ jest ograniczony}\}, \\ S_7 &= \{(x_n)_{n=1}^{\infty} \in X : \text{szereg } \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| \text{ jest zbieżny}\}, \\ S_8 &= \{(x_n)_{n=1}^{\infty} \in X : \text{szereg } \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 \text{ jest zbieżny}\} \end{aligned}$$

są podprzestrzeniami przestrzeni X ? Ustal relacje inkluzji pomiędzy tymi z podzbiorów S_1, \dots, S_8 , które są podprzestrzeniami.

Zadanie 4.14. Załóżmy, że U oraz V są podprzestrzeniami przestrzeni wektorowej X spełniającymi $X = U \cup V$. Udowodnij, że wtedy $U = X$ lub $V = X$.

Zadanie 4.15. Niech U będzie podprzestrzenią przestrzeni wektorowej V . Wykaż, że:

- (1) $V \setminus U$ nie jest podprzestrzenią V .
- (2) $(V \setminus U) \cup \{0\}$ jest podprzestrzenią V wtedy i tylko wtedy, gdy $U = 0$ lub $U = V$.

Zadanie 4.16. Niech $K = \mathbb{F}_2$. Ile podprzestrzeni ma przestrzeń wektorowa K^3 ? Opisz każdą z nich układem równań liniowych.

Zadanie 4.17. Załóżmy, że U, V, W są podprzestrzeniami przestrzeni wektorowej X nad ciałem K .

(1) Sprawdź, że zbiór

$$U + V = \{u + v : u \in U \text{ oraz } v \in V\}$$

(nazywany *sumą algebraiczną* podprzestrzeni U oraz V) jest podprzestrzenią X .

(2) Pokaż, że $U + V$ jest najmniejszą (w sensie inkluzji) podprzestrzenią przestrzeni X zawierającą jednocześnie U oraz V .

(3) Uzasadnij, że $(U \cap W) + (V \cap W) \subseteq (U + V) \cap W$ oraz gdy $U \subseteq W$ lub $V \subseteq W$, to zachodzi równość.

(4) Podaj przykład, w którym $(U \cap W) + (V \cap W) \neq (U + V) \cap W$.

Zadanie 4.18. Załóżmy, że V_1, V_2, V_3 są podprzestrzeniami przestrzeni wektorowej V . Wykaż, że

$$(V_1 \cap V_2) + (V_2 \cap V_3) + (V_3 \cap V_1) \subseteq (V_1 + V_2) \cap (V_2 + V_3) \cap (V_3 + V_1).$$

Podaj przykład, w którym powyższej inkluzji nie można zastąpić równością. Czy jeżeli założymy, że $V_i \subseteq V_j$ dla pewnych $i \neq j$, to zawsze uzyskamy równość?

Zadanie 4.19. Niech $n \geq 3$. Załóżmy, że przestrzeń wektorowa V nad ciałem K da się zapisać jako suma $V = V_1 \cup \dots \cup V_n$ podprzestrzeni właściwych $V_1, \dots, V_n \subseteq V$. Pokaż, że wtedy $|K| < n$.

Uwaga. Powyższy fakt pojawił się w pracy A. Białynicki-Birula, J. Browkin, A. Schinzel, *On the representation of fields as finite union of subfields*, Coll. Math. **7** (1959), 31–32.

Zadanie 4.20. Niech V będzie przestrzenią liniową, $S, T \subseteq V$ oraz $v \in V$. Sprawdź, że:

(1) $\text{Lin}(\text{Lin}(S)) = \text{Lin}(S)$.

(2) $\text{Lin}(S \cup T) = \text{Lin}(S) + \text{Lin}(T)$.

(3) $\text{Lin}(S) = \text{Lin}(T) \iff S \subseteq \text{Lin}(T)$ oraz $T \subseteq \text{Lin}(S)$.

(4) $v \in \text{Lin}(S) \iff \text{Lin}(S \cup \{v\}) = \text{Lin}(S)$.

Zadanie 4.21. Niech V będzie przestrzenią wektorową nad ciałem K oraz $u, v \in V$. Czy prawdą jest, że zawsze $\text{Lin}(u + v, u - v) = \text{Lin}(u, v)$?

Zadanie 4.22. Rozważmy przestrzeń ciągów $V = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ z naturalnymi działaniami. Niech $e_n \in V$ dla $n \in \mathbb{N}$ będzie ciągiem, którego n -ty wyraz równy jest 1, zaś pozostałe wyrazy równe są 0. Opisz podprzestrzeń $U = \text{Lin}(e_n : n \in \mathbb{N})$. Czy $U = V$?

Zadanie 4.23. Podaj przykład wektora $v \in \mathbb{R}^4$, który nie leży w podprzestrzeni

$$\text{Lin}((1, 3, 1, 3), (3, 8, 2, 9), (0, 3, 2, 3)) \subseteq \mathbb{R}^4.$$

Zadanie 4.24. Czy wektor $v = (1, 1, 1)$ leży w podprzestrzeni \mathbb{R}^3 rozpiętej przez wektory $v_1 = (1, 3, 2)$, $v_2 = (1, 2, 1)$ oraz $v_3 = (2, 5, 3)$? To samo pytanie dla wektora $w = (1, 4, 3)$.

Zadanie 4.25. Dla jakich $t \in \mathbb{R}$ wektor $v = (-2, t, -1, 7) \in \mathbb{R}^4$ jest kombinacją liniową wektorów $v_1 = (1, 2, -1, 3)$, $v_2 = (1, 0, 2, 2)$ oraz $v_3 = (-1, 3, 1, 1)$?

Zadanie 4.26. Pokaż, że każdy wektor $x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{C}^4$ leżący w podprzestrzeni \mathbb{C}^4 rozpiętej przez wektory $v_1 = (i, 1, -i, -1)$, $v_2 = (i, -i, 1, -1)$ oraz $v_3 = (1, 0, 0, -1)$ spełnia równanie $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$, ale nie każdy spełnia równanie $x_4 = -1$.

Zadanie 4.27. Niech $n \geq 2$ oraz

$$V = \{f \in \mathbb{R}[x] : \deg f \leq n \text{ oraz } f(1) = f(2) = 0\}.$$

Sprawdź, że $V = \text{Lin}(x^j - 3x^{j-1} + 2x^{j-2} : 2 \leq j \leq n)$.

Zadanie 4.28. Niech

$$V = \text{Lin}((1, 2, -1, 4), (2, 3, -2, 7), (3, 1, -3, 7), (1, 1, -1, 3)) \subseteq \mathbb{C}^4.$$

Przedstaw V jako przestrzeń rozwiązań pewnego układu równań liniowych.

Zadanie 4.29. Niech

$$U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{Q}^4 : x_1 + 2x_2 - 3x_4 = 0, x_1 + x_2 - 2x_3 = 0\},$$

$$V = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{Q}^4 : 3x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4 = 0, x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0\}.$$

Opisz $U \cap V$ oraz $U + V$ jako przestrzenie rozwiązań układów równań liniowych.

Definicja. Załóżmy, że X jest zbiorem. Dowolny podzbiór $R \subseteq X \times X$ nazywamy *relacją* w X . Mówimy, że relacja R jest:

- (1) *zwrotna*, gdy $(x, x) \in R$ dla $x \in X$.
- (2) *symetryczna*, gdy $(x, y) \in R \implies (y, x) \in R$ dla $x, y \in X$.
- (3) *przechodnia*, gdy $(x, y) \in R$ oraz $(y, z) \in R \implies (x, z) \in R$ dla $x, y, z \in X$.

Relację, która jest zwrotna, symetryczna i przechodnia nazywamy *relacją równoważności*. Jeśli R jest relacją równoważności w X , to *klasą abstrakcji* (lub *klasą równoważności* lub *warstwą*) elementu $x \in X$ względem relacji R nazywamy zbiór

$$[x] = \{y \in X : (x, y) \in R\}.$$

Natomiast rodzinę wszystkich klas abstrakcji

$$X/R = \{[x] : x \in X\}$$

nazywamy *zbiorem ilorazowym* (lub *ilorazem*) zbioru X przez relację R . Każdy element klasy abstrakcji $[x] \in X/R$ nazywa się *reprezentantem* tej klasy. Wybierając po jednym elemencie z każdej klasy abstrakcji w X/R (można to zrobić dzięki *Aksjomatowi Wyboru*) otrzymujemy *zbiór reprezentantów* klas abstrakcji relacji R , czyli taki podzbiór $T \subseteq X$, że $X = \bigcup_{t \in T} [t]$ oraz $[s] \cap [t] = \emptyset$ dla $s, t \in T$ spełniających $s \neq t$.

Zadanie 4.30 (przestrzeń ilorazowa). Mówimy, że relacja równoważności ρ w przestrzeni wektorowej V nad ciałem K jest *kongruencją*, gdy dla dowolnych $v, w, v', w' \in V$ oraz $\lambda \in K$ zachodzi

$$(v, w), (v', w') \in \rho \implies (v + v', w + w') \in \rho,$$

$$(v, w) \in \rho \implies (\lambda v, \lambda w) \in \rho.$$

- (1) Udowodnij, że gdy ρ jest kongruencją w V , to zbiór ilorazowy V/ρ z działaniami zdefiniowanymi jako

$$[v] + [w] = [v + w] \quad \text{oraz} \quad \lambda[v] = [\lambda v]$$

dla $v, w \in V$ oraz $\lambda \in K$ jest przestrzenią wektorową nad ciałem K (sprawdź najpierw, że powyższe działania są *poprawnie określone*, tzn. nie zależą od wyboru reprezentantów klas abstrakcji).

- (2) Wykaż, że gdy ρ jest kongruencją w V , to zbiór

$$U_\rho = \{v \in V : (v, 0) \in \rho\}$$

jest podprzestrzenią przestrzeni V .

- (3) Udowodnij, że gdy U jest podprzestrzenią przestrzeni V , to relacja

$$\rho_U = \{(v, w) \in V \times V : v - w \in U\}$$

jest kongruencją w V . Przestrzeń wektorową V/ρ_U (z działaniami zdefiniowanymi w punkcie (1)) oznaczamy przez V/U i nazywamy *przestrzenią ilorazową* (lub *ilorazem*) przestrzeni V względem podprzestrzeni U . Sprawdź, że klasa abstrakcji wektora $v \in V$ względem kongruencji ρ_U (nazywana *warstwą v względem U*) jest postaci

$$v + U = \{v + u : u \in U\}.$$

- (4) Wykaż, że każda kongruencja ρ w V jest postaci $\rho = \rho_U$ dla pewnej podprzestrzeni $U \subseteq V$. Analogicznie wykaż, że każda podprzestrzeń $U \subseteq V$ jest postaci $U = U_\rho$ dla pewnej kongruencji ρ w V .

Uwaga. Jeśli przez $\text{Con}(V)$ oznaczymy rodzinę wszystkich kongruencji w V , zaś przez $\text{Lat}(V)$ rodzinę wszystkich podprzestrzeni w V , to można sprawdzić, że odwzorowania

$$\text{Con}(V) \ni \rho \mapsto U_\rho \in \text{Lat}(V) \quad \text{oraz} \quad \text{Lat}(V) \ni U \mapsto \rho_U \in \text{Con}(V)$$

są wzajemnie odwrotnymi bijekcjami (a nawet *izomorfizmami krat*).

Zadanie 4.31. Które ze zbiorów są liniowo niezależne w odpowiedniej przestrzeni?

- (1) \emptyset w przestrzeni \mathbb{Q}^2 nad ciałem \mathbb{Q} .
- (2) $\{0, x\}$ w przestrzeni $\mathbb{Q}[x]$ nad ciałem \mathbb{Q} .
- (3) $\{(1, 2, 1), (1, 2, 1)\}$ w przestrzeni \mathbb{R}^3 nad ciałem \mathbb{R} .
- (4) $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, -1)\}$ w przestrzeni \mathbb{R}^3 nad ciałem \mathbb{R} .
- (5) $\{(1, 2, 3, 4), (1, 1, 1, 1), (0, 0, 0, 1), (0, 1, 2, 2)\}$ w przestrzeni \mathbb{C}^4 nad ciałem \mathbb{C} .

Zadanie 4.32. Z podanego podzbioru S przestrzeni wektorowej V wybierz maksymalny (względem inkluzji) podzbiór liniowo niezależny, gdy:

- (1) $V = \mathbb{R}^4$ oraz $S = \{(3, 2, 1, 1), (5, 0, 2, 3), (4, 1, 4, 5), (4, 1, -1, -1)\}$.
- (2) $V = \mathbb{C}^3$ oraz $S = \{(2, 1, 4), (3, 5, -1), (3, -2, 13), (7, 7, 7), (-4, -9, 6)\}$.

(3) $V = \mathbb{F}_3^3$ oraz $S = \{(1, 1, 1), (1, 2, 0), (0, 1, 2), (0, 0, 2), (2, 1, 2), (2, 2, 1)\}$.

Zadanie 4.33. Dla jakich par $(s, t) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ wektory $v_1 = (5, 7, s, 2)$, $v_2 = (1, 3, 2, 1)$ oraz $v_3 = (2, 2, 4, t)$ są liniowo niezależne nad \mathbb{Q} ?

Zadanie 4.34. Niech $n \geq 1$ oraz

$$S = \{A_{ij} \in M_n(\mathbb{R}) : 1 \leq i \leq j \leq n\},$$

gdzie A_{ij} to macierz, której (k, l) -ty wyraz dla $k, l \in \{i, j\}$ równy jest 1, zaś pozostałe wyrazy równe są 0. Uzasadnij, że zbiór S jest liniowo niezależny i opisz podprzestrzeń rozpiętą przez ten zbiór.

Zadanie 4.35. Niech $n \geq 1$. Załóżmy, że u_1, \dots, u_n są liniowo niezależnymi wektorami przestrzeni liniowej V nad ciałem K . Czy wektory $v_1, \dots, v_n \in V$ zdefiniowane formułą

$$v_i = u_1 + \dots + u_i \quad (1 \leq i \leq n)$$

są liniowo niezależne? To samo pytanie dla wektorów $w_1, \dots, w_n \in V$ danych jako

$$w_i = \begin{cases} u_i + u_{i+1} & \text{gdy } 1 \leq i < n, \\ u_n + u_1 & \text{gdy } i = n. \end{cases}$$

Zadanie 4.36. Załóżmy, że K jest ciałem oraz $n \geq 1$. Sprawdź, że dowolne wielomiany $0 \neq f_1, \dots, f_n \in K[x]$ spełniające $\deg f_i \neq \deg f_j$ dla $i \neq j$ są liniowo niezależne nad K .

Zadanie 4.37. Załóżmy, że $n \geq 1$. Czy istnieją takie wielomiany $f_1, \dots, f_n \in \mathbb{R}[x]$ oraz $g_1, \dots, g_n \in \mathbb{R}[y]$, że

$$1 + xy + \dots + x^n y^n = f_1(x)g_1(y) + \dots + f_n(x)g_n(y)?$$

Zadanie 4.38. Uzasadnij, że rodzina funkcji wymiernych $\{\frac{1}{x-a} : a \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}(x)$ jest liniowo niezależna nad \mathbb{R} . Zaproponuj możliwie „małe” dopełnienie tej rodziny do układu rozpinającego przestrzeń $\mathbb{R}(x)$ nad \mathbb{R} . To samo zadanie dla rodziny $\{\frac{1}{x-a} : a \in \mathbb{C}\} \subseteq \mathbb{C}(x)$.

Zadanie 4.39. Sprawdź, że wektory $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$ przestrzeni liniowej \mathbb{R} nad \mathbb{Q} są liniowo niezależne. Dla dowolnego $n \geq 1$ zaproponuj n -elementowy zbiór liczb rzeczywistych liniowo niezależnych nad \mathbb{Q} . Czy istnieje nieskończony i liniowo niezależny podzbiór \mathbb{R} ?

Zadanie 4.40. Ustawmy liczby wymierne \mathbb{Q} w ciąg $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (można to zrobić na wiele sposobów). Dla dowolnego $r \in \mathbb{R}$ zdefiniujmy liczbę

$$a_r = \sum_{n \in N(r)} \frac{1}{n!}, \quad \text{gdzie } N(r) = \{n \in \mathbb{N} : q_n < r\}.$$

- (1) Sprawdź, że szereg definiujący a_r jest zbieżny (czyli definicja jest poprawna).
- (2) Wykaż, że dla dowolnych $r, s \in \mathbb{R}$ zachodzi $r \neq s \implies a_r \neq a_s$.
- (3) Udowodnij, że zbiór $A = \{a_r : r \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}$ jest liniowo niezależny nad \mathbb{Q} .

Uwaga. Dowodzi się, że choć zbiór A jest tej samej mocy co \mathbb{R} (tzn. $|A| = \mathfrak{c}$), to nie rozpina on \mathbb{R} nad \mathbb{Q} . Można też wykazać (patrz J. von Neumann, *Ein System algebraisch unabhängiger Zahlen*, Math. Ann. **99** (1928), 134–141), że liczby postaci

$$b_r = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{2^{\lfloor nr \rfloor}}}{2^{2^{n^2}}} \quad (r > 0)$$

($\lfloor x \rfloor$ oznacza część całkowitą liczby $x \in \mathbb{R}$) są nie tylko liniowo niezależne nad \mathbb{Q} , ale nawet *algebraicznie niezależne* nad \mathbb{Q} , tzn. dla dowolnego $n \geq 1$, dowolnych $0 < r_1 < \dots < r_n$ oraz dowolnego wielomianu $0 \neq f \in \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n]$ zachodzi $f(b_{r_1}, \dots, b_{r_n}) \neq 0$.

Zadanie 4.41. Udowodnij, że w przestrzeni wektorowej ciągów $\text{Map}(\mathbb{N}, \mathbb{F}_2)$ nad ciałem \mathbb{F}_2 istnieje nieprzeliczalny zbiór wektorów liniowo niezależnych.

Zadanie 4.42. Niech S, T będą liniowo niezależnymi i rozłącznymi (tzn. $S \cap T = \emptyset$) podzbiarami przestrzeni liniowej V nad ciałem K oraz niech $v \in V$. Wykaż, że:

- (1) zbiór $S \cup \{v\}$ jest liniowo niezależny $\iff v \notin \text{Lin}(S)$.
- (2) zbiór $S \cup T$ jest liniowo niezależny $\iff \text{Lin}(S) \cap \text{Lin}(T) = 0$.

Zadanie 4.43. Niech $n \geq 1$. Czy funkcje $f_1, \dots, f_n \in \text{Map}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ zdefiniowane wzorami:

- (1) $f_j(x) = x - j$ dla $1 \leq j \leq n$,
- (2) $f_j(x) = |x - j|$ dla $1 \leq j \leq n$,
- (3) $f_j(x) = x^j$ dla $1 \leq j \leq n$,
- (4) $f_j(x) = e^{jx}$ dla $1 \leq j \leq n$,
- (5) $f_j(x) = \sin jx$ dla $1 \leq j \leq n$,
- (6) $f_j(x) = \cos jx$ dla $1 \leq j \leq n$

są liniowo niezależnymi wektorami przestrzeni $\text{Map}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$?

Zadanie 4.44. Uzasadnij, że w przestrzeni \mathbb{R}^2 istnieje nieskończony zbiór wektorów, którego dowolne dwa różne elementy są liniowo niezależne. Sformułuj oraz wykaż podobne twierdzenie dla przestrzeni \mathbb{R}^n , gdzie $n \geq 3$.

Zadanie 4.45. Niech $n \geq 1$. Udowodnij, że funkcje $f_1, \dots, f_n \in \text{Map}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ są liniowo niezależnymi wektorami przestrzeni $\text{Map}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją takie $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, że wektory

$$v_i = (f_1(x_i), \dots, f_n(x_i)) \in \mathbb{R}^n \quad (1 \leq i \leq n)$$

są liniowo niezależne.

Zadanie 4.46. Załóżmy, że $1 \leq n \leq m$ oraz $v_j = (a_{j1}, \dots, a_{jm}) \in \mathbb{C}^m$ dla $1 \leq j \leq n$. Pokaż, że gdy dla każdego $1 \leq p \leq n$ istnieje takie $1 \leq q \leq m$, że

$$\sum_{j=1}^n |a_{jq}| < 2|a_{pq}|,$$

to wektory v_1, \dots, v_n są liniowo niezależne.

Zadanie 4.47. Niech $V = l^\infty$ będzie przestrzenią wektorową wszystkich ograniczonych ciągów o wyrazach rzeczywistych (z naturalnymi działaniami). Dla dowolnego $t \in (0, 1)$ zdefiniujmy wektor $v_t = (t^{n-1})_{n=1}^\infty \in V$. Dowiedz, że zbiór $\{v_t : t \in (0, 1)\} \subseteq V$ jest liniowo niezależny.

Zadanie 4.48. Niech

$$A_1 = \begin{bmatrix} a & 2a \\ 2 & 3a \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ a & 3 \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2a \\ a+1 & a+2 \end{bmatrix}, \quad A_4 = \begin{bmatrix} 1 & a+1 \\ 2 & 2a+1 \end{bmatrix}.$$

Dla jakich $a \in \mathbb{R}$ zbiór $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$ jest bazą przestrzeni $M_2(\mathbb{R})$?

Zadanie 4.49. Niech

$$v_1 = (1, 2, 0), \quad v_2 = (0, 1, 2), \quad v_3 = (2, 0, 1).$$

Dla jakich $p \in \mathbb{P}$ zbiór $\{v_1, v_2, v_3\}$ jest bazą przestrzeni \mathbb{F}_p^3 ?

Zadanie 4.50. Znajdź bazę i wymiar przestrzeni rozwiązań układu równań liniowych zadanego macierzą

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 5 & 0 \end{array} \right].$$

Zadanie 4.51. Dopełnij wektory $v_1 = (1, 2, 3, -2, -4)$ oraz $v_2 = (6, 4, -5, -4, -1)$ do bazy przestrzeni rozwiązań układu równań liniowych zadanego macierzą

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right].$$

Zadanie 4.52. Znajdź bazę przestrzeni rozwiązań układu równań

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 7x_4 = 0 \\ 4x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

i dopełnij ją do bazy przestrzeni

$$\text{Lin}((1, -2, -1, 2), (4, -1, 5, -6), (2, -3, 6, -5)).$$

Zadanie 4.53. Niech $X = \mathbb{F}_{13}^4$ oraz

$$U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in X : x_1 + x_2 + x_4 = 0 \text{ oraz } x_3 - x_4 = 0\}.$$

Wyznacz bazę i wymiar przestrzeni U . Ile elementów ma ta przestrzeń? Opisz równaniem podprzestrzeń $V = U + \text{Lin}((1, 1, 1, 2)) \subseteq X$.

Zadanie 4.54. Znajdź bazę i wymiar przestrzeni wektorowej

$$V = \left\{ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{C}) : a_{11} + a_{12} + a_{21} + a_{22} = 0 \right\}$$

nad ciałem \mathbb{C} . Podaj współrzędne macierzy

$$A = \begin{bmatrix} 2+i & -1 \\ -2 & 1-i \end{bmatrix} \in V$$

w znalezionej bazie. Jaki jest wymiar V nad \mathbb{R} ?

Zadanie 4.55. Przypuśćmy, że zbiór B jest bazą przestrzeni liniowej V nad ciałem \mathbb{C} . Dowiedz, że zbiór $B \cup iB$ (oczywiście $iB = \{iv : v \in B\}$) jest bazą przestrzeni V nad ciałem \mathbb{R} . W szczególności $\dim_{\mathbb{R}} V = 2 \dim_{\mathbb{C}} V$.

Zadanie 4.56. Załóżmy, że K jest podciałem ciała L oraz, że V jest przestrzenią liniową nad L . Pokaż, że gdy zbiór A jest bazą L nad K , zaś zbiór B jest bazą V nad L , to zbiór $\{\alpha v : (\alpha, v) \in A \times B\}$ jest bazą V nad K . W szczególności $\dim_K V = (\dim_K L)(\dim_L V)$.

Zadanie 4.57. Przypuśćmy, że K jest ciałem oraz $n \geq 1$. Niech $V = K^n$ i zdefiniujmy funkcję $f: V \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ wzorem

$$f(x_1, \dots, x_n) = \min\{i \in \{1, \dots, n\} : x_i \neq 0\}.$$

Pokaż, że gdy $\{e_1, \dots, e_n\}$ jest bazą przestrzeni V , to istnieje taka baza $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ przestrzeni V , że $v_i \in \text{Lin}(e_1, \dots, e_i)$ dla $1 \leq i \leq n$ oraz $f(B) = \{1, \dots, n\}$ (tzn. liczby $f(v_1), \dots, f(v_n)$ są parami różne).

Zadanie 4.58. Niech $V = \mathbb{R}^4$ oraz

$$U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in V : x_1 + 2x_4 = 0, x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 4x_4 = 0\}.$$

Wyznacz bazę i wymiar przestrzeni V/U .

Zadanie 4.59. Niech $V = \mathbb{R}^5$ oraz

$$U = \text{Lin}((1, 2, 3, 2, 1), (5, 1, 7, 10, 1), (-1, 2, 1, -2, 1)).$$

Wyznacz bazę i wymiar przestrzeni V/U .

Zadanie 4.60. Niech $X = \mathbb{R}[x]$ oraz

$$U = \{f \in X : f(0) = f(1) = 0\}, \quad V = \{f \in X : f(0) = f(1)\}.$$

Uzasadnij, że $U \subseteq V$ są podprzestrzeniami przestrzeni X i oblicz wymiary przestrzeni X/U , X/V oraz V/U .

Zadanie 4.61. Niech $V = C(\mathbb{R})$ oraz $X = [0, 1]$. Sprawdź, że

$$U = \{f \in V : f(x) = 0 \text{ dla każdego } x \in X\}$$

jest podprzestrzenią V oraz $C(X) \cong V/U$.

Zadanie 4.62. Rozważmy \mathbb{R} jako przestrzeń liniową nad ciałem \mathbb{Q} . Wykaż, że:

- (1) gdy $V = \mathbb{R}^2$ oraz $U = \{(x, y) \in V : x + y \in \mathbb{Q}\}$, to $V/U \cong \mathbb{R}/\mathbb{Q}$.
- (2) gdy $V = \mathbb{R}^3$ oraz $U = \{(x, y, z) \in V : x - y, y - z \in \mathbb{Q}\}$, to $V/U \cong (\mathbb{R}/\mathbb{Q})^2$.

Zadanie 4.63. Rozważmy \mathbb{C} jako przestrzeń wektorową nad ciałem \mathbb{Q} . Uzasadnij, że

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{C}^3 : x = y = z\},$$

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{C}^3 : x + \mathbb{Q} = y + \mathbb{Q} = z + \mathbb{Q}\}$$

są \mathbb{Q} -podprzestrzeniami przestrzeni \mathbb{C}^3 oraz sprawdź, że $V/U \cong \mathbb{Q}^2$.

Zadanie 4.64. Załóżmy, że U jest podprzestrzenią przestrzeni liniowej V nad ciałem K .

- (1) Udowodnij, że $\dim V = \dim U + \dim V/U$. W szczególności gdy $\dim V < \infty$, to $\dim V/U = \dim V - \dim U$.
- (2) Wskaż przykład takiej przestrzeni wektorowej V oraz jej podprzestrzeni U , że zachodzi $\dim U = \dim V/U = \dim V$.

Uwaga. Liczba

$$\operatorname{codim} U = \dim V/U$$

bywa często nazywana *kowymiarem* podprzestrzeni U w przestrzeni V .

Zadanie 4.65. Niech S będzie zbiorem skończonym. Rozważmy przestrzeń wektorową $V = \mathcal{P}(S)$ nad ciałem \mathbb{F}_2 z działaniami

$$A + B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \quad \text{oraz} \quad \lambda \cdot A = \begin{cases} \emptyset & \text{gdy } \lambda = 0, \\ A & \text{gdy } \lambda = 1. \end{cases}$$

Wyznacz bazę i wymiar przestrzeni V . Zinterpretuj w języku teorii zbiorów co znaczy, że wektory $A, B, C \in V$ są liniowo niezależne.

Zadanie 4.66. Niech $n \geq 1$ oraz $V = \{f \in \mathbb{R}[x] : \deg f \leq n\}$. Sprawdź, że dla dowolnego $a \in \mathbb{R}$ zbiór $B = \{(x-a)^j : 0 \leq j \leq n\}$ (gdy $j=0$, to $(x-a)^j = 1$) jest bazą przestrzeni liniowej V . Znajdź współrzędne wielomianu $f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j \in V$ w bazie B .

Zadanie 4.67. Wyznacz bazę podprzestrzeni $V \subseteq \mathbb{R}[x]$, gdy:

- (1) $V = \{f \in \mathbb{R}[x] : f(1) = f(2) = 0\}$.
- (2) $V = \{f \in \mathbb{R}[x] : f(2-3i) = 0\}$.
- (3) $V = \{f \in \mathbb{R}[x] : f'(3) = f''(3) = 0\}$.

Zadanie 4.68. Załóżmy, że U jest podprzestrzenią przestrzeni wektorowej V nad ciałem K . Dowiedz, że liniowo niezależny podzbiór $S \subseteq V$ można dopełnić do bazy przestrzeni V wektorami z U wtedy i tylko wtedy, gdy $U + \operatorname{Lin}(S) = V$.

Zadanie 4.69. Niech U, V, W będą podprzestrzeniami przestrzeni wektorowej X nad ciałem K . Wykaż, że gdy $X = U \oplus W = V \oplus W$ oraz $\{v_i : i \in I\}$ jest bazą przestrzeni V , to $\dim U = \dim V$ i istnieje taki podzbiór $\{w_i : i \in I\} \subseteq W$, że zbiór $\{v_i + w_i : i \in I\}$ jest bazą przestrzeni U .

Zadanie 4.70. Załóżmy, że V jest przestrzenią liniową nad ciałem K . Niech $n \geq 1$ oraz $v_0, \dots, v_n \in V$. Pokaż, że gdy $v_0 \notin \operatorname{Lin}(v_1, \dots, v_n)$ oraz $v_0 + v_n \in \operatorname{Lin}(v_0, \dots, v_{n-1})$, to $\dim \operatorname{Lin}(v_1, \dots, v_n) < n$.

Zadanie 4.71. Niech V będzie skończenie wymiarową przestrzenią liniową nad ciałem K . Wykaż, że gdy $n > \dim V$, to dla dowolnych wektorów $v_0, \dots, v_n \in V$ istnieją takie, nie wszystkie równe zeru, skalary $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in K$, że $\sum_{i=0}^n \lambda_i = 0$ oraz $\sum_{i=0}^n \lambda_i v_i = 0$.

Zadanie 4.72. Niech $n \geq 1$. Załóżmy, że V jest przestrzenią wektorową spełniającą $\dim V \geq n$. Uzasadnij, że istnieją takie liniowo zależne wektory $v_0, \dots, v_n \in V$, że każdy właściwy podzbiór zbioru $\{v_0, \dots, v_n\}$ jest liniowo niezależny.

Zadanie 4.73. Dla jakich $t \in \mathbb{C}$ układ wektorów $v_1 = (1, 2, -1)$, $v_2 = (1, 1, 1)$ oraz $v_3 = (1, t, -3)$ jest bazą przestrzeni \mathbb{C}^3 ? Dla każdego takiego t wyznacz współrzędne wektora $v = (1, 2, i) \in \mathbb{C}^3$ w tej bazie.

Zadanie 4.74. Czy istnieje baza przestrzeni \mathbb{Q}^3 , w której wektory $v_1 = (0, 2, 1)$ oraz $v_2 = (1, 1, 2)$ mają współrzędne, odpowiednio, $(1, 2, -1)$ oraz $(0, 0, 1)$?

Zadanie 4.75. Niech X będzie przestrzenią liniową spełniającą $\dim X = n < \infty$. Dla jakich trójek $(p, q, r) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ istnieją takie podprzestrzenie U, V przestrzeni X , że $\dim U = p$, $\dim V = q$ oraz $\dim(U \cap V) = r$?

Zadanie 4.76. Załóżmy, że U, V skończenie wymiarowymi podprzestrzeniami pewnej przestrzeni liniowej. Pokaż, że:

- (1) gdy $\dim U \leq \dim V$ oraz $\dim(U + V) = \dim(U \cap V) + 1$, to $U \subseteq V$.
- (2) gdy $\dim U < \dim V$ oraz $\dim(U + V) = \dim(U \cap V) + 2$, to $U \subseteq V$.

Zadanie 4.77. Załóżmy, że $U, V \neq 0$ są podprzestrzeniami przestrzeni wektorowej X . Przypuśćmy, iż istnieje taka funkcja $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, że $f(u) < f(v)$ dla dowolnych $0 \neq u \in U$ oraz $0 \neq v \in V$. Uzasadnij, że $\dim U + \dim V \leq \dim X$.

Zadanie 4.78. Załóżmy, że K jest ciałem zawierającym \mathbb{C} . Udowodnij, że gdy wymiar przestrzeni liniowej K nad ciałem \mathbb{C} jest skończony, to $K = \mathbb{C}$.

Zadanie 4.79. Niech $U = \text{Lin}((1, 3, 2, 5), (3, 5, 1, 7), (1, 3, s, 8)) \subseteq \mathbb{R}^4$, zaś $V \subseteq \mathbb{R}^4$ będzie przestrzenią rozwiązań układu równań

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + 6x_3 + 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 + tx_4 = 0. \end{cases}$$

Wyznacz wymiary przestrzeni U oraz V w zależności od parametrów $s, t \in \mathbb{R}$. Dla jakich par $(s, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ zachodzi $U + V = \mathbb{R}^4$?

Zadanie 4.80. Niech $n \geq 1$. Załóżmy, że zbiory $A_0, \dots, A_n \subseteq \{1, \dots, n\}$ są niepuste. Dowiedz, iż istnieją niepuste oraz rozłączne podzbiory $I, J \subseteq \{0, \dots, n\}$ o tej własności, że $\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{j \in J} A_j$.

Zadanie 4.81. Funkcję $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ nazywamy *addytywną*, gdy $f(x + y) = f(x) + f(y)$ dla dowolnych $x, y \in \mathbb{R}$. Udowodnij, że każda ciągła funkcja addytywna $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ jest *liniowa*, tzn. postaci $f(x) = ax$ dla pewnego $a \in \mathbb{R}$. Czy pomijając założenie ciągłości funkcji f teza o jej liniowości pozostanie prawdziwa?

Zadanie 4.82. Załóżmy, że $f \in \text{Map}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Uzasadnij, że:

- (1) gdy $f(x) = x$ dla $x \in \mathbb{R}$, to f jest sumą dwóch funkcji okresowych.
- (2) gdy $f(x) = x^2$ dla $x \in \mathbb{R}$, to f jest sumą trzech funkcji okresowych, ale nie jest sumą dwóch funkcji okresowych.

Zadanie 4.83. Niech K będzie właściwym podciałem ciała L . Czy istnieje taka baza B przestrzeni L nad K , że:

- (1) $xy \in B$ dla dowolnych $x, y \in B$?
- (2) $x/y \in B$ dla dowolnych $x, y \in B$?

Uwaga. Niektóre bazy Hamela (tzn. bazy \mathbb{R} nad \mathbb{Q}) mają ciekawe własności. Przykładowo istnieje baza Hamela B spełniająca $x^n \in B$ dla dowolnego $x \in B$ oraz $n \in \mathbb{N}$.

Zadanie 4.84. Niech U, V będą podprzestrzelniami przestrzeni liniowej X . Dowiedz, że gdy $\dim U + \dim V = \dim X < \infty$, to $U \cap V = 0 \iff U + V = X$. Czy równoważność pozostanie prawdziwa bez założenia $\dim X < \infty$?

Zadanie 4.85. Załóżmy, że V jest przestrzenią wektorową. Pokaż, że następujące warunki są równoważne:

- (1) wymiar przestrzeni V jest nieskończony.
- (2) dla dowolnego $n \geq 1$ istnieje układ n liniowo niezależnych wektorów w V .
- (3) istnieje taki zbiór $\{v_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq V$, że wektory v_1, \dots, v_n są liniowo niezależne dla dowolnego $n \in \mathbb{N}$.

Zadanie 4.86. Niech V będzie przestrzenią liniową nad ciałem K . Załóżmy, że zbiór $\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ jest bazą przestrzeni V i zdefiniujmy $V_n = \text{Lin}(e_1, \dots, e_n)$ dla $n \in \mathbb{N}$.

- (1) Uzasadnij, że gdy podprzestrzeń $U \subseteq V$ jest skończonego wymiaru, to $U \subseteq V_n$ dla pewnego $n \in \mathbb{N}$.
- (2) Skonstruuj taką podprzestrzeń $U \subseteq V$, że $U \neq V$ oraz $U + \text{Lin}(v) = V$ dla dowolnego $v \in V \setminus U$.

Zadanie 4.87. Załóżmy, że V jest przestrzenią wektorową. Udowodnij, że następujące warunki są równoważne:

- (1) $\dim V < \infty$.
- (2) dla dowolnej rodziny podprzestrzeni $(V_i)_{i \in I}$ przestrzeni V z warunku $\sum_{i \in I} V_i = V$ wynika, że $\sum_{i \in F} V_i = V$ dla pewnego skończonego podzbioru $F \subseteq I$.
- (3) dla dowolnej rodziny podprzestrzeni $(V_i)_{i \in I}$ przestrzeni V z warunku $\bigcap_{i \in I} V_i = 0$ wynika, że $\bigcap_{i \in F} V_i = 0$ dla pewnego skończonego podzbioru $F \subseteq I$.

Uwaga. Warunki (2) oraz (3) definiują pojęcia *skończonej generowalności* oraz *skończonej kogenerowalności*, odpowiednio. Powyższe zadanie pokazuje, że w kategorii przestrzeni liniowych warunki te są równoważne ze skończonością wymiaru. Warunki (2) oraz (3) nie są jednak równoważne w innych kategoriach modułów (np. w kategorii grup abelowych).

Zadanie 4.88. Załóżmy, że K jest ciałem spełniającym $|K| = q < \infty$. Niech $1 \leq d \leq n$.

- (1) Ile jest baz uporządkowanych/nieuporządkowanych w przestrzeni K^n ?
- (2) Ile jest d -wymiarowych podprzestrzeni liniowych w przestrzeni K^n ?
- (3) Ile jest wszystkich podprzestrzeni liniowych w przestrzeni K^n ?

Zadanie 4.89. Załóżmy, że V jest przestrzenią wektorową nad ciałem K . Wykaż, że gdy $\dim V > 1$ oraz $|K| = q < \infty$, to istnieją takie właściwe podprzestrzenie V_0, \dots, V_q przestrzeni V , że $V = V_0 \cup \dots \cup V_q$.

Zadanie 4.90. Załóżmy, że $V \neq 0$ jest przestrzenią wektorową, natomiast $T \subseteq V$ jest takim podzbiorem, że $\text{Lin}(T \setminus F) = V$ dla dowolnego skończonego podzbioru $F \subseteq T$. Udowodnij, że istnieje nieskończony podzbiór $S \subseteq T$ spełniający $\text{Lin}(T \setminus S) = V$.

Zadanie 4.91. Załóżmy, że X jest przestrzenią wektorową nad ciałem K spełniającym $|K| > 2$. Wykaż, że gdy U, V są podprzestrzeniami właściwymi w X , to istnieje taka baza B przestrzeni X , że $B \cap (U \cup V) = \emptyset$. Czy teza pozostaje prawdziwa gdy $|K| = 2$?

Zadanie 4.92. Niech $n \geq 1$. Załóżmy, że U, V, W są n -wymiarowymi podprzestrzeniami przestrzeni liniowej X . Pokaż, że gdy $\dim(U \cap V) = \dim(V \cap W) = \dim(W \cap U) = n - 1$, to $\dim(U + V + W) = n + 1$ lub $U \cap V = V \cap W = W \cap U$.

Zadanie 4.93. Niech X będzie przestrzenią liniową spełniającą $2 \leq \dim X = n < \infty$. Załóżmy, że $U \neq V$ są podprzestrzeniami przestrzeni X . Dowiedz, że:

- (1) gdy $\dim U = \dim V = n - 1$, to $\dim(U \cap V) = n - 2$.
- (2) gdy $\dim U = \dim V$ oraz $\dim(U \cap V) = n - 2$, to $X = U + V$.

Zadanie 4.94. Niech $d \geq 1$. Przypuśćmy, że $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ jest taką rodziną d -wymiarowych podprzestrzeni pewnej przestrzeni liniowej, że $\dim(V_i \cap V_j) = d - 1$ dla dowolnych $i \neq j$. Uzasadnij, że $\dim(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} V_n) = d - 1$ lub $\dim(\sum_{n \in \mathbb{N}} V_n) = d + 1$.

Zadanie 4.95. Załóżmy, że V jest skończenie wymiarową przestrzenią liniową nad ciałem nieprzeliczalnym K (tzn. spełniającym $|K| > \aleph_0$). Dowiedz, że gdy $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ jest rodziną właściwych podprzestrzeni V , to $V \neq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} V_n$. Czy teza pozostaje prawdziwa gdy wymiar przestrzeni V jest nieskończony lub gdy ciało K jest co najwyżej przeliczalne?

Zadanie 4.96. Pokaż, że gdy V jest przestrzenią liniową nad ciałem K oraz $\dim V = 2n$ dla pewnego $n \geq 1$, to istnieje taka rodzina $(V_\lambda)_{\lambda \in K}$ podprzestrzeni przestrzeni V , że $\dim V_\lambda = n$ dla $\lambda \in K$ oraz $V_\lambda \cap V_\mu = 0$ dla $\lambda \neq \mu$.

Zadanie 4.97. Załóżmy, że V jest przestrzenią wektorową nieskończonego wymiaru. Udowodnij, iż istnieje taka rodzina $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nieskończenie wymiarowych podprzestrzeni przestrzeni V , że $V_i \cap V_j = 0$ dla $i \neq j$.

Zadanie 4.98. Załóżmy, że V jest przestrzenią liniową nad ciałem K . Dowiedz, że gdy $U \subseteq V$ jest taką podprzestrzenią, że przestrzeń V/U jest nieskończonego wymiaru, to istnieje taka rodzina $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ podprzestrzeni V , że $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n \subseteq U$, ale $\bigcap_{i=1}^n U_i \not\subseteq U$ dla każdego $n \in \mathbb{N}$.

Zadanie 4.99. Załóżmy, że X jest przestrzenią wektorową. Oznaczmy przez $\text{Lat}_0(X)$ rodzinę wszystkich skończenie wymiarowych podprzestrzeni przestrzeni X i zdefiniujmy funkcję $\rho: \text{Lat}_0(X) \times \text{Lat}_0(X) \rightarrow \mathbb{R}$ wzorem

$$\begin{aligned} \rho(U, V) &= \dim(U + V) - \dim(U \cap V) \\ &= \dim U + \dim V - 2 \dim(U \cap V). \end{aligned}$$

Uzasadnij, że:

- (1) $\rho(U, V) = 0 \iff U = V$ dla $U, V \in \text{Lat}_0(X)$.
- (2) $\rho(U, V) = \rho(V, U)$ dla $U, V \in \text{Lat}_0(X)$.
- (3) $\rho(U, W) \leq \rho(U, V) + \rho(V, W)$ dla $U, V, W \in \text{Lat}_0(X)$.

Uwaga. Para $(\text{Lat}_0(X), \rho)$ jest przykładem struktury nazywanej *przestrzenią metryczną*.

Zadanie 4.100 (a co jeśli K nie jest ciałem?). Trójkę $(R, +, \cdot)$ nazywamy *pierścieniem* (łącznym, przemennym i z jedyką), gdy $(R, +, \cdot)$ spełnia wszystkie aksjomaty ciała prócz (ewentualnie) wymagania, by dla dowolnego $0 \neq a \in R$ istniał taki element $b \in R$, że $ab = 1$ (0 i 1 oznaczają, odpowiednio, element neutralny dodawania i mnożenia w R). Tak samo jak przestrzeń wektorową nad ciałem definiujemy *moduł* nad pierścieniem R (spełniony ma być ten sam zestaw aksjomatów). Pojęcia kombinacji liniowej oraz liniowej niezależności wektorów (elementy modułu także nazywamy wektorami) definiujemy tak, jak dla przestrzeni wektorowych.

- (1) Wiadomo, że każdy minimalny zbiór generatorów przestrzeni wektorowej V jest bazą tej przestrzeni, zatem ma $\dim V$ elementów. Sprawdź, że \mathbb{Z} jako moduł nad \mathbb{Z} posiada minimalne zbiory generatorów o dowolnej skończonej mocy.
- (2) Wiadomo, że każdy maksymalny liniowo niezależny podzbiór przestrzeni liniowej jest jej bazą. Udowodnij, że \mathbb{Z} jako moduł nad \mathbb{Z} posiada maksymalny liniowo niezależny podzbiór, który nie jest bazą.
- (3) Wiadomo, że każda przestrzeń wektorowa posiada bazę. Podaj przykład pierścienia R oraz modułu M nad R , który nie posiada bazy.

Uwaga. Jeśli moduł nad pierścieniem posiada bazę, to każde dwie bazy tego modułu są równoliczne. Fakt ten przestaje być prawdziwy, gdy zrezygnujemy w definicji pierścienia z przemienności mnożenia (mówi się wtedy o *pierścieniach nieprzemennych*), tzn. istnieje taki pierścień nieprzemienny R oraz moduł nad R , który ma bazy skończone różnej mocy (o takim pierścieniu mówimy, że nie ma własności *Invariant Basis Number*).

5 Macierze

Zadanie 5.1. Oblicz rzędy macierzy:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 2 & -3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & -2 & -1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & -5 & 3 & -4 \\ -3 & -1 & -2 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1+i & -1 & 3-2i \\ 0 & 2+3i & -1 \\ 0 & 5-i & 9 \\ -1 & 8 & 7i \end{bmatrix}.$$

Zadanie 5.2. Wyznacz rzędy macierzy:

$$\begin{bmatrix} a & -b & 1 \\ b & a & 1 \\ 1 & 1 & c \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 10 & -1 & -1 & 3 \\ 2s & -3 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & t+3 & 3 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & t^2-2t & 7 & 10 \\ 4 & 5 & 3 & -t & -2 \end{bmatrix}$$

w zależności od parametrów $a, b, c \in \mathbb{R}$ oraz $s, t \in \mathbb{C}$.

Zadanie 5.3. Dla jakich $x \in \mathbb{R}$ zachodzi

$$\text{rank} \begin{bmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{bmatrix} = 3?$$

Zadanie 5.4. Niech $n \geq 1$ oraz $A, B \in M_n(\mathbb{C})$. Udowodnij lub podaj kontrprzykład:

- (1) jeśli $A^2 = B^2$, to $A = B$ lub $A = -B$.
- (2) jeśli $\text{rank } A = \text{rank } B$, to $\text{rank } A^2 = \text{rank } B^2$.
- (3) jeśli $\text{rank } AB = 0$, to $\text{rank } BA = 0$.
- (4) jeśli $\text{rank } AB = 0$, to $\text{rank } A = 0$ lub $\text{rank } B = 0$.

Zadanie 5.5. Załóżmy, że K jest ciałem oraz $n \geq 1$. Pokaż, że dla dowolnych macierzy $A, B \in M_n(K)$ zachodzi:

- (1) $\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank } A, \text{rank } B\}$.
- (2) $\text{rank}(A+B) \leq \text{rank } A + \text{rank } B$.
- (3) $\text{rank } A + \text{rank } B \leq \text{rank}(AB) + n$.

Zadanie 5.6. Załóżmy, że K jest ciałem oraz $n, m \geq 1$. Niech $A \in M_{n,m}(K)$. Dowiedz, że $\text{rank } A = r \geq 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją takie macierze $P \in GL_n(K)$ oraz $Q \in GL_m(K)$, że $A = PBQ$, gdzie macierz $B \in M_{n,m}(K)$ ma postać blokowo-diagonalną

$$B = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Zadanie 5.7. Załóżmy, że K jest ciałem oraz $n \geq 1$. Niech $A, B \in M_n(K)$. Udowodnij, że gdy $AB = 0$, to $\text{rank } A + \text{rank } B \leq n$.

Zadanie 5.8. Niech $n \geq 1$ oraz K będzie ciałem. Wykaż, że dla dowolnej macierzy $A \in M_n(K)$ istnieje taka macierz $B \in M_n(K)$, że $AB = 0$ oraz $\text{rank } A + \text{rank } B = n$.

Zadanie 5.9. Niech K będzie ciałem oraz $n \geq 1$. Załóżmy, że macierze $A, B, C \in M_n(K)$ spełniają oraz $AB = AC$. Jaki jest największy możliwy rząd macierzy $B - C$?

Zadanie 5.10. Niech K będzie ciałem oraz $n, m \geq 1$. Dowiedz, że macierz $A \in M_{n,m}(K)$ spełnia $\text{rank } A = 1$ wtedy i tylko wtedy, gdy $A = BC$ dla pewnych $0 \neq B \in M_{n,1}(K)$ oraz $0 \neq C \in M_{1,m}(K)$.

Zadanie 5.11. Załóżmy, że K jest ciałem oraz $n, m, p, q \geq 1$. Niech $A \in M_{n,m}(K)$ oraz $B \in M_{p,q}(K)$. Udowodnij, że $\text{rank } A \leq \text{rank } B$ wtedy i tylko wtedy, gdy $A = PBQ$ dla pewnych macierzy $P \in M_{n,p}(K)$ oraz $Q \in M_{q,m}(K)$.

Zadanie 5.12. Niech K będzie ciałem oraz $n \geq 1$. Wykaż, że gdy macierz $A \in M_n(K)$ spełnia $\text{rank } A = r \geq 1$, to istnieją takie macierze $A_1, \dots, A_r \in M_n(K)$, że zachodzi $A = A_1 + \dots + A_r$ oraz $\text{rank } A_i = 1$ dla $1 \leq i \leq r$.

Zadanie 5.13. Niech $n \geq 1$ oraz $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Rozważmy macierz A rozmiaru $n! \times n$, której wierszami są wszystkie możliwe permutacje ciągu a_1, \dots, a_n . Wyznacz możliwe wartości liczby $\text{rank } A$.

Zadanie 5.14. Niech $n, m \geq 1$ oraz $A \in M_{n,m}(\mathbb{R})$. Wykaż, że

$$\text{rank}(A^t A) = \text{rank } A = \text{rank}(AA^t).$$

Czy powyższa równość pozostaje prawdziwa gdy ciało \mathbb{R} zastąpimy przez \mathbb{C} ?

Uwaga. Mówimy, że ciało F jest *formalnie rzeczywiste*, gdy dla dowolnego $n \geq 1$ oraz dowolnych $x_1, \dots, x_n \in F$ zachodzi $x_1^2 + \dots + x_n^2 = 0 \implies x_1 = \dots = x_n = 0$. Łatwo się przekonać, że ciało K jest formalnie rzeczywiste wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnych $n, m \geq 1$ oraz dowolnej macierzy $A \in M_{n,m}(K)$ jest $\text{rank}(A^t A) = \text{rank } A = \text{rank}(AA^t)$.

Zadanie 5.15. Niech $n \geq 1$ oraz $A, B \in M_n(\mathbb{C})$. Rozważmy macierz $M \in M_{2n}(\mathbb{C})$ daną w postaci blokowej

$$M = \begin{bmatrix} A & AB \\ B & B + B^2 \end{bmatrix}.$$

Wykaż, że $\text{rank } M = \text{rank } A + \text{rank } B$.

Zadanie 5.16. Załóżmy, że K jest ciałem oraz $n \geq 1$. Dla $1 \leq i, j \leq n$ oznaczmy przez $E_{ij} \in M_n(K)$ macierz, której (i, j) -ty wyraz równy jest 1, natomiast pozostałe wyrazy równe są 0 (macierze E_{ij} nazywamy *jedynkami macierzowymi*).

- (1) Sprawdź, że zbiór $\{E_{ij} : 1 \leq i, j \leq n\}$ stanowi bazę przestrzeni $M_n(K)$ nad K .
- (2) Udowodnij, że $E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}$ dla dowolnych $1 \leq i, j, k, l \leq n$.
- (3) Niech $0 \neq \lambda \in K$ oraz $i \neq j$. Jakiej operacji elementarnej odpowiada mnożenie danej macierzy z lewej/prawej strony przez macierz $E_{ij}(\lambda) = I + \lambda E_{ij}$ (macierze $E_{ij}(\lambda)$ nazywane są *transwekcjami*)?
- (4) Niech $0 \neq \lambda \in K$ oraz $1 \leq i \leq n$. Jakiej operacji elementarnej odpowiada mnożenie danej macierzy z lewej/prawej strony przez macierz $D_i(\lambda) = I + (\lambda - 1)E_{ii}$?

- (5) Niech $i \neq j$. Jakiej operacji elementarnej odpowiada mnożenie danej macierzy z lewej/prawej strony przez macierz $T_{ij} = I + E_{ij} + E_{ji} - E_{ii} - E_{jj}$?
- (6) Wykaż, że każda macierz T_{ij} dla $i \neq j$ da się przedstawić jako iloczyn transwekcji oraz macierzy z punktu (4).

Zadanie 5.17. Przedstaw macierz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$$

jako iloczyn macierzy operacji elementarnych.

Zadanie 5.18. Niech

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}).$$

Oblicz A^n dla $n \geq 1$. Jakie tożsamości wynikają z równości $A^{n+m} = A^n A^m$ dla $n, m \geq 1$?

Zadanie 5.19. Niech

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix} \in M_3(\mathbb{C}).$$

Oblicz A^n dla $n \geq 1$.

Zadanie 5.20. Rozważmy macierze $A, B, C \in M_3(\mathbb{Q})$ postaci:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Czy istnieje takie $n \in \mathbb{N}$, że $AB^n = C$?

Zadanie 5.21. Niech

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \in M_3(\mathbb{Q}).$$

Dowiedź, iż dla dowolnego $n \geq 1$ istnieją takie liczby $a_n, b_n \in \mathbb{Z}$, że $A^n = a_n A^2 + b_n A$. Spróbuj wyznaczyć ciągi $(a_n)_{n=1}^\infty$ oraz $(b_n)_{n=1}^\infty$.

Zadanie 5.22. Niech

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \in M_4(\mathbb{R}), \quad B = \begin{bmatrix} 2a & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 2a & 0 & -1 \\ 1 & 0 & a & -1 \\ 0 & 1 & -1 & a \end{bmatrix} \in M_4(\mathbb{R}).$$

Dla jakich $a \in \mathbb{R}$ macierze A, B są *przemienne* (tzn. spełniają $AB = BA$)?

Zadanie 5.23. Niech K będzie ciałem oraz $n \geq 1$. Opisz wszystkie macierze $A \in M_n(K)$ o tej własności, że $AB = BA$ dla dowolnej macierzy $B \in M_n(K)$.

Zadanie 5.24. Dla jakich $n \in \mathbb{N}$ zbiór

$$K = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ nb & a \end{bmatrix} : a, b \in \mathbb{Q} \right\},$$

z działaniami dziedzicznymi z $M_2(\mathbb{Q})$, jest ciałem?

Zadanie 5.25. Twierdzenie Fermata o sumie dwóch kwadratów mówi, że liczba $p \in \mathbb{P}$ jest sumą dwóch kwadratów (tzn. $p = n^2 + m^2$ dla pewnych $n, m \in \mathbb{N}$) wtedy i tylko wtedy, gdy $p \not\equiv 3 \pmod{4}$. Natomiast Małe Twierdzenie Fermata orzeka, że gdy $p \in \mathbb{P}$, to $a^p \equiv a \pmod{p}$ dla dowolnego $a \in \mathbb{Z}$. Wykorzystując te twierdzenia wyznacz te liczby $p \in \mathbb{P}$, dla których zbiór

$$K = \left\{ \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} : a, b \in \mathbb{F}_p \right\},$$

z działaniami dziedzicznymi z $M_2(\mathbb{F}_p)$, jest ciałem.

Uwaga. Bardzo pomysłowy dowód twierdzenia Fermata o sumie dwóch kwadratów można znaleźć w artykule D. Zagier, *A One-Sentence Proof That Every Prime $p \equiv 1 \pmod{4}$ Is a Sum of Two Squares*, Amer. Math. Monthly **97** (1990), 144.

Zadanie 5.26. Rozważmy macierze zespolone:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & i \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & i & 1 \\ 0 & i & 1 \\ 1 & 2 & i \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & i & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Rozwiąż równanie $AX + XB = C$ o niewiadomej $X \in M_{2,3}(\mathbb{C})$.

Zadanie 5.27. Rozwiąż w zbiorze $M_2(\mathbb{C})$ równania kwadratowe:

$$X^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad X^2 = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 6 & 0 \end{bmatrix}, \quad X^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Zadanie 5.28. Niech $n \geq 1$. Czy istnieją takie macierze $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, że $AB - BA = I$? Co w przypadku, gdy ciało \mathbb{R} zastąpimy innym ciałem?

Zadanie 5.29. Niech K będzie ciałem oraz $n \geq 1$. Wprowadźmy *komutator* macierzy $A, B \in M_n(K)$ formułą

$$[A, B] = AB - BA.$$

Zdefiniujmy $S = \{[A, B] : A, B \in M_n(K)\}$. Wyznacz bazę oraz wymiar podprzestrzeni $V = \text{Lin}(S) \subseteq M_n(K)$.

Uwaga. Okazuje się, że $V = S$ (gdy $\text{char } K = 0$, to dowód tego faktu jest prostszy). Warto zajrzeć do pracy A. A. Albert, B. Muckenhoupt, *On matrices of trace zero*, Michigan Math. J. **4** (1957), 1–3.

Zadanie 5.30. Załóżmy, że K jest ciałem charakterystyki $\neq 2$ oraz $A \in M_2(K)$. Wykaż, że $\text{tr } A = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $A = B + C$ dla pewnych macierzy $B, C \in M_2(K)$ spełniających $B^2 = C^2 = 0$. Czy teza pozostanie prawdziwa, gdy $\text{char } K = 2$?

Uwaga. Załóżmy, że K jest dowolnym ciałem. Niech $\text{char } K = p \geq 0$ oraz $n \geq 1$. Macierz bezśladowa $A \in M_n(K)$ (tzn. spełniająca $\text{tr } A = 0$) da się zapisać jako suma dwóch macierzy nilpotentnych gdy $p \nmid n$ lub gdy A nie jest macierzą skalarną (tzn. postaci $A = \lambda I$ dla pewnego $\lambda \in K$). W przeciwnym wypadku (tzn. $p \mid n$ oraz $A = \lambda I$ dla pewnego $\lambda \in K$) macierz A da się zapisać jako suma trzech macierzy nilpotentnych. Warto zajrzeć do prac J. D. Botha, *Sums of two square-zero matrices over an arbitrary field*, *Linear Algebra Appl.* **436** (2012), 516–524 oraz S. Breaz, G. Călugăreanu, *Sums of nilpotent matrices*, *Linear Multilinear Algebra* **65** (2017), 67–78.

Zadanie 5.31. Niech $S = \{A \in M_2(\mathbb{R}) : A^2 = 0\}$. Czy S jest podprzestrzenią $M_2(\mathbb{R})$? Jeśli nie, to wyznacz $\text{Lin}(S)$ i policz wymiar tej podprzestrzeni.

Zadanie 5.32. Niech $S = \{A \in M_2(\mathbb{R}) : A^2 = A\}$. Czy S jest podprzestrzenią $M_2(\mathbb{R})$? Jeśli nie, to wyznacz $\text{Lin}(S)$ i policz wymiar tej podprzestrzeni.

Uwaga. Warto zajrzeć do artykułu R. E. Hartwig, M. S. Putcha, *When is a matrix a sum of idempotents?*, *Linear Multilinear Algebra* **26** (1990), 279–286.

Zadanie 5.33. Ustalmy $A \in M_2(\mathbb{R})$ oraz zdefiniujmy $V = \{X \in M_2(\mathbb{R}) : AX = XA\}$. Udowodnij, że V jest podprzestrzenią w $M_2(\mathbb{R})$ parzystego wymiaru.

Uwaga. Niech K będzie ciałem oraz $n \geq 1$. Centralizator macierzy $A \in M_n(K)$ określamy jako

$$C(A) = \{X \in M_n(K) : AX = XA\}.$$

Twierdzenie Frobeniusa o centralizatorze mówi, że

$$\dim C(A) = n + 2 \sum_{k=1}^n \deg f_k,$$

gdzie $f_k \in K[x]$ dla $1 \leq k \leq n$ jest największym wspólnym dzielnikiem wszystkich k -tych minorów macierzy charakterystycznej $A - xI \in M_n(K(x))$ dla A . W szczególności gdy n jest parzyste, to także wymiar $\dim C(A)$ jest liczbą parzystą.

Zadanie 5.34. Niech $n \geq 1$ oraz $A \in M_n(\mathbb{C})$. Załóżmy, że równanie $Ax = 0$ ma niezerowe rozwiązanie zespolone. Czy dla pewnego $b \in \mathbb{C}^n$ równanie $A^t x = b$ może mieć dokładnie jedno rozwiązanie zespolone?

Zadanie 5.35. Niech $n \geq 1$ oraz $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$. Przypuśćmy, że $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ (suma po wszystkich $1 \leq j \leq n$ różnych od i) dla dowolnego $1 \leq i \leq n$. Wykaż, że jednorodny układ równań $Ax = 0$ ma dokładnie jedno rozwiązanie.

Zadanie 5.36. Korzystając z twierdzenia Kroneckera–Capellego określ liczbę rozwiązań układu równań liniowych zadanego macierzą

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ s & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 1 & 7 & -4 & 11 & t \end{array} \right]$$

w zależności od parametrów $s, t \in \mathbb{F}_7$.

Zadanie 5.37. Rozważmy układ równań liniowych zadany macierzą

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 3 & 2 \\ 4 & 4 & 7 & t \\ 5 & s & 11 & 0 \\ 2 & -2 & -1 & 3 \end{array} \right].$$

Dla jakich par $(s, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ układ ten:

- (1) jest sprzeczny?
- (2) posiada dokładnie jedno rozwiązanie? Wyznacz to rozwiązanie.
- (3) posiada nieskończenie wiele rozwiązań?

Zadanie 5.38. Załóżmy, że macierze $A \in M_{4,2}(\mathbb{R})$ oraz $B \in M_{2,4}(\mathbb{R})$ spełniają

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- (1) Wyznacz macierz BA . Dlaczego da się to zrobić?
- (2) Podaj przykład macierzy $A_1, A_2 \in M_{4,2}(\mathbb{R})$ oraz $B_1, B_2 \in M_{2,4}(\mathbb{R})$ spełniających $A_1B_1 = A_2B_2$, ale $B_1A_1 \neq B_2A_2$.

Zadanie 5.39. Niech $A \in M_3(\mathbb{Q})$. Wykaż, że $A^5 = I \implies A = I$. Czy teza będzie prawdziwa, gdy zamienimy ciało \mathbb{Q} na \mathbb{R} lub \mathbb{C} ?

Zadanie 5.40. Niech $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Udowodnij, że

$$\begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{bmatrix}.$$

Wykorzystując powyższy wzór uzasadnij, że gdy $\varphi \in \mathbb{R}$, to

$$\begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} \cos n\varphi & -\sin n\varphi \\ \sin n\varphi & \cos n\varphi \end{bmatrix}$$

dla dowolnego $n \geq 1$.

Zadanie 5.41. Zdefiniujmy odwzorowanie $D: \mathbb{C} \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ wzorem

$$D(x + iy) = \begin{bmatrix} x & -y \\ y & x \end{bmatrix}.$$

Sprawdź, że:

- (1) $D(0) = 0$ oraz $D(z_1 + z_2) = D(z_1) + D(z_2)$ dla $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.
- (2) $D(1) = I$ oraz $D(z_1 z_2) = D(z_1)D(z_2)$ dla $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.
- (3) $D(\bar{z}) = D(z)^t$ dla $z \in \mathbb{C}$.

$$(4) \det D(z) = |z|^2 \text{ dla } z \in \mathbb{C}.$$

$$(5) D(z^{-1}) = D(z)^{-1} \text{ dla } 0 \neq z \in \mathbb{C}.$$

Zadanie 5.42. Załóżmy, że $n, m \geq 1$. Sprzężenie hermitowskie macierzy $A \in M_{n,m}(\mathbb{C})$ definiujemy wzorem $A^h = \bar{A}^t$, gdzie \bar{A} oznacza sprzężenie zespolone macierzy A , tzn. $\bar{A} = [\bar{a}_{jk}]$ gdy $A = [a_{jk}]$. Uzasadnij, że $A = 0 \iff A^h A = 0 \iff \text{tr}(A^h A) = 0$.

Zadanie 5.43. Niech $n \geq 1$ oraz $A, B \in M_n(\mathbb{C})$. Udowodnij, że gdy $x^h A x = x^h B x$ dla dowolnego $x \in \mathbb{C}^n$, to $A = B$. Czy teza pozostanie prawdziwa gdy ciało \mathbb{C} zastąpimy ciałem \mathbb{R} ?

Zadanie 5.44 (dwumian Newtona). Załóżmy, że K jest ciałem oraz $n \geq 1$. Dowiedz, że gdy macierze $A, B \in M_n(K)$ są przemieszane, to

$$(A + B)^m = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} A^j B^{m-j}$$

dla dowolnego $m \geq 1$. Czy powyższa równość pozostanie prawdziwa gdy pominiemy założenie $AB = BA$?

Uwaga. Gdy $s \geq 1$, zaś macierze $A_1, \dots, A_s \in M_n(K)$ są parami przemieszane, to można dowieść, że

$$(A_1 + \dots + A_s)^m = \sum_{j_1 + \dots + j_s = m} \frac{m!}{j_1! \dots j_s!} A_1^{j_1} \dots A_s^{j_s}$$

dla dowolnego $m \geq 1$ (jest to uogólnienie dwumianu Newtona).

Zadanie 5.45. Niech $m \geq 1$. Eksponentę macierzy $A \in M_m(\mathbb{C})$ definiujemy wzorem

$$\exp A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} A^n.$$

- (1) Sprawdź, że powyższa definicja jest poprawna (tzn. szeregi definiujące wyrazy macierzy $\exp A$ są zbieżne).
- (2) Pokaż, że $\exp(A + B) = (\exp A)(\exp B)$ dla dowolnych macierzy $A, B \in M_m(\mathbb{C})$ spełniających $AB = BA$. Czy równość $\exp(A + B) = (\exp A)(\exp B)$ pozostaje prawdziwa bez założenia $AB = BA$?
- (3) Oblicz $\exp A$ dla macierzy

$$A = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{C}).$$

Zadanie 5.46. Niech $n \geq 1$ oraz $\lambda \in \mathbb{R}$. Rozważmy macierz

$$A = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda \end{bmatrix} \in M_n(\mathbb{R}).$$

Udowodnij, że gdy $f(x) = \sum_{j=0}^m a_j x^j \in \mathbb{R}[x]$, to macierz $f(A) = \sum_{j=0}^m a_j A^j$ jest postaci

$$f(A) = \begin{bmatrix} f(\lambda) & f'(\lambda) & \frac{f''(\lambda)}{2!} & \cdots & \frac{f^{(n-2)}(\lambda)}{(n-2)!} & \frac{f^{(n-1)}(\lambda)}{(n-1)!} \\ 0 & f(\lambda) & f'(\lambda) & \cdots & \frac{f^{(n-3)}(\lambda)}{(n-3)!} & \frac{f^{(n-2)}(\lambda)}{(n-2)!} \\ 0 & 0 & f(\lambda) & \cdots & \frac{f^{(n-4)}(\lambda)}{(n-4)!} & \frac{f^{(n-3)}(\lambda)}{(n-3)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & f(\lambda) & f'(\lambda) \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & f(\lambda) \end{bmatrix}.$$

Zadanie 5.47 (macierze Pauliego). Niech

$$H = \{A \in M_2(\mathbb{C}) : A^h = A\}.$$

(1) Wykaż, że H jest przestrzenią wektorową nad \mathbb{R} o bazie $\{I, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$, gdzie

$$\sigma_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

(2) Sprawdź, że $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = -i\sigma_1\sigma_2\sigma_3 = I$.

(3) Załóżmy, że K jest ciałem oraz $n \geq 1$. Antykomutator macierzy $A, B \in M_n(K)$ definiujemy formułą

$$\{A, B\} = AB + BA.$$

Uzasadnij, że $\{A, B\} \in H$ dla dowolnych $A, B \in H$.

(4) Udowodnij, że

$$[\sigma_a, \sigma_b] = 2i \sum_{c=1}^3 \varepsilon_{abc} \sigma_c \quad \text{oraz} \quad \{\sigma_a, \sigma_b\} = 2\delta_{ab}I$$

dla dowolnych $1 \leq a, b \leq 3$, gdzie symbol *Levi-Civity* ε_{abc} definiujemy jako

$$\varepsilon_{abc} = \begin{cases} \operatorname{sgn}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ a & b & c \end{pmatrix} & \text{gdy } \{a, b, c\} = \{1, 2, 3\}, \\ 0 & \text{gdy } \{a, b, c\} \neq \{1, 2, 3\}. \end{cases}$$

W szczególności $\sigma_a\sigma_b = \delta_{ab}I + i \sum_{c=1}^3 \varepsilon_{abc}\sigma_c$.

(5) Dowiedz, że:

$$\begin{aligned} \operatorname{tr} \sigma_a &= 0, \\ \operatorname{tr}(\sigma_a\sigma_b) &= 2\delta_{ab}, \\ \operatorname{tr}(\sigma_a\sigma_b\sigma_c) &= 2i\varepsilon_{abc}, \\ \operatorname{tr}(\sigma_a\sigma_b\sigma_c\sigma_d) &= 2(\delta_{ab}\delta_{cd} - \delta_{ac}\delta_{bd} + \delta_{ad}\delta_{bc}) \end{aligned}$$

dla dowolnych $1 \leq a, b, c, d \leq 3$.

Uwaga. Macierze $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ nazywane są *macierzami Pauliego* i grają ważną rolę, między innymi, w fizyce kwantowej przy opisie zjawisk związanych ze spinem.

Zadanie 5.48 (iloczyn Kroneckera). Niech K będzie ciałem oraz $p, q, r, s \geq 1$. Iloczynem *Kroneckera* macierzy $A = [a_{ij}] \in M_{p,q}(K)$ oraz $B = [b_{kl}] \in M_{r,s}(K)$ nazywamy macierz $A \otimes B \in M_{pr,qs}(K)$ daną w postaci blokowej

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1q}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2q}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{p1}B & a_{p2}B & \cdots & a_{pq}B \end{bmatrix}.$$

Niech $p, q, r, s, n, m \geq 1$. Wykaż, że:

- (1) $A \otimes (B \otimes C) = (A \otimes B) \otimes C$ dla $A \in M_{p,q}(K)$, $B \in M_{r,s}(K)$ oraz $C \in M_{n,m}(K)$.
- (2) $A \otimes (B + C) = A \otimes B + A \otimes C$ dla $A \in M_{p,q}(K)$ oraz $B, C \in M_{r,s}(K)$.
- (3) $(A + B) \otimes C = A \otimes C + B \otimes C$ dla $A, B \in M_{p,q}(K)$ oraz $C \in M_{r,s}(K)$.
- (4) $\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(B \otimes A) = (\text{tr } A)(\text{tr } B)$ dla $A \in M_n(K)$ oraz $B \in M_m(K)$.
- (5) $\det(A \otimes B) = \det(B \otimes A) = (\det A)^m (\det B)^n$ dla $A \in M_n(K)$ oraz $B \in M_m(K)$.
- (6) $(A \otimes B)(C \otimes D) = AC \otimes BD$ dla $A \in M_{n,m}(K)$, $B \in M_{p,q}(K)$, $C \in M_{m,r}(K)$ oraz $D \in M_{q,s}(K)$. W szczególności gdy $A \in \text{GL}_n(K)$ oraz $B \in \text{GL}_m(K)$, to $A \otimes B \in \text{GL}_{nm}(K)$ oraz $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$.

Zdefiniujmy *sumę Kroneckera* macierzy $A \in M_n(K)$ oraz $B \in M_m(K)$ jako

$$A \oplus B = A \otimes I_m + I_n \otimes B.$$

Dowiedź, że gdy $K = \mathbb{C}$, to $\exp(A \oplus B) = (\exp A) \otimes (\exp B)$ (porównaj Zadanie 5.45).

Zadanie 5.49. Niech K będzie ciałem oraz $n, m \geq 1$. Załóżmy, że $A \in M_n(K)$ oraz $B \in M_m(K)$.

- (1) Wskaż przykład, w którym $A \otimes B \neq B \otimes A$.
- (2) Udowodnij, że istnieje taka *macierz permutacyjna* $P \in \text{GL}_{nm}(K)$ (tzn. macierz mająca w każdym wierszu i w każdej kolumnie dokładnie jeden niezerowy wyraz równy 1), że $B \otimes A = P(A \otimes B)P^{-1}$.

Zadanie 5.50. Niech $n \geq 1$. Mówimy, że $X \in M_{n^2}(\mathbb{C})$ jest *R-macierzą*, gdy X spełnia równanie *Yanga-Baxtera*

$$(X \otimes I_n)(I_n \otimes X)(X \otimes I_n) = (I_n \otimes X)(X \otimes I_n)(I_n \otimes X).$$

- (1) Uzasadnij, że gdy $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, to $X = A \otimes B \in M_{n^2}(\mathbb{C})$ jest *R-macierzą* wtedy i tylko wtedy, gdy

$$A^2 \otimes BAB \otimes B = A \otimes ABA \otimes B^2.$$

- (2) Pokaż, że gdy $E, F \in M_n(\mathbb{C})$ są *komutującymi idempotentami* (tzn. $E^2 = E$, $F^2 = F$ oraz $EF = FE$), to $X = E \otimes F \in M_{n^2}(\mathbb{C})$ jest *R-macierzą*.

(3) Sprawdź, że

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in M_4(\mathbb{C})$$

jest R -macierzą. Czy $X = A \otimes B$ dla pewnych $A, B \in M_2(\mathbb{C})$?

Uwaga. Problem klasyfikacji wszystkich R -macierzy, związany z tzw. teorio-zbiorowymi rozwiązaniami równania Yanga–Baxtera oraz dynamicznie rozwijającymi się wokół tego równania strukturami algebraicznymi, jest otwarty i znajduje się w obszarze intensywnie prowadzonych badań. Warto zajrzeć np. do artykułu A. Smoktunowicz, A. Smoktunowicz, *Set-theoretic solutions of the Yang–Baxter equation and new classes of R -matrices*, Linear Algebra Appl. **546** (2018), 86–114.

6 Odwzorowania liniowe

Zadanie 6.1. Niech $U \subseteq \mathbb{Q}^4$ będzie podprzestrzenią opisaną układem równań

$$\begin{cases} x_1 + 8x_2 + 3x_3 + 6x_4 = 0 \\ x_1 + 9x_2 + 3x_3 + 7x_4 = 0 \\ x_1 + 7x_2 + 5x_3 + 5x_4 = 0. \end{cases}$$

Znajdź taką podprzestrzeń $V \subseteq \mathbb{Q}^4$, że $(1, 0, 0, 0) \in V$ oraz $\mathbb{Q}^4 = U \oplus V$.

Zadanie 6.2. Niech

$$U = \text{Lin}((1, 2, 3, 4), (4, 3, 2, 1), (2, 3, 4, 5)) \subseteq \mathbb{R}^4.$$

Wyznacz takie podprzestrzenie $V, W \subseteq \mathbb{R}^4$, że $U \oplus V = V \oplus W = W \oplus U = \mathbb{R}^4$ lub udowodnij, iż takie podprzestrzenie nie istnieją.

Zadanie 6.3. Załóżmy, iż $U \neq 0$ jest taką podprzestrzenią przestrzeni wektorowej X , że istnieje dokładnie jedna podprzestrzeń $V \subseteq X$ spełniająca $X = U \oplus V$. Pokaż, że $U = X$.

Zadanie 6.4. Załóżmy, że $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ jest rodziną jednowymiarowych podprzestrzeni \mathbb{R}^2 . Dowiedz, iż istnieje taka podprzestrzeń $V \subseteq \mathbb{R}^2$, że $U_n \oplus V = \mathbb{R}^2$ dla dowolnego $n \in \mathbb{N}$. Czy zastępując ciało \mathbb{R} ciałem \mathbb{Q} teza pozostanie prawdziwa?

Zadanie 6.5. Niech $n \geq 1$ oraz K będzie ciałem charakterystyki $\neq 2$. Niech $V = M_n(K)$. Wykaż, że $V = V_+ \oplus V_-$, gdzie $V_{\pm} = \{A \in V : A^t = \pm A\}$. Co w przypadku $\text{char } K = 2$?

Zadanie 6.6. Niech $X \neq \emptyset$ oraz $V = \text{Map}(X \times X, \mathbb{R})$. Powiemy, że funkcja $f \in V$ jest *symetryczna* (odpowiednio *antysymetryczna*), gdy $f(x, y) = f(y, x)$ (odpowiednio $f(x, y) = -f(y, x)$) dla dowolnych $x, y \in X$. Udowodnij, że $V = V_s \oplus V_a$, gdzie V_s (odpowiednio V_a) jest podprzestrzenią V złożoną z funkcji symetrycznych (odpowiednio antisymetrycznych).

Zadanie 6.7. Niech $U = C^\infty(\mathbb{R})$ będzie przestrzenią *funkcji gładkich* (tzn. dowolnie wiele razy różniczkowalnych) z \mathbb{R} w \mathbb{R} , natomiast $V = \mathbb{R}[[x]]$ przestrzenią *szeregów formalnych* (przestrzeń V można utożsamiać z $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$). Uzasadnij, że *rozwiniecie w szereg MacLaurina* (tzn. *szereg Taylora w zerze*), czyli odwzorowanie $T: U \rightarrow V$ dane wzorem

$$T(f) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n,$$

jest liniowe. Czy T jest monomorfizmem? Jeśli nie to podaj stosowny przykład.

Uwaga. Okazuje się, że T jest epimorfizmem (jest to treść słynnego twierdzenia Borela).

Zadanie 6.8. Niech $V = C^\infty(\mathbb{R})$. Zdefiniujmy odwzorowania $X, D, I: V \rightarrow V$ wzorami

$$X(f)(x) = xf(x), \quad D(f)(x) = f'(x), \quad I(f)(x) = \int_0^x f(t) dt$$

dla $f \in V$ oraz $x \in \mathbb{R}$. Czy X, D, I są liniowe? Sprawdź, że $D \circ X - X \circ D = \text{id}_V$ oraz $D \circ I = \text{id}_V$, ale $I \circ D \neq \text{id}_V$. Czy potrafisz opisać funkcje $f \in V$ spełniające jedno z równań: $X(f) = D(f)$ lub $D(f) = I(f)$ lub $I(f) = X(f)$?

Zadanie 6.9. Czy istnieje takie odwzorowanie liniowe $f: \mathbb{R}^8 \rightarrow M_3(\mathbb{R})$, że

$$\{A \in M_3(\mathbb{R}) : \text{rank } A = 2\} \subseteq \text{Im } f?$$

Zadanie 6.10. Załóżmy, że U jest podprzestrzenią skończone wymiarowej przestrzeni wektorowej V . Czy jeśli $\dim U = n$ oraz $\dim V = 2n$ dla pewnego $n \geq 1$, to zawsze istnieje taki endomorfizm $f \in \text{End}(V)$, że $\text{Ker } f = \text{Im } f = U$?

Zadanie 6.11. Załóżmy, że U, V są podprzestrzeniami przestrzeni liniowej X . Czy jeśli $\dim U = \dim V$, to zawsze istnieje taki automorfizm $f \in \text{Aut}(X)$, że $f(U) = V$?

Zadanie 6.12. Niech $n \geq 2$. Załóżmy, że V_1, \dots, V_n są podprzestrzeniami przestrzeni wektorowej V nad ciałem K . Zbiór $V_1 \times \dots \times V_n$ z działaniami

$$\begin{aligned} (u_1, \dots, u_n) + (v_1, \dots, v_n) &= (u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n), \\ \lambda(v_1, \dots, v_n) &= (\lambda v_1, \dots, \lambda v_n) \end{aligned}$$

dla $u_1, v_1 \in V_1, \dots, u_n, v_n \in V_n$ oraz $\lambda \in K$ jest przestrzenią wektorową nad ciałem K (sprawdź to) zwaną *produktem* przestrzeni V_1, \dots, V_n . Wykaż, że następujące warunki są równoważne:

(1) odwzorowanie $f: V_1 \times \dots \times V_n \rightarrow V$, zadane wzorem

$$f(v_1, \dots, v_n) = v_1 + \dots + v_n,$$

jest izomorfizmem.

(2) $V = V_1 + \dots + V_n$ oraz $V_i \cap \sum_{j \neq i} V_j = 0$ dla dowolnego $1 \leq i \leq n$.

(3) $V = V_1 + \dots + V_n = V$ oraz $(V_1 + \dots + V_i) \cap V_{i+1} = 0$ dla dowolnego $1 \leq i < n$.

Uwaga. Gdy spełniony jest jeden (lub, równoważnie, wszystkie) z powyższych warunków, to mówimy, że V jest *sumą prostą* podprzestrzeni V_1, \dots, V_n i piszemy $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_n$.

Zadanie 6.13. Niech $n, m \geq 1$. Załóżmy, że X_1, \dots, X_m oraz Y_1, \dots, Y_n są przestrzeniami liniowymi nad ciałem K . Rozważmy przestrzeń wektorową

$$H = \begin{bmatrix} \text{Hom}(X_1, Y_1) & \text{Hom}(X_2, Y_1) & \cdots & \text{Hom}(X_m, Y_1) \\ \text{Hom}(X_1, Y_2) & \text{Hom}(X_2, Y_2) & \cdots & \text{Hom}(X_m, Y_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{Hom}(X_1, Y_n) & \text{Hom}(X_2, Y_n) & \cdots & \text{Hom}(X_m, Y_n) \end{bmatrix}$$

(elementy przestrzeni H traktujemy jako macierze postaci $[f_{ij}]$, gdzie $f_{ij} \in \text{Hom}(X_j, Y_i)$ dla $1 \leq i \leq n$ oraz $1 \leq j \leq m$) z naturalnymi działaniami (doprecyzuj znaczenie tego stwierdzenia). Zdefiniujmy $X = X_1 \oplus \dots \oplus X_m$ oraz $Y = Y_1 \oplus \dots \oplus Y_n$. Niech ponadto $p_i \in \text{Hom}(Y, Y_i)$ dla $1 \leq i \leq n$ oraz $s_j \in \text{Hom}(X_j, X)$ dla $1 \leq j \leq m$ będą dane wzorami

$$p_i(y_1, \dots, y_n) = y_i \quad \text{oraz} \quad s_j(x_j) = (0, \dots, 0, x_j, 0, \dots, 0).$$

(1) Dowiedz, że odwzorowanie $\Phi: \text{Hom}(X, Y) \rightarrow H$ dane wzorem $\Phi(f) = [f_{ij}]$, gdzie

$$f_{ij} = p_i \circ f \circ s_j \in \text{Hom}(X_j, Y_i)$$

dla $1 \leq i \leq n$ oraz $1 \leq j \leq m$, jest izomorfizmem.

- (2) Utożsamiając elementy przestrzeni X oraz Y ze stosownymi macierzami o jednej kolumnie udowodnij, że gdy $f \in \text{Hom}(X, Y)$, to

$$\Phi(f) \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = f(x)$$

dla dowolnego $x = (x_1, \dots, x_m) \in X$ (wyjaśnij najpierw jak należy interpretować iloczyn macierzy po lewej stronie powyższej równości).

Zadanie 6.14. Niech $n \geq 1$. Załóżmy, że $f_1, \dots, f_n \in \text{End}(V)$ spełniają $f_i \circ f_j = \delta_{ij} f_j$ dla $1 \leq i, j \leq n$ oraz $f_1 + \dots + f_n = \text{id}_V$. Uzasadnij, że $V = \text{Im } f_1 \oplus \dots \oplus \text{Im } f_n$.

Zadanie 6.15. Przypuśćmy, że odwzorowania liniowe $f \in \text{Hom}(U, V)$ oraz $g \in \text{End}(V)$ spełniają $g \circ f = 0$ oraz $\text{Im}(\text{id}_V - g) \subseteq \text{Im } f$. Wykaż, że $V = \text{Im } f \oplus \text{Im } g$.

Zadanie 6.16. Niech V będzie skończenie wymiarową przestrzenią wektorową. Załóżmy, iż endomorfizmy $f, g \in \text{End}(V)$ są *przemienne* (tzn. $f \circ g = g \circ f$) oraz, że $f - g$ jest monomorfizmem. Dowiedz, że $\text{Ker}(f \circ g) = \text{Ker } f \oplus \text{Ker } g$.

Zadanie 6.17. Załóżmy, że V jest przestrzenią liniową nad ciałem K . Dla $f \in \text{End}(V)$ oraz $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j \in K[x]$ zdefiniujmy $p(f) = \sum_{j=0}^n a_j f^j \in \text{End}(V)$. Uzasadnij, że gdy wielomiany $p, q \in K[x]$ są *względnie pierwsze* (tzn. gdy p oraz q nie mają wspólnego dzielnika w $K[x]$ dodatniego stopnia), to $\text{Ker}(p(f) \circ q(f)) = \text{Ker } p(f) \oplus \text{Ker } q(f)$.

Zadanie 6.18 (lemat Fittinga). Załóżmy, że X jest skończenie wymiarową przestrzenią liniową oraz $f \in \text{End}(X)$.

- (1) Dowiedz, iż istnieje takie $n \geq 0$, że $X = \text{Ker } f^n \oplus \text{Im } f^n$ dla dowolnego $j \geq n$. Sprawdź, że można przyjąć $n = \dim X$.
- (2) Niech $N = \text{Ker } f^n$ oraz $A = \text{Im } f^n$, gdzie $n \geq 0$ jest takie, jak w punkcie (1). Udowodnij, że endomorfizm $f|_N \in \text{End}(N)$ jest *nilpotentny* (tzn. $(f|_N)^k = 0$ dla pewnego $k \geq 1$), zaś $f|_A \in \text{End}(A)$ jest automorfizmem.
- (3) Przypuśćmy, że U, V są f -niezmienniczymi podprzestrzeniami X spełniającymi $X = U \oplus V$. Uzasadnij, że jeżeli endomorfizm $f|_U \in \text{End}(U)$ jest nilpotentny, zaś $f|_V \in \text{End}(V)$ jest automorfizmem, to $U = N$ oraz $V = A$.

Uwaga. Przypomnijmy, że podprzestrzeń $X_0 \subseteq X$ jest f -niezmiennicza, gdy $f(X_0) \subseteq X_0$.

Zadanie 6.19. Załóżmy, że V jest skończenie wymiarową przestrzenią wektorową oraz $f \in \text{End}(V)$. Pokaż, że gdy dla dowolnego $v \in V$ istnieje takie $j = j(v) \geq 0$, że $f^j(v) = 0$, to istnieje takie $n \geq 0$, że $f^n = 0$. Udowodnij, że można przyjąć $n = \dim V$. Czy teza pozostaje prawdziwa gdy wymiar przestrzeni V jest nieskończony?

Zadanie 6.20. Załóżmy, że V jest przestrzenią liniową. Dowiedz, że gdy $\dim V > 1$, to $f \circ g \neq g \circ f$ dla pewnych $f, g \in \text{End}(V)$.

Zadanie 6.21. Niech V będzie przestrzenią liniową nad ciałem charakterystyki $\neq 2$. Wykaż, że gdy $f_1, f_2 \in \text{End}(V)$ oraz $f_1 \pm f_2 \in \text{Aut}(V)$, to dla dowolnych $h_1, h_2 \in \text{End}(V)$ istnieją takie $g_1, g_2 \in \text{End}(V)$, że $h_1 = g_1 \circ f_1 + g_2 \circ f_2$ oraz $h_2 = g_1 \circ f_2 + g_2 \circ f_1$.

Zadanie 6.22. Załóżmy, że X jest przestrzenią liniową. Udowodnij, że gdy $f \in \text{End}(X)$, to istnieje takie $g \in \text{End}(X)$, że $f = f \circ g \circ f$. Pokaż, że endomorfizm g można dobrać tak, by dodatkowo $g = g \circ f \circ g$.

Zadanie 6.23. Niech $f \in \text{Hom}(U, V)$. Udowodnij, że gdy $\dim U \geq \dim V$, to istnieje taki homomorfizm $g \in \text{Hom}(V, U)$, że $g \circ f = 0$ oraz $\text{rank } f + \text{rank } g = \dim V$.

Zadanie 6.24. Przypuśćmy, że $f_1 \in \text{Hom}(X_1, Y_1)$ oraz $f_2 \in \text{Hom}(X_2, Y_2)$. Uzasadnij, że $\text{rank } f_1 \leq \text{rank } f_2$ wtedy i tylko wtedy, gdy $f_1 = h \circ f_2 \circ g$ dla pewnych $g \in \text{Hom}(X_1, X_2)$ oraz $h \in \text{Hom}(Y_2, Y_1)$.

Zadanie 6.25. Załóżmy, że V jest przestrzenią wektorową nad ciałem K . Podprzestrzeń $I \subseteq E = \text{End}(V)$ nazywamy *ideałem*, gdy $p \circ f \circ q \in I$ dla dowolnych $f \in I$ oraz $p, q \in E$.

- (1) Pokaż, że gdy $\dim V < \infty$, to $I = 0$ oraz $I = E$ są jedynymi ideałami w E .
- (2) Przypuśćmy, że wymiar przestrzeni V jest nieskończony. Dowiedz, że zbiory

$$I_\kappa = \{f \in E : \text{rank } f < \kappa\} \quad (\aleph_0 \leq \kappa \leq \dim V)$$

są ideałami w E . Udowodnij ponadto, że gdy $0 \neq I \neq E$ jest ideałem w E , to $I = I_\kappa$ dla pewnej liczby kardynalnej $\aleph_0 \leq \kappa \leq \dim V$.

Uwaga. Punkt (1) oznacza, że gdy $\dim V = n < \infty$, to algebra $\text{End}(V) \cong M_n(K)$ jest *prosta*. Natomiast punkty (1) i (2) pokazują, iż ideały algebry $\text{End}(V)$ tworzą *łańcuch*.

Zadanie 6.26. Załóżmy, że U, V są podprzestrzeniami przestrzeni liniowej X . Pokaż, że:

- (1) $(U + V)/V \cong U/(U \cap V)$.
- (2) gdy $U \subseteq V$, to V/U jest podprzestrzenią X/U oraz $(X/U)/(V/U) \cong X/V$.


Zadanie 6.27. Załóżmy, że $(V_i)_{i \in I}$ jest rodziną przestrzeni wektorowych nad ciałem K . Dowiedz, że:

- (1) $\text{Hom}(\bigoplus_{i \in I} V_i, X) \cong \prod_{i \in I} \text{Hom}(V_i, X)$ dla dowolnej przestrzeni K -liniowej X .
- (2) $\text{Hom}(X, \prod_{i \in I} V_i) \cong \prod_{i \in I} \text{Hom}(X, V_i)$ dla dowolnej przestrzeni K -liniowej X .

Zadanie 6.28. Załóżmy, że U, V, W są przestrzeniami liniowymi nad ciałem K . Pokaż, że gdy $\dim W < \infty$, to $U \cong V \iff U \oplus W \cong V \oplus W$. Czy równoważność ta pozostanie prawdziwa gdy pominiemy założenie $\dim W < \infty$?


Zadanie 6.29. Udowodnij, że przestrzeń wektorowa $V \neq 0$ ma nieskończony wymiar wtedy i tylko wtedy, gdy $V \oplus V \cong V$.

Zadanie 6.30. Załóżmy, że U, V, W są przestrzeniami liniowymi nad ciałem K . Niech $p \in \text{Hom}(U, V)$ oraz $f \in \text{Hom}(U, W)$. Udowodnij, że gdy p jest epimorfizmem oraz $\text{Ker } p \subseteq \text{Ker } f$, to istnieje jedyny taki homomorfizm $g \in \text{Hom}(V, W)$, że $f = g \circ p$ (patrz diagram poniżej).



Uwaga. W szczególności jeżeli $U_0 \subseteq U$ jest podprzestrzenią, $V = U/U_0$, zaś $p: U \rightarrow V$ jest epimorfizmem kanonicznym zdefiniowanym jako $p(u) = u + U_0$, to dla dowolnego $f \in \text{Hom}(U, W)$ spełniającego $U_0 \subseteq \text{Ker } f$ istnieje dokładnie jedno takie odwzorowanie $g \in \text{Hom}(V, W)$, że $f = g \circ p$.

Zadanie 6.31. Załóżmy, że X, Y są przestrzeniami wektorowymi nad ciałem K oraz $f \in \text{Hom}(X, Y)$. Parę (U, j) złożoną z przestrzeni K -liniowej U oraz $j \in \text{Hom}(U, X)$ nazywamy *jądrem* odwzorowania f , gdy $f \circ j = 0$ oraz dla dowolnego $k \in \text{Hom}(V, X)$ spełniającego $f \circ k = 0$ istnieje dokładnie jedno takie odwzorowanie $g \in \text{Hom}(V, U)$, że $k = j \circ g$ (patrz diagram poniżej).



Uzasadnij, że:

- (1) para (U, j) , gdzie $U = \text{Ker } f$ oraz $j \in \text{Hom}(U, X)$ jest naturalnym zanurzeniem spełnia powyższe warunki.
- (2) jeśli para (V, k) również spełnia powyższe warunki, to istnieje wtedy jedyny taki izomorfizm $g \in \text{Hom}(V, U)$, że $k = j \circ g$.

Kojądro odwzorowania $f \in \text{Hom}(X, Y)$ definiujemy jako przestrzeń ilorazową

$$\text{Coker } f = Y / \text{Im } f.$$

Bazując na powyższym opisie jądra podaj analogiczny opis kjądra.

Zadanie 6.32. Załóżmy, że V jest przestrzenią liniową oraz $f \in \text{End}(V)$.

- (1) Wykaż, że $\text{Ker } f = \text{Ker } f^2 \iff \text{Ker } f \cap \text{Im } f = 0$.
- (2) Wykaż, że $\text{Im } f = \text{Im } f^2 \iff \text{Ker } f + \text{Im } f = V$.

Zadanie 6.33. Załóżmy, że V jest skończenie wymiarową przestrzenią wektorową oraz $f \in \text{End}(V)$. Udowodnij, że następujące warunki są równoważne:

- (1) $\text{Ker } f = \text{Ker } f^2$.
- (2) $\text{Im } f = \text{Im } f^2$.
- (3) $\text{Ker } f \cap \text{Im } f = 0$.
- (4) $\text{Ker } f + \text{Im } f = V$.

Czy warunki (1)–(4) pozostaną równoważne bez założenia $\dim V < \infty$?

Zadanie 6.34. Podaj przykład takiej przestrzeni wektorowej V oraz $f \in \text{End}(V)$, że V posiada tylko jedną *nietrywialną* (tzn. różną od 0 oraz V) podprzestrzeń f -niezmienniczą.

Zadanie 6.35. Niech $n \geq 1$ oraz

$$V_j = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n : x_1 = \dots = x_j = 0\} \quad (1 \leq j \leq n).$$

Opisz wszystkie automorfizmy $f \in \text{Aut}(\mathbb{C}^n)$ spełniające $f(V_j) \subseteq V_j$ dla $1 \leq j \leq n$.

Zadanie 6.36. Niech X, Y będą skończenie wymiarowymi przestrzeniami wektorowymi nad ciałem K . Załóżmy, że U jest podprzestrzenią X , zaś V jest podprzestrzenią Y . Pokaż, że

$$H = \{f \in \text{Hom}(X, Y) : f(U) \subseteq V\}$$

jest podprzestrzenią przestrzeni $\text{Hom}(X, Y)$ i oblicz $\dim H$ zakładając, że znamy wymiary wszystkich czterech przestrzeni U, V oraz X, Y .

Zadanie 6.37. Niech V będzie skończenie wymiarową przestrzenią liniową nad ciałem K . Załóżmy, że $\dim V = n \geq 2$ oraz przypuśćmy, iż dla endomorfizmu $f \in \text{End}(V)$ istnieje taki skalar $\lambda \in K$ i baza $\{e_1, \dots, e_n\}$ przestrzeni V , że

$$f(e_i) = \begin{cases} \lambda e_1 & \text{gdy } i = 1, \\ \lambda e_i + e_{i-1} & \text{gdy } 1 < i \leq n. \end{cases}$$

Wyznacz wszystkie podprzestrzenie f -niezmiennicze przestrzeni V .

Zadanie 6.38. Niech $n \geq 1$ oraz $X = \{f \in \mathbb{R}[x] : \deg f \leq n\}$. Rozważmy operator różniczkowania $D: X \rightarrow X$ zdefiniowany wzorem

$$D\left(\sum_{j=0}^n a_j x^j\right) = \sum_{j=1}^n j a_j x^{j-1}.$$

Wykaż, że gdy $X = U \oplus V$ dla pewnych D -niezmienniczych podprzestrzeni $U, V \subseteq X$, to $U = 0$ lub $V = 0$.

Zadanie 6.39. Załóżmy, że $V \neq 0$ jest skończenie wymiarową przestrzenią liniową nad ciałem \mathbb{R} . Przypuśćmy, że istnieje endomorfizm $f \in \text{End}(V)$ spełniający $f \circ f = -\text{id}_V$.

- (1) Wykaż, że $\dim V$ jest liczbą parzystą.
- (2) Udowodnij, iż istnieje taka baza B przestrzeni V , że macierz $M_B(f)$ ma postać blokowo-diagonalną $M_B(f) = \text{diag}(J, \dots, J)$, gdzie

$$J = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Zadanie 6.40. Załóżmy, że V jest skończenie wymiarową przestrzenią wektorową nad ciałem K . Niech $\dim V = n \geq 2$ oraz przypuśćmy, że $f \in \text{End}(V)$ spełnia $f^n = 0$, ale $f^{n-1} \neq 0$. Dowiedz, iż istnieje taka baza B przestrzeni V , że

$$M_B(f) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

Czy istnieje taki endomorfizm $g \in \text{End}(V)$, że $f = g \circ g$?

Zadanie 6.41. Niech V będzie przestrzenią liniową oraz $f \in \text{End}(V)$. Wykaż, że:

- (1) gdy $\dim V = 6$ oraz $\text{Im } f^6 = V$, to $\text{Im } f^3 = V$.
- (2) gdy $\dim V = 7$ oraz $\text{Ker } f^{14} = V$, to $\text{Ker } f^7 = V$.
- (3) gdy $\dim V = 8$ oraz $\text{Im } f^{i+1} \neq \text{Im } f^i$ dla $1 \leq i \leq 4$, to $\dim \text{Ker } f \leq 4$.
- (4) gdy $f^3 = f$, to $V = \text{Ker } f^2 \oplus \text{Im } f^2$.

Zadanie 6.42. Rozważmy odwzorowanie $f \in \text{Hom}(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^3)$ dane wzorem

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4, 2x_1 + 5x_2 + x_3 + 7x_4, x_1 + x_2 - 4x_3 + 2x_4).$$

- (1) Wyznacz wymiar przestrzeni $E = \{u \in \text{End}(\mathbb{R}^4) : f \circ u = 0\}$.
- (2) Podaj przykład takiego odwzorowania $u \in E$, że $\text{rank } u = 2$.

Zadanie 6.43. Załóżmy, że $n \geq 0$ oraz $V = \{f \in \mathbb{C}[x] : \deg f \leq 2n + 1\}$. Zdefiniujmy endomorfizm $\Phi \in \text{End}(V)$ określając go na bazie $\{x^j : 0 \leq j \leq 2n + 1\}$ przestrzeni V wzorem

$$\Phi(x^j) = (-1)^j x^{\lfloor j/2 \rfloor} = \begin{cases} x^k & \text{gdy } j = 2k, \\ -x^k & \text{gdy } j = 2k + 1 \end{cases} \quad (0 \leq j \leq 2n + 1).$$

Wyznacz bazy i wymiary przestrzeni $\text{Ker } \Phi$ oraz $\text{Im } \Phi$.

Zadanie 6.44. Podaj przykład endomorfizmu $f \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$ spełniającego:

$$(1, 1, 2) \in \text{Im } f, \quad \text{Ker } f = \text{Lin}((-1, 2, 1)), \quad f^3 = f \circ f \circ f = 0.$$

Zadanie 6.45. Załóżmy, że U, V są przestrzeniami wektorowymi nad ciałem K . Niech $f, g \in \text{Hom}(U, V)$ i przypuśćmy, że dla dowolnego wektora $u \in U$ istnieje taki skalar $\lambda(u) \in K$, że $f(u) = \lambda(u)g(u)$. Wykaż, że istnieje wtedy taki skalar $\lambda \in K$, że $f = \lambda g$.

Zadanie 6.46. Załóżmy, że V jest przestrzenią liniową nad ciałem K . Dowiedz, że gdy endomorfizm $f \in \text{End}(V)$ jest przemienny z dowolnym rzutem w $\text{End}(V)$, to f jest *homotetią* (tzn. $f = \lambda \text{id}_V$ dla pewnego $\lambda \in K$).

Zadanie 6.47. Niech

$$A = \{(3, 1, 1), (1, 0, 0), (5, 1, 0)\}, \quad B = \{(3, 4, 5), (4, 1, 1), (2, 0, 1)\}.$$

- (1) Wyznacz macierz $M_{AB}(f)$ odwzorowania $f \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$ danego wzorem

$$f(x, y, z) = (4x + y + z, 3x + 2y + z, 3x + 2y + z).$$

- (2) Podaj wzór endomorfizmu $g \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$ o macierzy

$$M_{AB}(g) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Zadanie 6.48. Załóżmy, że homomorfizmy $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ oraz $g: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ spełniają

$$M_{\text{st st}}(f) = \begin{bmatrix} -2 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad M_{AB}(g) = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 0 & 3 \end{bmatrix},$$

gdzie

$$A = \{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 1, 1), (0, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1)\}, \quad B = \{(1, -1), (1, 0)\}.$$

Podaj wzór odwzorowania liniowego $g \circ f$.

Zadanie 6.49. Niech

$$\begin{aligned} A &= \{(1, -2, 0), (1, 1, 1), (0, 0, -1)\}, \\ B &= \{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 1, 1), (0, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1)\}, \\ C &= \{(1, 1), (-1, 0)\}. \end{aligned}$$

Odwzorowanie $f \in \text{Hom}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^4)$ dane jest wzorem

$$f(x, y, z) = (3x - y - 2z, x + y + z, -x + 2z, x + 2y - z),$$

zaś $g \in \text{Hom}(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^2)$ wyznaczone jest warunkiem

$$M_{BC}(g) = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Oblicz $M_{AC}(g \circ f)$ oraz $M_{\text{st st}}(g \circ f)$.

Zadanie 6.50. Niech $V = M_{2,3}(\mathbb{Q})$ oraz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{Q}), \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in M_3(\mathbb{Q}).$$

Czy odwzorowanie $f: V \rightarrow V$ dane wzorem $f(X) = AX + XB$ jest liniowe? Jeśli tak, to wyznacz macierz $M_E(f)$ w bazie $E = \{E_{11}, E_{12}, E_{13}, E_{21}, E_{22}, E_{23}\}$, gdzie $E_{ij} \in M_{2,3}(\mathbb{Q})$ jest macierzą, której (i, j) -ty wyraz równy jest 1, zaś pozostałe wyrazy równe są 0.

Zadanie 6.51. Załóżmy, że K jest ciałem oraz $n, m \geq 1$. Przypuśćmy, że macierze $M_1, M_2 \in M_{n,m}(K)$ spełniają $\text{rank } M_1 = \text{rank } M_2$.

- (1) Wykaż, iż istnieje takie odwzorowanie $f \in \text{Hom}(K^m, K^n)$, bazy A_1, A_2 przestrzeni K^m oraz bazy B_1, B_2 przestrzeni K^n , że $M_{A_1 B_1}(f) = M_1$ oraz $M_{A_2 B_2}(f) = M_2$.
- (2) Czy zawsze istnieje takie odwzorowanie $f \in \text{Hom}(K^m, K^n)$, baza A przestrzeni K^m oraz bazy B_1, B_2 przestrzeni K^n , że $M_{AB_1}(f) = M_1$ oraz $M_{AB_2}(f) = M_2$?

Zadanie 6.52. Rozważmy odwzorowanie \mathbb{R} -linowe $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ wyznaczone przez macierz

$$M_B(f) = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix},$$

gdzie $B = \{1, i\}$ jest bazą kanoniczną \mathbb{C} nad \mathbb{R} .

- (1) Pokaż, że $f(z) = pz + q\bar{z}$ dla pewnych $p, q \in \mathbb{C}$. Jakie relacje zachodzą pomiędzy liczbami p, q oraz a, b, c, d ?
- (2) Jakie warunki muszą spełniać liczby p, q (lub a, b, c, d), aby odwzorowanie f było \mathbb{C} -liniowe?

Zadanie 6.53. Rozważmy kwaterniony \mathbb{H} jako przestrzeń liniową nad ciałem \mathbb{R} . Niech $0 \neq q = x_0 + x_1i + x_2j + x_3k \in \mathbb{H}$. Zdefiniujmy $f_1, f_2, f_3 \in \text{End}(\mathbb{H})$ wzorami

$$f_1(x) = qx, \quad f_2(x) = xq^{-1}, \quad f_3(x) = qxq^{-1}.$$

Wyznacz macierze endomorfizmów f_1, f_2, f_3 w bazie kanonicznej $B = \{1, i, j, k\}$.

Zadanie 6.54. Niech $K = \mathbb{F}_{13}$. Załóżmy, że odwzorowanie $f \in \text{Hom}(K^4, K^3)$ jest dane za pomocą macierzy

$$M_{\text{st st}}(f) = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 7 & -1 \\ -1 & 2 & -8 & -4 \end{bmatrix}.$$

Niech ponadto

$$U = \text{Lin}((1, 1, 1, 1), (4, 0, -1, 1), (3, 2, 1, 1)) \subseteq K^4, \\ V = \text{Lin}((1, 0, 0), (3, 1, 1), (0, 2, 2)) \subseteq K^3.$$

Znajdź bazy i wymiary przestrzeni $f(U)$ oraz $f^{-1}(V)$.

Zadanie 6.55. Wyznacz bazy jądra i obrazu endomorfizmu $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ danego wzorem

$$f(x, y, z) = (x + 2y - z, x + y + 2z, 2x + 3y + z).$$

Zadanie 6.56. Wyznacz bazy i wymiary jądra oraz obrazu endomorfizmu $f \in \text{End}(\mathbb{C}^3)$ zadanego macierzą

$$M_{\text{st}}(f) = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Zadanie 6.57. Niech $B = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$ oraz

$$M = \begin{bmatrix} i & 2 & 3 \\ 1 & -i & 1 \end{bmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{C}).$$

Znajdź bazy jąder i obrazów dla $f \in \text{Hom}(\mathbb{C}^2, \mathbb{C}^3)$ oraz $g \in \text{Hom}(\mathbb{C}^3, \mathbb{C}^2)$ spełniających

$$M_{\text{st } B}(f) = M^h \quad \text{oraz} \quad M_{B \text{ st}}(g) = M.$$

Zadanie 6.58. Niech $f: M_2(\mathbb{C}) \rightarrow M_2(\mathbb{C})$ będzie odwzorowaniem liniowym danym jako

$$f(X) = AX - XA, \quad \text{gdzie } A = \begin{bmatrix} 1 & i \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{C}).$$

- (1) Wyznacz macierz $M_B(f)$ endomorfizmu f w bazie $B = \{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$, której elementami są jedyńki macierzowe.

(2) Znajdź bazy i wymiary przestrzeni $\text{Ker } f$ oraz $\text{Im } f$.

Zadanie 6.59. Załóżmy, że $f \in \text{Hom}(U, V)$ oraz $g \in \text{Hom}(V, U)$. Udowodnij, że:

- (1) jeśli $g \circ f = \text{id}_U$, to $f \circ g$ jest rzutem.
- (2) jeśli $g \circ f$ jest rzutem, to $(f \circ g)^2$ jest rzutem.
- (3) gdy $U = V = \mathbb{R}^2$, to podaj przykład takich homomorfizmów f, g , że $g \circ f$ jest rzutem, ale $f \circ g$ nie jest rzutem.

Zadanie 6.60. Niech $X = \{f \in \mathbb{C}[x] : \deg f \leq 3\}$ oraz $U = \{f \in X : f(0) = f'(0) = 0\}$.

- (1) Znajdź taką podprzestrzeń $V \subseteq X$, że $X = U \oplus V$.
- (2) Wyznacz wzór opisujący rzut $p \in \text{End}(X)$ na U wzdłuż V .
- (3) Wyznacz wzór opisujący symetrię $s \in \text{End}(X)$ względem U wzdłuż V .

Zadanie 6.61. Niech $n \geq 1$ oraz $V = M_n(\mathbb{C})$. Zdefiniujmy $V_{\pm} = \{A \in V : A^n = \pm A\}$.

- (1) Sprawdź, że $V = V_+ \oplus V_-$. Podaj bazy przestrzeni V_{\pm} .
- (2) Opisz rzut $p \in \text{End}(V)$ na V_+ wzdłuż V_- .
- (3) Opisz symetrię $s \in \text{End}(V)$ względem V_- wzdłuż V_+ .

Zadanie 6.62. Niech $U = \text{Lin}((1, i, 1), (2, 1 - i, 0)) \subseteq \mathbb{C}^3$.

- (1) Znajdź taką podprzestrzeń $V \subseteq \mathbb{C}^3$, że $\mathbb{C}^3 = U \oplus V$.
- (2) Wyznacz macierz rzutu p na U wzdłuż V w bazach standardowych.
- (3) Wyznacz macierz symetrii s względem U wzdłuż V w bazach standardowych.

Zadanie 6.63. Niech $n \geq 1$. Pokaż, że gdy $f \in \text{End}(\mathbb{R}^n)$ jest rzutem, to $\text{rank } f = \text{tr } f$.

Zadanie 6.64. Przypuśćmy, że $f \in \text{Hom}(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^5)$ spełnia $\text{Ker } f = \text{Lin}((1, 2, 3, 4))$. Znajdź takie homomorfizmy $u, v \in \text{Hom}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^4)$, że $u \neq v$ oraz $f \circ u = f \circ v$.

Zadanie 6.65. Niech $f \in \text{Hom}(\mathbb{C}^3, \mathbb{C}^4)$ będzie dane wzorem

$$f(x, y, z) = (x + 2y + 4z, x + 3y + 7z, -x + y + az, 2x + 2y + 2z).$$

- (1) Dla jakich $a \in \mathbb{C}$ odwzorowanie f jest monomorfizmem?
- (2) Czy istnieje takie $a \in \mathbb{C}$, że f jest epimorfizmem?


Zadanie 6.66. Niech $f \in \text{Hom}(U, V)$. Wykaż, że następujące warunki są równoważne:

- (1) f jest monomorfizmem.
- (2) istnieje takie $r \in \text{Hom}(V, U)$, że $r \circ f = \text{id}_U$.
- (3) jeśli $f \circ u = 0$ dla pewnego $u \in \text{Hom}(X, U)$, to $u = 0$.
- (4) jeśli $f \circ u = f \circ v$ dla pewnych $u, v \in \text{Hom}(X, U)$, to $u = v$.


Sformułuj i udowodnij równoważność analogicznych warunków dotyczących epimorfizmu.

Zadanie 6.67. Niech $f \in \text{Hom}(U, V)$. Wykaż, że następujące warunki są równoważne:

- (1) odwzorowanie f jest epimorfizmem.
- (2) istnieją takie homomorfizmy $u_1, u_2 \in \text{Hom}(X, U)$, że $f \circ u_1 = f \circ u_2$ oraz dla dowolnego $g \in \text{Hom}(U, W)$ spełniającego $g \circ u_1 = g \circ u_2$ istnieje dokładnie jeden taki homomorfizm $h \in \text{Hom}(V, W)$, że $g = h \circ f$ (patrz diagram poniżej).



- (3) dla dowolnych homomorfizmów $u \in \text{Hom}(U, X)$, $v \in \text{Hom}(V, Y)$ i monomorfizmu $g \in \text{Hom}(X, Y)$, jeśli $v \circ f = g \circ u$, to istnieje taki homomorfizm $h \in \text{Hom}(V, X)$, że $u = h \circ f$ oraz $v = g \circ h$ (patrz diagram poniżej).



- (4) dla dowolnych homomorfizmów $p \in \text{Hom}(U, X)$ oraz $u \in \text{Hom}(X, V)$ z faktu, że u jest monomorfizmem oraz $f = u \circ p$ wynika, że u jest izomorfizmem.

Uwaga. Epimorfizm $f \in \text{Hom}(U, V)$ spełniający (2), (3) lub (4) nazywamy, odpowiednio, *regularnym*, *silnym* lub *ekstremalnym*. Zadanie to pokazuje, że w kategorii przestrzeni wektorowych (nad ustalonym ciałem) pojęcia te są równoważne. Nie jest tak jednak w innych kategoriach (np. w kategorii grup).

Zadanie 6.68. Załóżmy, że

$$0 \longrightarrow U \xrightarrow{f} V \xrightarrow{g} W \longrightarrow 0$$

jest *krótkim ciągiem dokładnym przestrzeni wektorowych* nad ciałem K ; co oznacza, że f jest monomorfizmem, $\text{Im } f = \text{Ker } g$ oraz g jest epimorfizmem.

- (1) Dowiedz, że $\dim V = \dim U + \dim W$.
- (2) Udowodnij, że gdy X jest przestrzenią liniową nad ciałem K , zaś odwzorowanie $f_*: \text{Hom}(X, U) \rightarrow \text{Hom}(X, V)$ zdefiniujemy jako $f_*(u) = f \circ u$ dla $u \in \text{Hom}(X, U)$ (analogicznie definiujemy g_*), to ciąg indukowany

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(X, U) \xrightarrow{f_*} \text{Hom}(X, V) \xrightarrow{g_*} \text{Hom}(X, W) \longrightarrow 0$$

jest dokładny.

- (3) Udowodnij, że gdy X jest przestrzenią liniową nad ciałem K , zaś odwzorowanie $f^*: \text{Hom}(V, X) \rightarrow \text{Hom}(U, X)$ zdefiniujemy jako $f^*(v) = v \circ f$ dla $v \in \text{Hom}(V, X)$ (analogicznie definiujemy g^*), to ciąg indukowany

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(W, X) \xrightarrow{g^*} \text{Hom}(V, X) \xrightarrow{f^*} \text{Hom}(U, X) \longrightarrow 0$$

jest dokładny.

Uwaga. Dokładność ciągów indukowanych z punktów (2) oraz (3) wiąże się z pojęciami, odpowiednio, *projektywności* oraz *injektywności*. Zadanie to pokazuje, że każda przestrzeń wektorowa X jest jednocześnie tzw. projektywnym i injektywnym K -modułem. Nie jest tak w innych kategoriach modułów (np. w kategorii grup abelowych).

Zadanie 6.69. Załóżmy, że

$$0 \longrightarrow U \xrightarrow{f} V \xrightarrow{g} W \longrightarrow 0$$

jest krótkim ciągiem dokładnym przestrzeni liniowych. Dowiedz, że następujące warunki są równoważne:

- (1) istnieje takie $r \in \text{Hom}(V, U)$, że $r \circ f = \text{id}_U$.
- (2) istnieje takie $s \in \text{Hom}(W, V)$, że $g \circ s = \text{id}_W$.
- (3) istnieją takie $r \in \text{Hom}(V, U)$ oraz $s \in \text{Hom}(W, V)$, że $r \circ f = \text{id}_U$, $g \circ s = \text{id}_W$, $r \circ s = 0$ oraz $f \circ r + s \circ g = \text{id}_V$.
- (4) istnieje taki izomorfizm $h \in \text{Hom}(V, U \oplus W)$, że diagram o dokładnych wierszach

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & U & \xrightarrow{f} & V & \xrightarrow{g} & W & \longrightarrow & 0 \\ & & \parallel & & \downarrow h & & \parallel & & \\ 0 & \longrightarrow & U & \longrightarrow & U \oplus W & \longrightarrow & W & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

jest przemienny (nieoznaczone odwzorowania w dolnym wierszu, to kanoniczne zanurzenie i rzutowanie).

Uwaga. Gdy ciąg dokładny spełnia powyższe warunki, to mówimy, że *rozszczepia się*. Zatem w kategorii przestrzeni wektorowych (nad ustalonym ciałem) każdy ciąg dokładny rozszczepia się (nie jest tak np. w kategorii grup abelowych). Ponadto powyższe warunki nie są równoważne w innych kategoriach (np. w kategorii grup).

Zadanie 6.70. Niech $n \geq 2$. Mówimy, że ciąg odwzorowań liniowych postaci

$$0 \longrightarrow V_0 \xrightarrow{f_1} V_1 \xrightarrow{f_2} \cdots \xrightarrow{f_n} V_n \longrightarrow 0$$

jest *dokładny*, gdy f_1 jest monomorfizmem, $\text{Im } f_i = \text{Ker } f_{i+1}$ dla $1 \leq i < n$ oraz f_n jest epimorfizmem. Pokaż, że gdy powyższy ciąg jest dokładny, zaś przestrzenie V_0, \dots, V_n są skończonego wymiaru, to $\sum_{i=0}^n (-1)^i \dim V_i = 0$.

Zadanie 6.71. Załóżmy, że U, V są podprzestrzeniami przestrzeni liniowej X . Wykaż, że istnieje krótki ciąg dokładny postaci

$$0 \longrightarrow X/(U \cap V) \longrightarrow (X/U) \oplus (X/V) \longrightarrow X/(U + V) \longrightarrow 0$$

i wywnioskuj stąd, że $\text{codim } U + \text{codim } V = \text{codim}(U \cap V) + \text{codim}(U + V)$.

Zadanie 6.72. Załóżmy, że w diagramie

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & U_1 & \xrightarrow{f_1} & V & \xrightarrow{g_1} & W_1 & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \parallel & & & & \\ 0 & \longrightarrow & U_2 & \xrightarrow{f_2} & V & \xrightarrow{g_2} & W_2 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

wiersze są krótkimi ciągami dokładnymi przestrzeni liniowych nad ciałem K . Pokaż, że:

- (1) $\text{Ker}(g_2 \circ f_1) \cong \text{Ker}(g_1 \circ f_2)$.
- (2) $\text{Coker}(g_2 \circ f_1) \cong \text{Coker}(g_1 \circ f_2)$.

Zadanie 6.73 (lema o węźle). Przypuśćmy, że w diagramie przemiennym

$$\begin{array}{ccccccc} U_1 & \xrightarrow{g_1} & U_2 & \xrightarrow{g_2} & U_3 & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow f_1 & & \downarrow f_2 & & \downarrow f_3 & & \\ 0 & \longrightarrow & V_1 & \xrightarrow{h_1} & V_2 & \xrightarrow{h_2} & V_3 \end{array}$$

wiersze są ciągami dokładnymi przestrzeni liniowych nad ciałem K . Udowodnij, że istnieje ciąg dokładny

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Ker } g_1 & \longrightarrow & \text{Ker } f_1 & \xrightarrow{\bar{g}_1} & \text{Ker } f_2 & \xrightarrow{\bar{g}_2} & \text{Ker } f_3 & \longrightarrow & 0 \\ & & & & & & & & & & \searrow \\ & & & & & & & & & & \text{Coker } f_1 & \xrightarrow{\bar{h}_1} & \text{Coker } f_2 & \xrightarrow{\bar{h}_2} & \text{Coker } f_3 & \longrightarrow & \text{Coker } h_2 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

w którym homomorfizmy $\bar{g}_1, \bar{g}_2, \bar{h}_1, \bar{h}_2$ są indukowane przez, odpowiednio, g_1, g_2, h_1, h_2 (wyjaśnij precyzyjnie co to znaczy). Czym są nienazwane odwzorowania z powyższego ciągu dokładnego?

Zadanie 6.74. Załóżmy, że $f \in \text{Hom}(U, V)$ oraz $g \in \text{Hom}(V, W)$.

- (1) Dowiedz, że istnieje ciąg dokładny postaci

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Ker } f & \longrightarrow & \text{Ker}(g \circ f) & \longrightarrow & \text{Ker } g & \longrightarrow & 0 \\ & & & & & & & & \searrow \\ & & & & & & & & \text{Coker } f & \longrightarrow & \text{Coker}(g \circ f) & \longrightarrow & \text{Coker } g & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Wyjaśnij precyzyjnie czym są nieopisane odwzorowania w powyższym ciągu.

- (2) Wywnioskuj z punktu (1), że $\dim \text{Ker}(g \circ f) \leq \dim \text{Ker } f + \dim \text{Ker } g$. Sformułuj i wykaż podobną nierówność dla wymiarów kojąder.
- (3) Wykorzystując punkt (2) udowodnij, że $\text{rank } A + \text{rank } B \leq \text{rank}(AB) + n$ dla dowolnych macierzy $A \in M_{p,n}(K)$ oraz $B \in M_{n,q}(K)$ nad ciałem K .

Zadanie 6.75 (lemat piątkowy). Załóżmy, że w diagramie przemiennym odwzorowań liniowych

$$\begin{array}{ccccccccc}
 U_1 & \longrightarrow & U_2 & \longrightarrow & U_3 & \longrightarrow & U_4 & \longrightarrow & U_5 \\
 \downarrow f_1 & & \downarrow f_2 & & \downarrow f_3 & & \downarrow f_4 & & \downarrow f_5 \\
 V_1 & \longrightarrow & V_2 & \longrightarrow & V_3 & \longrightarrow & V_4 & \longrightarrow & V_5
 \end{array}$$

wiersze są ciągami dokładnymi. Wykaż, że:

- (1) gdy f_2 oraz f_4 są monomorfizmami, natomiast f_1 jest epimorfizmem, to f_3 jest monomorfizmem.
- (2) gdy f_2 oraz f_4 są epimorfizmami, natomiast f_5 jest monomorfizmem, to f_3 jest epimorfizmem.
- (3) gdy f_2 oraz f_4 są izomorfizmami, f_1 jest epimorfizmem, zaś f_5 jest monomorfizmem (w szczególności gdy wszystkie odwzorowania f_1, f_2, f_4, f_5 są izomorfizmami), to f_3 jest izomorfizmem.

Zadanie 6.76 (3×3 lemat/lemat dziewiętkowy). Załóżmy, że w diagramie przemiennym odwzorowań liniowych

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & U_1 & \longrightarrow & U_2 & \longrightarrow & U_3 & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 0 & \longrightarrow & V_1 & \xrightarrow{f} & V_2 & \xrightarrow{g} & V_3 & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 0 & \longrightarrow & W_1 & \longrightarrow & W_2 & \longrightarrow & W_3 & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & 0 & & 0 & & 0 & &
 \end{array}$$

kolumny są krótkimi ciągami dokładnymi. Dowiedz, że:

- (1) gdy pierwszy i drugi wiersz są krótkimi ciągami dokładnymi, to trzeci wiersz także.
- (2) gdy drugi i trzeci wiersz są krótkimi ciągami dokładnymi, to pierwszy wiersz także.

- (3) gdy pierwszy i trzeci wiersz są krótkimi ciągami dokładnymi oraz $g \circ f = 0$, to drugi wiersz jest również krótkim ciągiem dokładnym.

Zadanie 6.77. Mówimy, że nieskończony ciąg C odwzorowań liniowych postaci

$$\cdots \longrightarrow C_{n+1} \xrightarrow{d_{n+1}} C_n \xrightarrow{d_n} C_{n-1} \longrightarrow \cdots$$

jest *kompleksem łańcuchowym*, gdy $d_n \circ d_{n+1} = 0$ dla dowolnego $n \in \mathbb{Z}$. Jeśli zdefiniujemy

$$\begin{aligned} B_n(C) &= \text{Im } d_{n+1} && \text{(przestrzeń } n\text{-tych brzegów kompleksu } C), \\ Z_n(C) &= \text{Ker } d_n && \text{(przestrzeń } n\text{-tych cykli kompleksu } C), \end{aligned}$$

to $B_n(C) \subseteq Z_n(C)$ dla dowolnego $n \in \mathbb{Z}$ (sprawdź to). Inkluzja ta pozwala zdefiniować przestrzeń n -tych *homologii* kompleksu C jako przestrzeń ilorazową

$$H_n(C) = Z_n(C) / B_n(C).$$

Mówimy, że rodzina odwzorowań liniowych $f = (f_n: C_n \rightarrow D_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ jest *morfizmem kompleksów łańcuchowych* C oraz D (piszemy wtedy $f: C \rightarrow D$), gdy diagram

$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & \longrightarrow & C_{n+1} & \longrightarrow & C_n & \longrightarrow & C_{n-1} & \longrightarrow & \cdots \\ & & \downarrow f_{n+1} & & \downarrow f_n & & \downarrow f_{n-1} & & \\ \cdots & \longrightarrow & D_{n+1} & \longrightarrow & D_n & \longrightarrow & D_{n-1} & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

jest przemienny. Jeśli wszystkie odwzorowania $f_n: C_n \rightarrow D_n$ dla $n \in \mathbb{Z}$ są izomorfizmami, to mówimy, że f jest izomorfizmem kompleksów łańcuchowych, a kompleksy C oraz D nazywamy izomorficznymi (i piszemy $C \cong D$).

- (1) Załóżmy, że dany jest ciąg par przestrzeni wektorowych $(B_n, H_n)_{n \in \mathbb{Z}}$. Zdefiniujemy

$$Z_n = B_n \oplus H_n \quad \text{oraz} \quad C_n = Z_n \oplus B_{n-1}$$

dla $n \in \mathbb{Z}$. Niech ponadto homomorfizm $d_{n+1} \in \text{Hom}(C_{n+1}, C_n)$ dany będzie jako złożenie odwzorowań

$$C_{n+1} = Z_{n+1} \oplus B_n \longrightarrow B_n \longrightarrow B_n \oplus H_n \oplus B_{n-1} = Z_n \oplus B_{n-1} = C_n,$$

gdzie pierwsze odwzorowanie jest naturalnym rzutowaniem, natomiast drugie jest naturalnym zanurzeniem. Sprawdź, że otrzymany w ten sposób ciąg

$$\cdots \longrightarrow C_{n+1} \xrightarrow{d_{n+1}} C_n \xrightarrow{d_n} C_{n-1} \longrightarrow \cdots$$

jest kompleksem łańcuchowym. Następnie wyznacz przestrzeń brzegów, cykli oraz homologii tego kompleksu.

- (2) Udowodnij, że dowolny kompleks łańcuchowy C jest izomorficzny z kompleksem łańcuchowym o postaci opisanej w punkcie (1).

- (1) Udowodnij, że gdy dla kompleksu łańcuchowego C ciąg $(\dim C_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ posiada tylko skończenie wiele niezerowych wyrazów i wyrazy te są skończone, to dla C istnieje charakterystyka Eulera–Poincarégo oraz $\chi(C) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n \dim C_n$.
- (2) Wykaż, że gdy

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

jest krótkim ciągiem dokładnym kompleksów łańcuchowych i dla A, B, C istnieje charakterystyka Eulera–Poincarégo, to $\chi(B) = \chi(A) + \chi(C)$.

Zadanie 6.80. Jeśli $f \in \text{Hom}(U, V)$ spełnia $\dim \text{Ker } f < \infty$ oraz $\dim \text{Coker } f < \infty$, to *indeks* odwzorowania f definiujemy wzorem

$$\text{ind } f = \dim \text{Ker } f - \dim \text{Coker } f.$$

- (1) Dowiedz, że gdy $\dim U < \infty$ oraz $\dim V < \infty$, to $\text{ind } f = \dim U - \dim V$.
- (2) Dla każdej liczby $n \in \mathbb{Z}$ podaj przykład takiej przestrzeni V oraz endomorfizmu $f \in \text{End}(V)$, że $\text{ind } f = n$.

Zadanie 6.81. Załóżmy, że przestrzeń wektorowa V jest skończonego wymiaru. Wykaż, że każdy endomorfizm $f \in \text{End}(V)$ da się zapisać jako $f = p \circ j$, gdzie $j \in \text{Aut}(V)$, zaś $p \in \text{End}(V)$ jest rzutem. Czy teza pozostanie prawdziwa jeżeli zrezygnujemy z założenia $\dim V < \infty$?

Zadanie 6.82. Niech $V = \mathbb{C}^3$. Uzasadnij, że gdy $f \in \text{End}(V)$, to istnieje taka liczba $n \in \mathbb{N}$, że odwzorowanie $f - n \text{id}_V$ jest izomorfizmem. Czy któreś z odwzorowań $f - k \text{id}_V$ dla $1 \leq k \leq 4$ musi być izomorfizmem?

Zadanie 6.83. Mówimy, że $(x_n)_{n=1}^{\infty} \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ jest *ciągami Cauchy'ego*, gdy dla dowolnego $m \in \mathbb{N}$ istnieje takie $n = n(m) \in \mathbb{N}$, że $|x_p - x_q| \leq \frac{1}{m}$ dla wszystkich $p, q \geq n$. Niech


$$X = \{(x_n)_{n=1}^{\infty} \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} : (x_n)_{n=1}^{\infty} \text{ jest ciągami Cauchy'ego}\}.$$

- (1) Sprawdź, że X jest podprzestrzenią przestrzeni liniowej $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ nad ciałem \mathbb{Q} .
- (2) Udowodnij, że odwzorowanie $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ dane wzorem $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ dla $x = (x_n)_{n=1}^{\infty} \in X$ jest dobrze określone oraz liniowe (\mathbb{R} traktujemy jako przestrzeń liniową nad \mathbb{Q}). Wyznacz jego jądro oraz obraz.
- (3) Wykorzystując odwzorowanie f z punktu (2) wykaż, że przestrzenie $X/\text{Ker } f$ oraz \mathbb{R} są izomorficzne nad \mathbb{Q} .

Uwaga. Powyższy izomorfizm jest jedną z metod konstrukcji zbioru liczb rzeczywistych. Konstrukcja ta pochodzi od G. Cantora oraz C. Méraya.

Zadanie 6.84. Niech U, V, W będą przestrzeniami liniowymi nad ciałem K . Mówimy, że odwzorowanie $\varphi: U \times V \rightarrow W$ jest *dwuliniowe*, gdy odwzorowania $\varphi(u, -): V \rightarrow W$ oraz $\varphi(-, v): U \rightarrow W$ są liniowe dla dowolnych $u \in U$ oraz $v \in V$. Powiemy, że para (T, τ) jest *iloczynem tensorowym* przestrzeni U, V , gdy T jest przestrzenią liniową nad ciałem K , odwzorowanie $\tau: U \times V \rightarrow T$ jest dwuliniowe i dla dowolnego odwzorowania

dwuliniowego $\varphi: U \times V \rightarrow W$ istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe $f: T \rightarrow W$ spełniające $\varphi = f \circ \tau$ (patrz diagram poniżej).



- (1) Niech F będzie przestrzenią liniową nad K o bazie $U \times V$ (elementami przestrzeni F są formalne kombinacje liniowe postaci $\sum_{i=1}^n \lambda_i(u_i, v_i)$, gdzie $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$, $u_1, \dots, u_n \in U$, $v_1, \dots, v_n \in V$ oraz $n \geq 1$). Rozważmy podprzestrzeń N w F rozpiętą przez wszystkie wektory postaci:

$$\begin{aligned}
 (u + u', v) - (u, v) - (u', v), & \quad (\lambda u, v) - \lambda(u, v), \\
 (u, v + v') - (u, v) - (u, v'), & \quad (u, \lambda v) - \lambda(u, v),
 \end{aligned}$$

gdzie $u, u' \in U$, $v, v' \in V$ oraz $\lambda \in K$. Niech $T = F/N$ będzie przestrzenią ilorazową, zaś $\tau: U \times V \rightarrow T$ będzie złożeniem odwzorowań kanonicznych

$$U \times V \longrightarrow F \longrightarrow F/N = T$$

(pierwsze odwzorowanie jest naturalnym zanurzeniem bazy $U \times V$ przestrzeni F w tę przestrzeń, natomiast drugie odwzorowanie jest naturalną projekcją). Wykaż, że para (T, τ) jest iloczynem tensorowym przestrzeni U, V .

- (2) Udowodnij, że gdy para (S, σ) również jest iloczynem tensorowym przestrzeni U, V , to istnieje jedyny taki izomorfizm $f \in \text{Hom}(T, S)$, że $\sigma = f \circ \tau$.

Uwaga. Skonstruowaną przestrzeń T oznaczamy przez $U \otimes V$. Jej elementy nazywamy *tensorami*, natomiast elementy zbioru $\tau(U \times V)$ nazywamy *tensorami prostymi*. Jeśli $(u, v) \in U \times V$, to tensor prosty $\tau(u, v)$ oznaczamy przez $u \otimes v$.

Zadanie 6.85. Niech U, V, W będą przestrzeniami liniowymi nad ciałem K . Wykaż, że:

- (1) $K \otimes V \cong V$.
- (2) $U \otimes V \cong V \otimes U$.
- (3) $U \otimes (V \otimes W) \cong (U \otimes V) \otimes W$.
- (4) $\text{Hom}(U, V; W) \cong \text{Hom}(U \otimes V, W) \cong \text{Hom}(U, \text{Hom}(V, W))$, gdzie $\text{Hom}(U, V; W)$ oznacza przestrzeń odwzorowań dwuliniowych z $U \times V$ w W .

Uwaga. Pierwszy izomorfizm z punktu (4) pozwala sprowadzić problem opisu odwzorowań dwuliniowych z $U \times V$ w W do opisu odwzorowań liniowych z $U \otimes V$ w W . Natomiast drugi izomorfizm oznacza (w języku teorii kategorii), że funktor iloczynu tensorowego $- \otimes V$ jest lewym funktorem sprzężonym funktora homomorfizmów $\text{Hom}(V, -)$.

Zadanie 6.86. Niech K będzie ciałem oraz $n, m \geq 1$. Sprawdź, że:

- (1) $K^n \otimes K^m \cong M_{n,m}(K)$.

$$(2) K[x] \otimes K[y] \cong K[x, y].$$

Wskaż jawnie powyższe izomorfizmy i wyznacz ich działanie na bazach kanonicznych rozważanych przestrzeni.

Zadanie 6.87. Niech $(U_i)_{i \in I}$ będzie rodziną przestrzeni wektorowych nad ciałem K . Dowiedz, że $(\bigoplus_{i \in I} U_i) \otimes V \cong \bigoplus_{i \in I} (U_i \otimes V)$ dla dowolnej przestrzeni liniowej V nad K . W szczególności gdy $U = \bigoplus_{i \in I} U_i$ oraz $V = \bigoplus_{j \in J} V_j$, to $U \otimes V \cong \bigoplus_{(i,j) \in I \times J} (U_i \otimes V_j)$.

Zadanie 6.88. Niech U, V będą przestrzeniami liniowymi nad ciałem K . Udowodnij, że gdy $\{u_i : i \in I\}$ jest bazą przestrzeni U , zaś $\{v_j : j \in J\}$ jest bazą przestrzeni V , to zbiór

$$\{u_i \otimes v_j : (i, j) \in I \times J\}$$

jest bazą przestrzeni $U \otimes V$. W szczególności $\dim(U \otimes V) = (\dim U)(\dim V)$.

Zadanie 6.89. Załóżmy, że $f_1 \in \text{Hom}(U_1, V_1)$ oraz $f_2 \in \text{Hom}(U_2, V_2)$.

(1) Udowodnij, że odwzorowanie

$$U_1 \times U_2 \ni (u_1, u_2) \mapsto f_1(u_1) \otimes f_2(u_2) \in V_1 \otimes V_2$$

jest dwuliniowe. Następnie wykorzystując definicję iloczynu tensorowego wykaż, że istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe $U_1 \otimes U_2 \rightarrow V_1 \otimes V_2$, które na każdym tensorze prostym $u_1 \otimes u_2 \in U_1 \otimes U_2$ przyjmuje wartość $f_1(u_1) \otimes f_2(u_2)$. Tak otrzymane odwzorowanie liniowe oznaczamy przez $f_1 \otimes f_2$ (patrz Uwaga).

(2) Korzystając z punktu (1) otrzymujemy odwzorowanie

$$\text{Hom}(U_1, V_1) \times \text{Hom}(U_2, V_2) \ni (f_1, f_2) \mapsto f_1 \otimes f_2 \in \text{Hom}(U_1 \otimes U_2, V_1 \otimes V_2).$$

Uzasadnij, iż jest ono dwuliniowe oraz, że indukuje odwzorowanie liniowe

$$j: \text{Hom}(U_1, V_1) \otimes \text{Hom}(U_2, V_2) \rightarrow \text{Hom}(U_1 \otimes U_2, V_1 \otimes V_2),$$

które jest iniektywne.

(3) Dowiedz, że gdy przestrzenie U_1, U_2 oraz V_1, V_2 są skończonego wymiaru, to wtedy odwzorowanie $j: \text{Hom}(U_1, V_1) \otimes \text{Hom}(U_2, V_2) \rightarrow \text{Hom}(U_1 \otimes U_2, V_1 \otimes V_2)$ z punktu (2) jest izomorfizmem.

Uwaga. Symbol $f_1 \otimes f_2$ w punkcie (1) jest niejednoznaczny, gdyż może oznaczać zarówno tensor prosty w przestrzeni $\text{Hom}(U_1, V_1) \otimes \text{Hom}(U_2, V_2)$, a także odwzorowanie liniowe $U_1 \otimes U_2 \rightarrow V_1 \otimes V_2$, czyli element przestrzeni $\text{Hom}(U_1 \otimes U_2, V_1 \otimes V_2)$ (tej interpretacji symbolu $f_1 \otimes f_2$ użyliśmy w punktach (1) oraz (2)). Punkt (2) natomiast oznacza, że ta drobna kolizja oznaczeń nie prowadzi do kłopotów (dzięki iniektywności odwzorowania j).

Zadanie 6.90. Załóżmy, że U_1, U_2 oraz V_1, V_2 są skończone wymiarowymi przestrzeniami liniowymi nad ciałem K . Niech $f_1 \in \text{Hom}(U_1, V_1)$ oraz $f_2 \in \text{Hom}(U_2, V_2)$. Przypuśćmy, że:

$$\begin{aligned} A_1 = \{u_1^1, \dots, u_p^1\} \text{ jest bazą } U_1, & \quad B_1 = \{v_1^1, \dots, v_r^1\} \text{ jest bazą } V_1, \\ A_2 = \{u_1^2, \dots, u_q^2\} \text{ jest bazą } U_2, & \quad B_2 = \{v_1^2, \dots, v_s^2\} \text{ jest bazą } V_2. \end{aligned}$$

Niech ponadto

$$A = \{u_i^1 \otimes u_j^2 : 1 \leq i \leq p \text{ oraz } 1 \leq j \leq q\},$$

$$B = \{v_k^1 \otimes v_l^2 : 1 \leq k \leq r \text{ oraz } 1 \leq l \leq s\}.$$

Sprawdź, że gdy $M_{A_1 B_1}(f_1) = M_1$ oraz $M_{A_2 B_2}(f_2) = M_2$, to $M_{AB}(f_1 \otimes f_2) = M_1 \otimes M_2$, gdzie $M_1 \otimes M_2$ oznacza iloczyn Kroneckera macierzy M_1 oraz M_2 .

Zadanie 6.91. Załóżmy, że

$$0 \longrightarrow U \xrightarrow{f} V \xrightarrow{g} W \longrightarrow 0$$

jest krótkim ciągiem dokładnym przestrzeni wektorowych nad ciałem K . Udowodnij, że gdy X jest przestrzenią K -liniową, to ciągi indukowane

$$0 \longrightarrow X \otimes U \xrightarrow{\text{id}_X \otimes f} X \otimes V \xrightarrow{\text{id}_X \otimes g} X \otimes W \longrightarrow 0$$

oraz

$$0 \longrightarrow U \otimes X \xrightarrow{f \otimes \text{id}_X} V \otimes X \xrightarrow{g \otimes \text{id}_X} W \otimes X \longrightarrow 0$$

są dokładne.

Uwaga. Dokładność powyższych ciągów indukowanych wiąże się z pojęciem *płaskości*. Zadanie to pokazuje, że każda przestrzeń wektorowa X jest tzw. płaskim K -modułem. Nie jest tak w innych kategoriach modułów. Przykładowo nie każda grupa abelowa, czyli \mathbb{Z} -moduł, jest płaska (np. grupa \mathbb{Z}_n nie jest płaska dla dowolnego $n \geq 2$).

Zadanie 6.92. Niech $V \neq 0$ będzie przestrzenią liniową nad \mathbb{R} . Gdy $\dim V = n < \infty$ oraz $\{e_1, \dots, e_n\}$ jest bazą przestrzeni V , to wiemy, że $B = \{e_i \otimes e_j : 1 \leq i, j \leq n\}$ jest bazą przestrzeni $V \otimes V$. Zatem każdy tensor $t \in V \otimes V$ zapisuje się (jednoznacznie) jako

$$t = \sum_{i,j=1}^n t_{ij} e_i \otimes e_j,$$

gdzie $t_{ij} \in \mathbb{R}$ dla $1 \leq i, j \leq n$ (są to *współrzędne tensora t w bazie B*). Czy jeśli:

- (1) $t_{ij} = i \cdot j$ dla $1 \leq i, j \leq n$,
- (2) $t_{ij} = \delta_{ij}$ dla $1 \leq i, j \leq n$,
- (3) $t_{ij} = i + j$ dla $1 \leq i, j \leq n$,

to tensor t jest prosty?

Zadanie 6.93. Niech $U, V \neq 0$ będą przestrzeniami liniowymi nad ciałem K . Rzędem tensora $0 \neq t \in U \otimes V$ nazywamy liczbę

$$\text{rank } t = \min\{n \geq 1 : t = \sum_{i=1}^n u_i \otimes v_i \text{ dla pewnych } u_i \in U \text{ oraz } v_i \in V\},$$

tzn. $\text{rank } t$ jest najmniejszą taką liczbą $n \geq 1$, że tensor t da się zapisać jako suma n tensorów prostych. Gdy $t = 0 \in U \otimes V$, to kładziemy $\text{rank } t = 0$.

- (1) Niech $0 \neq t = \sum_{i=1}^n u_i \otimes v_i \in U \otimes V$. Udowodnij, że $\text{rank } t = n$ wtedy i tylko wtedy, gdy ciągi $u_1, \dots, u_n \in U$ oraz $v_1, \dots, v_n \in V$ są liniowo niezależne.
- (2) Wykorzystując punkt (1) dowiedz, że odwzorowanie $j: U^* \otimes V \rightarrow \text{Hom}(U, V)$, zadane na tensorach prostych wzorem $j(\phi \otimes v)(u) = \phi(u)v$ dla $u \in U, v \in V$ oraz $\phi \in U^*$, jest poprawnie określone, liniowe i iniektywne.
- (3) Wykaż, że obrazem odwzorowania $j: U^* \otimes V \rightarrow \text{Hom}(U, V)$ z punktu (2) jest podprzestrzeń $H = \{f \in \text{Hom}(U, V) : \text{rank } f < \infty\}$.
- (4) Wywnioskuj z punktów (2) oraz (3), że jeżeli $\dim U < \infty$ lub $\dim V < \infty$, to odwzorowanie $j: U^* \otimes V \rightarrow \text{Hom}(U, V)$ jest izomorfizmem. W szczególności gdy przestrzeń $U = V$ jest skończonego wymiaru, to $V^* \otimes V \cong \text{End}(V)$. Jakiemu tensorowi $t \in V^* \otimes V$ odpowiada w tej sytuacji odwzorowanie $\text{id}_V \in \text{End}(V)$?
- (5) Załóżmy, że $k: U \otimes V \rightarrow \text{Hom}(U^*, V)$ jest złożeniem monomorfizmów

$$U \otimes V \longrightarrow U^{**} \otimes V \longrightarrow \text{Hom}(U^*, V)$$

(pierwszy z nich jest indukowany przez kanoniczne zanurzenie U w U^{**} , zaś drugi został opisany w punkcie (2)), tzn. mamy $k(u \otimes v)(\phi) = \phi(u)v$ dla $u \in U, v \in V$ oraz $\phi \in U^*$. Wykaż, że gdy $t = \sum_{i=1}^n u_i \otimes v_i \in U \otimes V$ oraz $n = \text{rank } t$, to $\text{Im } k(t) = \text{Lin}(v_1, \dots, v_n)$. Wywnioskuj stąd, że $\text{rank } t = \text{rank } k(t)$.

Zadanie 6.94. Załóżmy, że U, V są przestrzeniami liniowymi nad ciałem K . Mówimy, że odwzorowanie dwuliniowe $\varphi: U \times U \rightarrow V$ jest *antysymetryczne* (lub *skośnie symetryczne* lub *alternujące*) gdy $\varphi(u, u) = 0$ dla dowolnego $u \in U$ (gdy $\text{char } K \neq 2$, to definicja ta jest równoważna z żądaniem, aby $\varphi(u_1, u_2) = -\varphi(u_2, u_1)$ dla dowolnych $u_1, u_2 \in U$; sprawdź to). Rozważmy iloczyn tensorowy $U \otimes U$ oraz jego podprzestrzeń N rozpiętą przez zbiór $\{u \otimes u : u \in U\}$. Niech $\Lambda^2 U = (U \otimes U)/N$, zaś $\tau: U \times U \rightarrow \Lambda^2 U$ będzie złożeniem odwzorowań kanonicznych

$$U \times U \longrightarrow U \otimes U \longrightarrow (U \otimes U)/N = \Lambda^2 U.$$

- (1) Sprawdź, że para $(\Lambda^2 U, \tau)$ ma następującą własność uniwersalną: dla dowolnego odwzorowania dwuliniowego antisymetrycznego $\varphi: U \times U \rightarrow V$ istnieje dokładnie jedno takie odwzorowanie liniowe $f: \Lambda^2 U \rightarrow V$, że $\varphi = f \circ \tau$ (patrz diagram poniżej).

$$\begin{array}{ccc}
 & U \times U & \\
 \tau \swarrow & & \searrow \varphi \\
 \Lambda^2 U & \text{-----} & V \\
 & f &
 \end{array}$$

- (2) Niech $\text{Hom}_a^2(U, V)$ oznacza przestrzeń odwzorowań dwuliniowych alternujących z $U \times U$ w V . Wykaż, że $\text{Hom}_a^2(U, V) \cong \text{Hom}(\Lambda^2 U, V)$.
- (3) Udowodnij, że gdy $\dim U = n < \infty$ oraz zbiór $\{u_1, \dots, u_n\}$ jest bazą przestrzeni U , to zbiór

$$\{u_i \wedge u_j : 1 \leq i < j \leq n\}$$

jest bazą przestrzeni $\Lambda^2 U$. W szczególności $\dim \Lambda^2 U = \frac{n(n-1)}{2}$.

Uwaga. Elementy przestrzeni $\Lambda^2 U$ nazywamy czasami *2-wektorami*, natomiast elementy zbioru $\tau(U \times U)$ nazywamy *2-wektorami prostymi*. Jeśli $(u, v) \in U \times U$, to 2-wektor prosty $\tau(u, v)$ oznaczamy przez $u \wedge v$. Izomorfizm z punktu (2) sprowadza problem opisu odwzorowań dwuliniowych alternujących z $U \times U$ w V do opisu odwzorowań liniowych z $\Lambda^2 U$ w V . Para $(\Lambda^2 U, \tau)$ (lub czasem sama przestrzeń $\Lambda^2 U$) jest nazywana (drugą) *potęgą zewnętrzną* przestrzeni U . Czy wzorując się na poprzednich zadaniach potrafisz podać definicję odwzorowania dwuliniowego symetrycznego $U \times U \rightarrow V$ i skonstruować (drugą) *potęgę symetryczną* przestrzeni U ?

Zadanie 6.95. Załóżmy, że V jest przestrzenią wektorową nad ciałem K charakterystyki $\neq 2$. Zdefiniujmy *operator symetryzacji* $S \in \text{End}(V \otimes V)$ oraz *operator antysymetryzacji* $A \in \text{End}(V \otimes V)$ wzorami

$$S(v_1 \otimes v_2) = \frac{1}{2}(v_1 \otimes v_2 + v_2 \otimes v_1), \quad A(v_1 \otimes v_2) = \frac{1}{2}(v_1 \otimes v_2 - v_2 \otimes v_1)$$

dla $v_1, v_2 \in V$ (uzasadnij, że definicja jest poprawna). Mówimy, że tensor $t \in V \otimes V$ jest *symetryczny* (odpowiednio *antysymetryczny*) gdy $S(t) = t$ (odpowiednio $A(t) = t$). Pokaż, że:

- (1) $S + A = \text{id}_{V \otimes V}$ oraz $S \circ A = A \circ S = 0$.
- (2) operatory S oraz A są *idempotentne*, tzn. $S \circ S = S$ oraz $A \circ A = A$.
- (3) $\text{Ker } S = \text{Im } A$ oraz $\text{Im } S = \text{Ker } A$. Wywnioskuj stąd, że tensor $t \in V \otimes V$ jest symetryczny (odpowiednio antysymetryczny) wtedy i tylko wtedy, gdy $A(t) = 0$ (odpowiednio $S(t) = 0$).
- (4) $\Lambda^2 V \cong \text{Ker } S = \text{Im } A$.

Uwaga. Punkt (3) powyższego zadania gwarantuje, że gdy $\text{char } K \neq 2$, to druga potęga zewnętrzna $\Lambda^2 V$ przestrzeni V może być identyfikowana z podprzestrzenią $\text{Ker } S = \text{Im } A$ przestrzeni $V \otimes V$ złożoną z tensorów antysymetrycznych.

Zadanie 6.96. Załóżmy, że U, V są przestrzeniami wektorowymi nad ciałem K oraz $f \in \text{Hom}(U, V)$.

- (1) Udowodnij, że odwzorowanie

$$U \times U \ni (u_1, u_2) \mapsto f(u_1) \wedge f(u_2) \in \Lambda^2 V$$

jest dwuliniowe alternujące. Następnie wykorzystując definicję potęgi zewnętrznej wykaż, że istnieje jedyne odwzorowanie liniowe $\Lambda^2 U \rightarrow \Lambda^2 V$, które na dowolnym 2-wektorze prostym $u_1 \wedge u_2 \in \Lambda^2 U$ przyjmuje wartość $f(u_1) \wedge f(u_2)$. Tak uzyskane odwzorowanie liniowe oznaczamy przez $\Lambda^2 f$.

- (2) Niech $\dim U = m < \infty$ oraz $\dim V = n < \infty$. Załóżmy, że $A = \{u_1, \dots, u_m\}$ jest bazą przestrzeni U , zaś $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ jest bazą przestrzeni V . Załóżmy też, że $M = M_{AB}(f) \in M_{n,m}(K)$. Niech

$$\Lambda^2(k) = \{(i, j) \in \mathbb{N}^2 : 1 \leq i < j \leq k\} \quad (k \geq 1)$$

i zdefiniujemy

$$E = \{u_{j_1} \wedge u_{j_2} : (j_1, j_2) \in \Lambda^2(m)\}, \quad F = \{v_{i_1} \wedge v_{i_2} : (i_1, i_2) \in \Lambda^2(n)\}$$

(jak wiemy są to bazy przestrzeni, odpowiednio, $\Lambda^2 U$ oraz $\Lambda^2 V$). Jeśli $M = [a_{ij}]$, to dla dowolnych $I = (i_1, i_2) \in \Lambda^2(n)$ oraz $J = (j_1, j_2) \in \Lambda^2(m)$ niech

$$M_{IJ} = \begin{bmatrix} a_{i_1 j_1} & a_{i_1 j_2} \\ a_{i_2 j_1} & a_{i_2 j_2} \end{bmatrix} \in M_2(K).$$

Wykaż, że $M_{EF}(\Lambda^2 f) = [\det M_{IJ}] \in M_{p,q}(K)$, gdzie $p = \frac{n(n-1)}{2}$ oraz $q = \frac{m(m-1)}{2}$.

Zadanie 6.97. Załóżmy, że V jest przestrzenią liniową nad ciałem K oraz $f \in \text{End}(V)$. Przypuśćmy, że $\dim V = n < \infty$. Udowodnij, że gdy B jest bazą przestrzeni V oraz $M = M_B(f) = [a_{ij}] \in M_n(K)$, to

$$\text{tr}(\Lambda^2 f) = \sum_{I \in \Lambda^2(n)} \det M_{II} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_{ii}a_{jj} - a_{ij}a_{ji}).$$

Zadanie 6.98. Załóżmy, że

$$0 \longrightarrow U \xrightarrow{f} V \xrightarrow{g} W \longrightarrow 0$$

jest krótkim ciągiem dokładnym przestrzeni wektorowych. Dowiedz, że wtedy $\Lambda^2 f$ jest monomorfizmem, $(\Lambda^2 g) \circ (\Lambda^2 f) = 0$ oraz $\Lambda^2 g$ jest epimorfizmem. Czy ciąg indukowany

$$0 \longrightarrow \Lambda^2 U \xrightarrow{\Lambda^2 f} \Lambda^2 V \xrightarrow{\Lambda^2 g} \Lambda^2 W \longrightarrow 0$$

jest zawsze dokładny?

Zadanie 6.99. Załóżmy, że U oraz V są przestrzeniami wektorowymi nad ciałem K . Udowodnij, że

$$\Lambda^2(U \oplus V) \cong \Lambda^2 U \oplus (U \otimes V) \oplus \Lambda^2 V.$$

Zadanie 6.100. Niech $V \neq 0$ będzie przestrzenią wektorową nad ciałem K . Rzędem 2-wektora $0 \neq \omega \in \Lambda^2 V$ nazywamy liczbę

$$\text{rank } \omega = \min\{n \geq 1 : \omega = \sum_{i=1}^n u_i \wedge v_i \text{ dla pewnych } u_i, v_i \in V\},$$

tzn. $\text{rank } \omega$ jest najmniejszą taką liczbą $n \geq 1$, że 2-wektor ω da się zapisać jako suma n 2-wektorów prostych. Gdy $\omega = 0 \in \Lambda^2 V$, to kładziemy $\text{rank } \omega = 0$.

- (1) Załóżmy, że $0 \neq \omega = \sum_{i=1}^n u_i \wedge v_i \in \Lambda^2 V$. Udowodnij, że gdy $\text{rank } \omega = n$, to ciągi $u_1, \dots, u_n \in V$ oraz $v_1, \dots, v_n \in V$ są liniowo niezależne. Czy prawdziwa jest implikacja odwrotna?
- (2) Załóżmy, że $\text{char } K \neq 2$ oraz $\dim V = n < \infty$. Przypuśćmy, że $\{e_1, \dots, e_n\}$ jest bazą przestrzeni V . Zapiszmy 2-wektor $\omega \in \Lambda^2 V$ jako $\omega = \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} e_i \wedge e_j$, gdzie macierz $A = [a_{ij}] \in M_n(K)$ jest *antysymetryczna* (tzn. spełnia $A^t = -A$). Dowiedz, że $\text{rank } A = 2 \text{rank } \omega$.

7 Funkcjonały i przestrzeń dualna

Zadanie 7.1. Niech K będzie ciałem oraz $V = K[x]$. Powiemy, że funkcjonał $\phi \in V^*$ jest *multiplikatywny* gdy $\phi(f \cdot g) = \phi(f) \cdot \phi(g)$ dla dowolnych $f, g \in V$.

- (1) Uzasadnij, że dla dowolnego $a \in K$ odwzorowanie $\phi_a: V \rightarrow K$, dane wzorem $\phi_a(f) = f(a)$, jest funkcjonałem multiplikatywnym.
- (2) Udowodnij, że każdy funkcjonał multiplikatywny $0 \neq \phi \in V^*$ jest takiej postaci jak w punkcie (1), tzn. $\phi = \phi_a$ dla pewnego $a \in K$.

Zadanie 7.2. Załóżmy, że K jest ciałem oraz $n \geq 1$. Dla funkcjonału $f: M_n(K) \rightarrow K$ rozważmy następujące warunki:

- (1) $f(AB) = f(BA)$ dla dowolnych macierzy $A, B \in M_n(K)$.
- (2) $f(A) = 0$ dla dowolnej macierzy $A \in M_n(K)$ spełniającej $A^2 = 0$.

Wykaż, że gdy f spełnia warunek (1) lub (2), to istnieje taki skalar $\lambda \in K$, że $f = \lambda \text{tr}$.

Zadanie 7.3. Załóżmy, że K jest ciałem oraz $n \geq 1$. Udowodnij, że gdy $f: M_n(K) \rightarrow K$ jest funkcjonałem, to istnieje taka macierz $A \in M_n(K)$, że $f(X) = \text{tr}(AX)$ dla dowolnej macierzy $X \in M_n(K)$. Czy macierz A jest wyznaczona jednoznacznie?

Zadanie 7.4. Niech K będzie ciałem oraz $n \geq 1$. Pokaż, że podprzestrzeń $V \subseteq M_n(K)$ spełnia $\text{codim } V = 1$ wtedy i tylko wtedy, gdy $V = \{X \in M_n(K) : \text{tr}(AX) = 0\}$ dla pewnej macierzy $0 \neq A \in M_n(K)$.

Zadanie 7.5. Niech $n \geq 1$ oraz $V = \mathbb{R}^n$. Załóżmy, że funkcja ciągła $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ spełnia $f(0) = 0$ oraz $2f(u+v) = f(2u) + f(2v)$ dla dowolnych $u, v \in V$. Dowiedz, że $f \in V^*$.

Zadanie 7.6. Niech V będzie przestrzenią liniową. Uzasadnij, że przestrzeń dualna V^* rozdziela punkty przestrzeni V , tzn. dla dowolnych $u, v \in V$ spełniających $u \neq v$ istnieje taki funkcjonał $f \in V^*$, że $f(u) \neq f(v)$.

Zadanie 7.7. Załóżmy, że V jest przestrzenią wektorową nad ciałem K oraz $0 \neq f \in V^*$. Sprawdź, że $V = \text{Ker } f \oplus \text{Lin}(v)$ dla dowolnego $v \in V \setminus \text{Ker } f$.

Zadanie 7.8. Niech X będzie przestrzenią liniową. Uzasadnij, że właściwa podprzestrzeń $U \subseteq X$ jest maksymalna (względem inkluzji) wtedy i tylko wtedy, gdy $U = \text{Ker } f$ dla pewnego funkcjonału $0 \neq f \in X^*$.

Zadanie 7.9. Niech K będzie ciałem oraz $1 \leq d \leq n$. Uzasadnij, że każda d -wymiarowa podprzestrzeń V w K^n da się przedstawić jako przecięcie dokładnie $n - d$ podprzestrzeni kowymiaru 1. Czy możliwe jest by przedstawić podprzestrzeń V jako przecięcie mniej niż $n - d$ podprzestrzeni kowymiaru 1?

Zadanie 7.10. Załóżmy, że V jest przestrzenią liniową nad ciałem K . Przypuśćmy, że funkcjonały $f, g \in V^*$ spełniają $\text{Ker } f = \text{Ker } g$. Pokaż, że $g = \lambda f$ dla pewnego $0 \neq \lambda \in K$.

Zadanie 7.11. Załóżmy, że V jest przestrzenią liniową oraz $f, g \in V^*$. Uzasadnij, że gdy $f(v)g(v) = 0$ dla dowolnego $v \in V$, to $f = 0$ lub $g = 0$. Czy wynik ten można uogólnić na więcej niż dwa funkcjonały?

Zadanie 7.12. Niech $V \neq 0$ będzie przestrzenią liniową nad ciałem K . Udowodnij, że gdy $\dim V = n < \infty$, to funkcjonały $f_1, \dots, f_n \in V^*$ są liniowo niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy $\text{Ker } f_1 \cap \dots \cap \text{Ker } f_n = 0$.

Zadanie 7.13. Załóżmy, że V jest przestrzenią wektorową nad ciałem K oraz $n \geq 1$. Przypuśćmy, że $f \in V^*$ oraz $f_1, \dots, f_n \in V^*$. Dowiedz, że $f \in \text{Lin}(f_1, \dots, f_n)$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\text{Ker } f_1 \cap \dots \cap \text{Ker } f_n \subseteq \text{Ker } f$.

Zadanie 7.14. Załóżmy, że X jest przestrzenią wektorową nad ciałem K oraz $n \geq 1$. Pokaż, że:

- (1) wektory $v_1, \dots, v_n \in X$ są liniowo niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją takie funkcjonały $f_1, \dots, f_n \in X^*$, że macierz $[f_i(v_j)] \in M_n(K)$ jest nieosobliwa.
- (2) funkcjonały $f_1, \dots, f_n \in X^*$ są liniowo niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją takie wektory $v_1, \dots, v_n \in X$, że macierz $[f_i(v_j)] \in M_n(K)$ jest nieosobliwa.

Zadanie 7.15. Niech $V = \mathbb{F}_p^3$. Zdefiniujmy funkcjonały $f_1, f_2, f_3 \in V^*$ wzorem

$$f_1(x, y, z) = x + y + 4z, \quad f_2(x, y, z) = 4x + y, \quad f_3(x, y, z) = 2x + y + z.$$

Dla jakich $p \in \mathbb{P}$ zbiór $\{f_1, f_2, f_3\} \subseteq V^*$ jest liniowo niezależny?

Zadanie 7.16. Załóżmy, że $X \neq 0$ jest skończenie wymiarową przestrzenią liniową nad ciałem K . Niech $n \geq 1$ oraz $f_1, \dots, f_n \in X^*$. Zdefiniujmy $U = \bigcap_{i=1}^n \text{Ker } f_i$ i przypuśćmy, że $W \subseteq X$ jest podprzestrzenią zawierającą U .

- (1) Czy zawsze istnieje taki podzbiór $I \subseteq \{1, \dots, n\}$, że $W = \bigcap_{i \in I} \text{Ker } f_i$?
- (2) Uzasadnij, że gdy $W \neq X$, to istnieją takie, nie wszystkie równe zeru, skalary $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$, że funkcjonał $f = \sum_{i=1}^n \lambda_i f_i \in X^*$ spełnia $f(W) = 0$.

Zadanie 7.17. Załóżmy, że V jest rzeczywistą przestrzenią wektorową. Zdefiniujmy w zbiorze $V^{\mathbb{C}} = V \times V$ działania

$$(v, w) + (v', w') = (v + v', w + w'), \\ (a + ib) \cdot (v, w) = (av - bw, bv + aw),$$

gdzie $v, w, v', w' \in V$ oraz $a, b \in \mathbb{R}$.

- (1) Pokaż, że trójka $(V^{\mathbb{C}}, +, \cdot)$ jest przestrzenią liniową nad ciałem \mathbb{C} .
- (2) Udowodnij, że $V^{\mathbb{C}} \cong V \otimes \mathbb{C}$ oraz $(V^{\mathbb{C}})^* \cong (V^*)^{\mathbb{C}}$.

Uwaga. Przestrzeń zespoloną $V^{\mathbb{C}}$ nazywamy *kompleksyfikacją* przestrzeni rzeczywistej V . Parę $(v, w) \in V^{\mathbb{C}}$ można identyfikować z wyrażeniem formalnym postaci $v + iw$. Przy takiej identyfikacji iloczyn $(a + ib) \cdot (v + iw)$ przyjmuje łatwą do zapamiętania postać

$$(a + ib) \cdot (v + iw) = (av - bw) + i(bv + aw).$$

Zadanie 7.18. Załóżmy, że $U, V \neq 0$ są przestrzeniami wektorowymi nad ciałem K . Pokaż, że:

- (1) $(U \oplus V)^* \cong U^* \oplus V^*$.
- (2) gdy $\dim U < \infty$ oraz $\dim V < \infty$, to $(U \otimes V)^* \cong U^* \otimes V^*$.
- (3) gdy $\dim V < \infty$, to $(\Lambda^2 V)^* \cong \Lambda^2 V^*$.

Czy jeśli przestrzeń U lub V jest nieskończonego wymiaru, to tezy punktów (2) oraz (3) pozostają prawdziwe?

Zadanie 7.19. Załóżmy, że $B = \{e_i : i \in I\}$ jest bazą przestrzeni liniowej V . Zdefiniujmy rodzinę funkcyjałów $B^* = \{e_i^* : i \in I\} \subseteq V^*$ przyjmując, że $e_i^*(e_j) = \delta_{ij}$ dla $i, j \in I$.

- (1) Sprawdź, że zbiór B^* jest liniowo niezależny; w szczególności $\dim V \leq \dim V^*$.
- (2) Udowodnij, że zbiór B^* rozpiną V^* wtedy i tylko wtedy, gdy $\dim V < \infty$.

Zadanie 7.20. Załóżmy, że V jest przestrzenią liniową nad ciałem K . Wykaż, że gdy wymiar przestrzeni V jest nieskończony, to przestrzeń V oraz V^* nie są izomorficzne.

Uwaga. Gdy $|K| = \kappa$ oraz $\dim V = \alpha \geq \aleph_0$, to można dowieść, że $\dim V^* = |V^*| = \kappa^\alpha$. Skoro $\kappa \geq 2$, to w szczególności dostajemy $\dim V = \alpha < 2^\alpha \leq \kappa^\alpha = \dim V^*$.

Zadanie 7.21. Czy każda przestrzeń liniowa jest izomorficzna z przestrzenią dualną do pewnej przestrzeni wektorowej?

Zadanie 7.22. Załóżmy, że U, V są przestrzeniami liniowymi. Sprawdź, że gdy choć jedna z przestrzeni U, V jest skończonego wymiaru, to $U^* \cong V^* \implies U \cong V$. Czy implikacja ta pozostaje prawdziwa gdy obie przestrzenie U, V są nieskończonego wymiaru?

Zadanie 7.23. Załóżmy, że K jest ciałem oraz $V = K[x]$. Zdefiniujmy odwzorowanie $\phi_a : V \rightarrow K$ dla $a \in K$ wzorem $\phi_a(f) = f(a)$. Uzasadnij, że $\{\phi_a : a \in K\}$ jest liniowo niezależnym podzbiorem przestrzeni dualnej V^* .

Zadanie 7.24. Niech $S \neq \emptyset$ będzie dowolnym zbiorem. Rozważmy przestrzeń liniową $V = \mathcal{P}(S)$ nad ciałem \mathbb{F}_2 z działaniami

$$A + B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \quad \text{oraz} \quad \lambda \cdot A = \begin{cases} \emptyset & \text{gdy } \lambda = 0, \\ A & \text{gdy } \lambda = 1. \end{cases}$$

Dla $s \in S$ zdefiniujmy odwzorowanie $f_s : V \rightarrow \mathbb{F}_2$ wzorem

$$f_s(X) = \begin{cases} 1 & \text{gdy } s \in X, \\ 0 & \text{gdy } s \notin X. \end{cases}$$

- (1) Uzasadnij, że odwzorowania f_s dla $s \in S$ są funkcyjałami.
- (2) Sprawdź, że zbiór $B = \{f_s : s \in S\} \subseteq V^*$ jest liniowo niezależny.
- (3) Pokaż, że B jest bazą przestrzeni V^* wtedy i tylko wtedy, gdy $|S| < \infty$.

Zadanie 7.25. Niech $V = \mathbb{R}^3$. Znajdź bazę przestrzeni V^* sprzężoną względem bazy

$$B = \{(1, 2, 2), (2, 5, 5), (1, 3, 4)\}.$$

Podaj współrzędne funkcjonału $f \in V^*$, zdefiniowanego wzorem

$$f(x, y, z) = 3x - y + z,$$

w znalezionej bazie.

Zadanie 7.26. Niech $n \geq 1$ oraz $V = \mathbb{R}^n$. Załóżmy, że $e_1, \dots, e_n \in V$ są wektorami bazy standardowej. Zdefiniujmy wektory

$$v_i = e_1 + \dots + e_i \quad (1 \leq i \leq n).$$

Sprawdź, że $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ jest bazą przestrzeni V oraz opisz bazę przestrzeni V^* dualną względem bazy B .

Zadanie 7.27. Załóżmy, że $\{e_1, e_2, e_3\}$ jest bazą standardową przestrzeni $V = \mathbb{Q}^3$. Niech

$$f = 5e_1^* - 3e_2^* + e_3^* \in V^*.$$

Wyznacz wzór na f i podaj współrzędne tego funkcjonału w bazie $\{v_1^*, v_2^*, v_3^*\}$, gdzie $v_1 = (2, 1, 1)$, $v_2 = (1, 2, 3)$ oraz $v_3 = (0, 1, 1)$.

Zadanie 7.28. Niech $1 \leq n \leq m$ oraz $V = \{f \in \mathbb{R}[x] : \deg f \leq m\}$. Dowiedz, że gdy $\phi \in V^*$, to następujące warunki są równoważne:

- (1) $\phi(x^n f) = 0$ dla dowolnego $f \in V$ spełniającego $\deg f \leq m - n$.
- (2) istnieją takie $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, że $\phi(f) = \sum_{i=1}^n a_i f^{(i-1)}(0)$ dla dowolnego $f \in V$.

Zadanie 7.29. Niech $V = \mathbb{C}^3$. Sprawdź, że funkcjonały $f_1, f_2, f_3 \in V^*$, określone jako

$$f_1(x, y, z) = x + iy, \quad f_2(x, y, z) = x - iy, \quad f_3(x, y, z) = iz,$$

tworzą bazę przestrzeni V^* i skonstruuj taką bazę $\{v_1, v_2, v_3\}$ przestrzeni V , aby $v_j^* = f_j$ dla $1 \leq j \leq 3$.

Zadanie 7.30. Niech $V = \mathbb{R}^3$. Uzasadnij, że funkcjonały $f_1, f_2, f_3 \in V^*$, zdefiniowane wzorami

$$f_1(x, y, z) = 5x - 2y, \quad f_2(x, y, z) = -x - z, \quad f_3(x, y, z) = -x + y + z,$$

stanowią bazę przestrzeni V^* . Następnie znajdź taką bazę $\{v_1, v_2, v_3\}$ przestrzeni V , aby $v_j^* = f_1 + \dots + f_j$ dla $1 \leq j \leq 3$.

Zadanie 7.31. Niech $V = M_2(\mathbb{Q})$. Dowiedz, że funkcjonały $f_1, f_2, f_3, f_4 \in V^*$, określone wzorami

$$\begin{aligned} f_1(A) &= a_{11} - a_{12}, & f_2(A) &= a_{12} + 2a_{22}, \\ f_3(A) &= a_{12} - a_{21}, & f_4(A) &= a_{21} + 3a_{22} \end{aligned}$$

dla $A = [a_{ij}] \in V$, tworzą bazę przestrzeni V^* i skonstruuj taką bazę $\{E_1, E_2, E_3, E_4\}$ przestrzeni V , aby $E_j^* = f_j$ dla $1 \leq j \leq 4$.

Zadanie 7.32. Niech $V = \{f \in \mathbb{R}[x] : \deg f \leq 2\}$. Załóżmy, że $a, b \in \mathbb{R}$ spełniają $a \neq b$. Zdefiniujmy

$$f_j(x) = (x - a)^j(x - b)^{2-j} \quad (0 \leq j \leq 2).$$

Przyjmijmy $c = \frac{a+b}{2}$ oraz określmy funkcjonały $\phi_a, \phi_b, \phi_c \in V^*$ formułą

$$\phi_a(f) = f(a), \quad \phi_b(f) = f(b), \quad \phi_c(f) = f(c).$$

(1) Pokaż, że zbiory $\{f_0, f_1, f_2\}$ oraz $\{\phi_a, \phi_b, \phi_c\}$ są bazami przestrzeni, odpowiednio, V oraz V^* .

(2) Wyznacz macierz przejścia pomiędzy bazami $\{f_0^*, f_1^*, f_2^*\}$ oraz $\{\phi_a, \phi_b, \phi_c\}$.

Zadanie 7.33. Niech

$$X = \{(x_n)_{n=1}^\infty \in \mathbb{F}_5^\mathbb{N} : x_{n+3} = x_{n+2} - x_{n+1} + x_n \text{ dla } n \geq 1\}.$$

Zdefiniujmy odwzorowania $f_1, f_2, f_3: X \rightarrow \mathbb{F}_5$ wzorami $f_i(x) = x_i$ dla $1 \leq i \leq 3$, gdzie $x = (x_n)_{n=1}^\infty \in X$. Uzasadnij, że zbiór $\{f_1, f_2, f_3\}$ jest bazą przestrzeni X^* i wyznacz bazę $\{e_1, e_2, e_3\}$ przestrzeni X spełniającą $e_i^* = f_i$ dla $1 \leq i \leq 3$.

Zadanie 7.34. Niech $n \geq 1$ oraz $V = \{f \in \mathbb{R}[x] : \deg f \leq n\}$. Ustalmy liczby rzeczywiste $x_0 < \dots < x_n$ i rozważmy funkcjonały $\phi_0, \dots, \phi_n \in V^*$ zadane jako

$$\phi_j(f) = f(x_j) \quad (0 \leq j \leq n).$$

Czy zbiór $B = \{\phi_0, \dots, \phi_n\}$ jest bazą przestrzeni V^* ? Jeśli tak, to wyznacz współrzędne funkcjonału $\phi \in V^*$, danego wzorem $\phi(f) = \int_0^1 f(x)dx$, w bazie B .

Zadanie 7.35. Niech $n \geq 1$ oraz $V = \{f \in \mathbb{R}[x] : \deg f \leq n\}$. Wybierzmy liczbę $a \in \mathbb{R}$ i zdefiniujmy funkcjonały $\phi_0, \dots, \phi_n \in V^*$ formułą

$$\phi_j(f) = f^{(j)}(a) \quad (0 \leq j \leq n).$$

Pokaż, że zbiór $\{\phi_0, \dots, \phi_n\}$ jest bazą przestrzeni V^* i wyznacz taką bazę $\{f_0, \dots, f_n\}$ przestrzeni V , aby $f_j^* = \phi_j$ dla $0 \leq j \leq n$.

Zadanie 7.36. Niech $n \geq 1$ oraz $V = \{f \in \mathbb{R}[x] : \deg f \leq n\}$. Określmy funkcjonały $\phi_0, \dots, \phi_n \in V^*$ wzorem

$$\phi_j(f) = \int_0^1 f(x+j)dx \quad (0 \leq j \leq n).$$

Czy $\{\phi_0, \dots, \phi_n\}$ jest bazą przestrzeni V^* ? Jeśli tak, to wyznacz taką bazę $\{f_0, \dots, f_n\}$ przestrzeni V , aby $f_j^* = \phi_j$ dla $0 \leq j \leq n$.

Zadanie 7.37. Załóżmy, że $\{e_1, e_2, e_3\}$ jest bazą standardową przestrzeni \mathbb{R}^3 , natomiast $\{e_1^*, e_2^*, e_3^*\}$ jest bazą do niej dualną. Czy istnieje taka baza $\{v_1, v_2, v_3\}$ przestrzeni \mathbb{R}^3 , że $e_1^* = v_1^* + 2v_2^* - 3v_3^*$? Czy taka baza, jeśli istnieje, jest wyznaczona jednoznacznie?

Zadanie 7.38. Załóżmy, że K jest ciałem oraz $n \geq 1$. Przypuśćmy, że $\{u_0, \dots, u_n\}$ oraz $\{v_0, \dots, v_n\}$ są bazami przestrzeni $V = K^{n+1}$. Wykaż, że gdy $u_0 = v_0$, to $u_0^* = v_0^*$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\text{Lin}(u_1, \dots, u_n) = \text{Lin}(v_1, \dots, v_n)$.

Zadanie 7.39. Niech $X = l^2 = \{(x_n)_{n=1}^\infty \in \mathbb{R}^\mathbb{N} : \sum_{n=1}^\infty x_n^2 < \infty\}$ będzie przestrzenią ciągów sumowalnych z kwadratem (z naturalnymi działaniami). Dowiedz, że:

- (1) gdy $x = (x_n)_{n=1}^\infty \in X$, to funkcja $f_x: X \rightarrow \mathbb{R}$, dana wzorem $f_x(y) = \sum_{n=1}^\infty x_n y_n$ dla $y = (y_n)_{n=1}^\infty \in X$, jest dobrze określona i liniowa (czyli $f_x \in X^*$).
- (2) odwzorowanie $f: X \rightarrow X^*$, zdefiniowane jako $f(x) = f_x$ dla $x \in X$, jest liniowe oraz iniektywne (czyli jest monomorfizmem).

Czy odwzorowanie f jest epimorfizmem? Jeśli nie, to wskaż przykład funkcjonału z X^* , który nie leży w obrazie $\text{Im } f$ odwzorowania f .

Uwaga. Zdefiniujmy normę wektora $x = (x_n)_{n=1}^\infty \in X$ wzorem

$$\|x\| = \left(\sum_{n=1}^\infty x_n^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Mówimy, że funkcjonał $\phi \in X^*$ jest *ciągły*, jeżeli istnieje taka liczba $C = C(\phi) \geq 0$, że $|\phi(x)| \leq C\|x\|$ dla dowolnego $x \in X$. Słynne twierdzenie Riesz'a orzeka, że $\text{Im } f$ to dokładnie podprzestrzeń X^* złożona z funkcjonałów ciągłych.

Zadanie 7.40. Załóżmy, że V jest przestrzenią wektorową. Dla dowolnych podprzestrzeni $U \subseteq V$ oraz $H \subseteq V^*$ definiujemy

$$\begin{aligned} U^\perp &= \{\phi \in V^* : \phi(u) = 0 \text{ dla dowolnego } u \in U\}, \\ H_\perp &= \{v \in V : \phi(v) = 0 \text{ dla dowolnego } \phi \in H\}. \end{aligned}$$

Udowodnij, że:

- (1) U^\perp jest podprzestrzenią przestrzeni V^* oraz $(U^\perp)_\perp = U$.
- (2) H_\perp jest podprzestrzenią przestrzeni V oraz $(H_\perp)^\perp \supseteq H$.

Przypuśćmy, że $(U_i)_{i \in I}$ jest rodziną podprzestrzeni przestrzeni V , zaś $(H_i)_{i \in I}$ jest rodziną podprzestrzeni przestrzeni V^* . Wykaż, że:

- (3) $(\sum_{i \in I} U_i)^\perp = \bigcap_{i \in I} U_i^\perp$.
- (4) $(\bigcap_{i \in I} U_i)^\perp \supseteq \sum_{i \in I} U_i^\perp$.
- (5) $(\sum_{i \in I} H_i)_\perp = \bigcap_{i \in I} H_{i\perp}$.
- (6) $(\bigcap_{i \in I} H_i)_\perp \supseteq \sum_{i \in I} H_{i\perp}$.
- (7) gdy $\dim V < \infty$, to $\dim U + \dim U^\perp = \dim H + \dim H_\perp = \dim V$.

Dowiedz, że gdy $\dim V < \infty$, to inkluzje w punktach (2), (4) oraz (6) można zastąpić równościami. Czy jest prawdą, że można zrobić to zawsze?

Uwaga. Niech $\text{Lat}(V)$ (odpowiednio $\text{Lat}(V^*)$) oznacza rodzinę wszystkich podprzestrzeni V (odpowiednio V^*). Gdy $\dim V < \infty$, to powyższe zadanie gwarantuje, że odwzorowania

$$\text{Lat}(V) \ni U \mapsto U^\perp \in \text{Lat}(V^*) \quad \text{oraz} \quad \text{Lat}(V^*) \ni H \mapsto H_\perp \in \text{Lat}(V)$$

są wzajemnie odwrotnymi bijekcjami (a nawet *antyizomorfizmami krat*).

Zadanie 7.41. Niech

$$V = \text{Lin}((1, 2, 0, -3), (-2, 3, 2, -3), (-3, 1, 2, 0)) \subseteq \mathbb{R}^4.$$

Opisz przestrzeń V^\perp równaniami i wyznacz jej bazę oraz wymiar.

Zadanie 7.42. Niech

$$U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{C}^4 : x_1 + 2x_2 - ix_3 + x_4 = 0\},$$

$$V = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{C}^4 : x_1 - ix_2 + x_3 - 3x_4 = 0\}.$$

Wyznacz bazy i wymiary przestrzeni U^\perp , V^\perp oraz $U^\perp + V^\perp$. Następnie podaj przykład, o ile istnieje, funkcjonału $f \in (U^\perp + V^\perp) \setminus (U^\perp \cup V^\perp)$.

Zadanie 7.43. Przypuśćmy, że przestrzeń wektorowa X jest sumą prostą $X = U \oplus V$ podprzestrzeni U oraz V . Dowiedz, że $X^* = U^\perp \oplus V^\perp$.

Zadanie 7.44. Załóżmy, że $f \in \text{Hom}(U, V)$. Udowodnij, że:

- (1) $\text{Ker } f^* = (\text{Im } f)^\perp$ oraz $(\text{Ker } f^*)^\perp = \text{Im } f$.
- (2) $\text{Im } f^* = (\text{Ker } f)^\perp$ oraz $(\text{Im } f^*)^\perp = \text{Ker } f$.

Zadanie 7.45. Przypuśćmy, że $f \in \text{End}(V)$. Uzasadnij, że podprzestrzeń $U \subseteq V$ jest f -niezmiennicza wtedy i tylko wtedy, gdy podprzestrzeń U^\perp jest f^* -niezmiennicza.

Zadanie 7.46. Rozważmy endomorfizm $f \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$ dany wzorem

$$f(x, y, z) = (x - 2y + z, 0, x + y + z).$$

Wyznacz wszystkie dwuwymiarowe f -niezmienniczne podprzestrzenie $V \subseteq \mathbb{R}^3$.

Zadanie 7.47. Załóżmy, że V jest skończenie wymiarową przestrzenią liniową nad ciałem K . Niech $f \in \text{End}(V)$. Udowodnij, że gdy każda podprzestrzeń $U \subseteq V$ kowymiaru 1 jest f -niezmiennicza, to $f = \lambda \text{id}_V$ dla pewnego $\lambda \in K$.

Zadanie 7.48. Niech $f \in \text{Hom}(U, V)$ oraz $g \in \text{Hom}(V, W)$. Pokaż, że $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$.

Zadanie 7.49. Niech $f \in \text{Hom}(U, V)$. Wykaż, że:

- (1) f jest monomorfizmem $\iff f^*$ jest epimorfizmem.
- (2) f jest epimorfizmem $\iff f^*$ jest monomorfizmem.
- (3) f jest izomorfizmem $\iff f^*$ jest izomorfizmem.

Ponadto gdy f jest izomorfizmem, to $(f^*)^{-1} = (f^{-1})^*$.

Zadanie 7.50. Załóżmy, że

$$0 \longrightarrow U \xrightarrow{f} V \xrightarrow{g} W \longrightarrow 0$$

jest krótkim ciągiem dokładnym przestrzeni wektorowych nad ciałem K . Udowodnij, że ciąg indukowany

$$0 \longrightarrow W^* \xrightarrow{g^*} V^* \xrightarrow{f^*} U^* \longrightarrow 0$$

jest dokładny.

Zadanie 7.51. Załóżmy, że $f \in \text{End}(V)$ jest rzutem. Dowiedz, że $f^* \in \text{End}(V^*)$ także jest rzutem. Opisz jądro i obraz rzutu f^* .

Zadanie 7.52. Rozważmy odwzorowanie liniowe $f: \mathbb{Q}^3 \rightarrow \mathbb{Q}^2$ dane wzorem

$$f(x, y, z) = (x - 2y + 3z, x - y + z).$$

Niech $\{e_1^*, e_2^*\}$ będzie bazą dualną do bazy kanonicznej $\{e_1, e_2\}$ przestrzeni \mathbb{Q}^2 . Wyznacz współrzędne wektora $f^*(2e_1^* - 3e_2^*)$ w bazie dualnej do bazy kanonicznej przestrzeni \mathbb{Q}^3 .

Zadanie 7.53. Rozważmy odwzorowanie $f: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^4$ dane wzorem

$$f(x, y, z) = (x + 2y, x + 3y + 2z, y + 2z, x + y - 2z).$$

Wyznacz bazy i wymiary przestrzeni $\text{Ker } f^*$ oraz $\text{Im } f^*$.

Zadanie 7.54. Macierz odwzorowania liniowego $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ w bazach standardowych ma postać

$$M_{\text{st st}}(f) = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & 2 \\ 2 & 6 & 1 & 4 \\ 2 & 5 & 3 & 3 \end{bmatrix}.$$

Wyznacz bazy i wymiary przestrzeni $\text{Ker } f^*$ oraz $\text{Im } f^*$.

Zadanie 7.55. Załóżmy, że $V = \mathbb{R}^2$. Rozważmy endomorfizm $f \in \text{End}(V)$ dany wzorem $f(x, y) = (2x + 3y, x + y)$ i funkcjonały $\phi_1, \phi_2 \in V^*$ zdefiniowane jako

$$\phi_1(x, y) = x + 2y \quad \text{oraz} \quad \phi_2(x, y) = x + 3y.$$

Wyznacz macierz $M_B(f^*)$ endomorfizmu $f^* \in \text{End}(V^*)$ w bazie $B = \{\phi_1, \phi_2\}$ przestrzeni V^* i oblicz wymiary przestrzeni $\text{Ker } f^*$ oraz $\text{Im } f^*$.

Zadanie 7.56. Niech $V = \{f \in \mathbb{R}[x] : \deg f \leq 3\}$ i rozważmy endomorfizm $\Phi \in \text{End}(V)$ zadany formułą

$$\Phi(f)(x) = 2xf'(x) - 3f(x).$$

Wyznacz macierz $M_{B^*}(\Phi^*)$ endomorfizmu $\Phi^* \in \text{End}(V^*)$ w bazie sprzężonej B^* względem bazy

$$B = \{1, x + 1, x^2 + x + 1, x^3 + x^2 + x + 1\}$$

przestrzeni V .

Zadanie 7.57. Niech $V = \mathbb{R}^3$ oraz

$$A = \{(2, 1, 4), (1, 1, 1), (3, 2, 1)\}, \quad B = \{(1, 2, 3), (1, 1, 2), (3, 5, 3)\}.$$

Rozważmy endomorfizm $f \in \text{End}(V)$ wyznaczony warunkiem

$$M_{AB}(f) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}.$$

Dla jakich $t \in \mathbb{R}$ funkcjonal $\phi \in V^*$, dany wzorem $\phi(x, y, z) = 2x - y + tz$, leży w jądrze odwzorowania f^* ?

Zadanie 7.58. Niech $n \geq 1$ i załóżmy, że $U = U_1 \oplus \dots \oplus U_n$ oraz $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_n$ są przestrzeniami liniowymi nad ciałem K . Pokaż, że gdy $f_i \in \text{Hom}(U_i, V_i)$ dla $1 \leq i \leq n$, to odwzorowanie $f \in \text{Hom}(U, V)$, zdefiniowane wzorem

$$f(u_1, \dots, u_n) = (f_1(u_1), \dots, f_n(u_n)),$$

spełnia $f^* = \Phi(f_1^*, \dots, f_n^*)$, gdzie

$$\Phi: \text{Hom}(V_1^*, U_1^*) \times \dots \times \text{Hom}(V_n^*, U_n^*) \rightarrow \text{Hom}(V^*, U^*)$$

jest naturalnym zanurzeniem.

Uwaga. Homomorfizm f zdefiniowany w zadaniu nazywamy *sumą prostą* homomorfizmów f_1, \dots, f_n i piszemy $f = f_1 \oplus \dots \oplus f_n$.

Zadanie 7.59. Jeśli V jest przestrzenią liniową nad ciałem K , to *przestrzeń bidualną* definiujemy jako $V^{**} = (V^*)^*$. Określmy ponadto odwzorowanie $\sigma_V: V \rightarrow V^{**}$ wzorem $\sigma_V(v)(\phi) = \phi(v)$ dla $v \in V$ oraz $\phi \in V^*$.

- (1) Udowodnij, że σ_V jest monomorfizmem.
- (2) Dowiedz, że σ_V jest izomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy $\dim V < \infty$.
- (3) Jeśli $f \in \text{Hom}(U, V)$, to *odwzorowanie bidualne* $f^{**} \in \text{Hom}(U^{**}, V^{**})$ definiujemy wzorem $f^{**} = (f^*)^*$. Uzasadnij, że diagram

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\sigma_U} & U^{**} \\ \downarrow f & & \downarrow f^{**} \\ V & \xrightarrow{\sigma_V} & V^{**} \end{array}$$

jest przemienny (tzn. $\sigma_V \circ f = f^{**} \circ \sigma_U$).

Uwaga. W języku teorii kategorii ostatni fakt oznacza, że klasa odwzorowań σ_V tworzy morfizm (naturalną transformację) pomiędzy funktorem identycznościowym, a funktorem przestrzeni bidualnej.

Zadanie 7.60. Załóżmy, że U, V są skończenie wymiarowymi przestrzeniami liniowymi nad ciałem K oraz $f \in \text{Hom}(U, V)$. Oznaczmy przez $\sigma_U: U \rightarrow U^{**}$ oraz $\sigma_V: V \rightarrow V^{**}$ kanoniczne izomorfizmy. Wykaż, że $\text{Ker } f^{**} = \sigma_U(\text{Ker } f)$ oraz $\text{Im } f^{**} = \sigma_V(\text{Im } f)$. Czy pomijając założenie dotyczące wymiarów przestrzeni U, V teza pozostanie prawdziwa?

8 Wyznacznik i macierz odwrotna

Zadanie 8.1. Wyjaśnij dlaczego wyznaczniki

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & 0 & 0 & 0 \\ a_{41} & a_{42} & 0 & 0 & 0 \\ a_{51} & a_{52} & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

oraz

$$\begin{vmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} & a_{11}b_{13} + a_{12}b_{23} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} & a_{21}b_{13} + a_{22}b_{23} \\ a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} & a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} & a_{31}b_{13} + a_{32}b_{23} \end{vmatrix}$$

są równe zero nie obliczając ich.

Zadanie 8.2. Oblicz wyznaczniki:

$$\begin{vmatrix} 36 & 60 & 72 & 37 \\ 43 & 71 & 78 & 34 \\ 44 & 69 & 73 & 32 \\ 30 & 50 & 65 & 38 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 14 & 12 & 6 & 14 \\ 10 & 11 & 10 & 9 \\ 8 & 9 & 10 & 8 \\ 12 & 12 & 8 & 11 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 35 & 59 & 71 & 52 \\ 42 & 70 & 77 & 54 \\ 43 & 68 & 72 & 52 \\ 29 & 49 & 65 & 50 \end{vmatrix}.$$

Zadanie 8.3. Oblicz wyznaczniki

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & a_1 & b_1 \\ 0 & 0 & a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 & 0 & 0 \\ a_4 & b_4 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad \text{oraz} \quad \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & a_3 & b_3 & 0 \\ a_4 & 0 & 0 & b_4 \end{vmatrix},$$

gdzie $a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$ oraz $b_1, b_2, b_3, b_4 \in \mathbb{R}$.

Zadanie 8.4. Wiedząc, że liczby 20604, 53227, 25755, 20927 i 289 są podzielne przez 17 uzasadnij, że wyznacznik

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 6 & 0 & 4 \\ 5 & 3 & 2 & 2 & 7 \\ 2 & 5 & 7 & 5 & 5 \\ 2 & 0 & 9 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

jest także podzielny przez 17 nie obliczając go.

Zadanie 8.5. Przypuśćmy, że liczby $\alpha, \beta, \gamma > 0$ są miarami kątów w trójkącie T (tzn. spełniają $\alpha + \beta + \gamma = \pi$). Oblicz wyznacznik

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \sin \alpha & \sin \beta & \sin \gamma \\ \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \end{vmatrix}$$

i sprawdź, że jest on równy zero wtedy i tylko wtedy, gdy trójkąt T jest równoramienny.

Zadanie 8.6. Niech $a, b, c \in \mathbb{C}$. Oblicz wyznacznik

$$D = \begin{vmatrix} z_1 & z_2 & z_3 \\ z_2 & z_3 & z_1 \\ z_3 & z_1 & z_2 \end{vmatrix},$$

gdzie $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ są pierwiastkami równania $z^3 + az^2 + bz + c = 0$.

Zadanie 8.7. Niech

$$A = \begin{bmatrix} (a+b)^2 & c^2 & c^2 \\ a^2 & (b+c)^2 & a^2 \\ b^2 & b^2 & (c+a)^2 \end{bmatrix} \in M_3(\mathbb{R}).$$

Opisz zbiór $S = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : \det A = 0\}$.

Zadanie 8.8. Rozwiąż równanie

$$\det \begin{bmatrix} 1 & x & 1 & 2 \\ 2 & x & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & x \\ 0 & 1 & x & 2 \end{bmatrix} = 0$$

o niewiadomej $x \in \mathbb{R}$.

Zadanie 8.9. Niech $n \geq 1$. Załóżmy, że liczby $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ są parami różne. Rozwiąż równanie

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & z - a_1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & z - a_n \end{bmatrix} = 0$$

o niewiadomej $z \in \mathbb{C}$. Co w przypadku, gdy liczby a_1, \dots, a_n nie są parami różne?

Zadanie 8.10. Niech

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 4 \\ 2 & 6 & 2 & 9 \\ 1 & 4 & 5 & 5 \\ 2 & 6 & 3 & 1 \end{bmatrix} \in M_4(\mathbb{F}_{17}).$$

Czy istnieje taka macierz $B \in M_4(\mathbb{F}_{17})$, że $\det(AB) = 8$? Jeśli tak, to podaj przykład takiej macierzy.

Zadanie 8.11. Niech

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \in M_3(\mathbb{R}), \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \in M_3(\mathbb{R}).$$

Czy istnieją takie liczby $n, m \in \mathbb{Z}$, że $\det(A^n B^m) = 30$?

Zadanie 8.12. Niech $n \geq 1$. Załóżmy, że macierz $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$ spełnia $a_{ij} = 1$ dla $i \neq j$ oraz $a_{11}, \dots, a_{nn} \geq 2$. Udowodnij, że $\det A \geq n + 1$.

Zadanie 8.13. Niech $n \geq 1$. Załóżmy, że macierz $A \in M_n(\mathbb{C})$ spełnia $A^t A = I$ oraz $\det A < 0$. Oblicz $\det(I + A)$.

Zadanie 8.14. Załóżmy, że K jest ciałem oraz $n, m \geq 1$. Pokaż, że gdy $A \in M_{n,m}(K)$ oraz $B \in M_{m,n}(K)$, to $\det(I_n + AB) = \det(I_m + BA)$.

Zadanie 8.15. Niech $n \geq 1$. Załóżmy, że $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{Z})$, gdzie $a_{ij} \in \{-1, 1\}$ dla $1 \leq i, j \leq n$. Uzasadnij, że $\det A$ jest liczbą całkowitą podzieloną przez 2^{n-1} .

Zadanie 8.16. Załóżmy, że K jest ciałem oraz $n \geq 1$. Niech $A = [a_{ij}] \in M_n(K)$. Niech ponadto $x_1, \dots, x_n \in K$ oraz $y_1, \dots, y_n \in K$. Dowiedz, że

$$\det \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ y_1 & \cdots & y_n & 0 \end{bmatrix} = \sum_{i,j=1}^n (-1)^{i+j+1} (\det A_{ij}) x_i y_j,$$

gdzie A_{ij} to $(n-1) \times (n-1)$ podmacierz A powstała przez wykreślenie i -tego wiersza oraz j -tej kolumny w macierzy A .

Zadanie 8.17. Przypuśćmy, że K jest ciałem oraz $n \geq 1$. Niech $A = [a_{ij}] \in M_n(K)$. Zdefiniujmy $s_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}$ dla $1 \leq i \leq n$. Uzasadnij, że

$$\det \begin{bmatrix} s_1 - a_{11} & \cdots & s_1 - a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ s_n - a_{n1} & \cdots & s_n - a_{nn} \end{bmatrix} = (-1)^{n-1} (n-1) \det A.$$

Zadanie 8.18. Załóżmy, że K jest ciałem, $0 \neq A \in M_2(K)$ oraz $B_1, B_2, B_3, B_4 \in M_2(K)$. Wykaż, że gdy $\det(A + B_i) = \det A + \det B_i$ dla $1 \leq i \leq 4$, to macierze B_1, B_2, B_3, B_4 są liniowo zależne nad K .

Zadanie 8.19. Załóżmy, że K jest ciałem oraz $n \geq 1$. Dla macierzy $A, B \in M_n(K)$ rozważmy następujące warunki:

- (1) $\text{tr}(AX) = \text{tr}(BX)$ dla dowolnej macierzy $X \in M_n(K)$.
- (2) $\det(A + X) = \det(B + X)$ dla dowolnej macierzy $X \in M_n(K)$.

Dowiedz, że gdy macierze A, B spełniają warunek (1) lub (2), to $A = B$.

Zadanie 8.20. Niech $n \geq 1$ oraz

$$A_n = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{bmatrix} \in M_n(\mathbb{R}).$$

Pokaż, że $\det A_n = n + 1$.

Zadanie 8.21. Załóżmy, że $n \geq 1$ oraz

$$A_n = \begin{bmatrix} a+b & ab & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a+b & ab & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a+b & ab \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a+b \end{bmatrix} \in M_n(\mathbb{R}).$$

Dowiedź, że gdy $a \neq b$, to $\det A_n = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a-b}$. Co w przypadku gdy $a = b$?

Zadanie 8.22. Załóżmy, że K jest ciałem oraz $n \geq 1$. Niech

$$A = \begin{bmatrix} c_1 & a & a & \cdots & a & a \\ b & c_2 & a & \cdots & a & a \\ b & b & c_3 & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & c_{n-1} & a \\ b & b & b & \cdots & b & c_n \end{bmatrix} \in M_n(K).$$

Udowodnij, że gdy $a \neq b$, to $\det A = \frac{af(b) - bf(a)}{a-b}$, gdzie $f(x) = \prod_{i=1}^n (c_i - x) \in K[x]$. Co w przypadku gdy $a = b$?

Zadanie 8.23. Załóżmy, że K jest ciałem oraz $n \geq 1$. Niech

$$A_n = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ b & a & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ b^2 & ab & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b^{n-2} & ab^{n-3} & ab^{n-4} & \cdots & a & -1 \\ b^{n-1} & ab^{n-2} & ab^{n-3} & \cdots & ab & a \end{bmatrix} \in M_n(K).$$

Uzasadnij, że $\det A_n = (a+b)^{n-1}$.

Zadanie 8.24. Zdefiniujmy liczby *Fibonacciego* $(F_n)_{n=0}^\infty$ rekurencyjnie:

$$\begin{cases} F_0 = 0, \\ F_1 = 1, \\ F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad (n \geq 2). \end{cases}$$

Niech

$$A_n = \begin{bmatrix} 1 & i & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ i & 1 & i & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & i & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & i \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & i & 1 \end{bmatrix} \in M_n(\mathbb{C}).$$

Sprawdź, że $\det A_n = F_{n+1}$ dla $n \geq 1$.

Zadanie 8.25. Załóżmy, że $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ jest ciągiem liczb rzeczywistych zdefiniowanych za pomocą rozwinięcia w szereg

$$\frac{x}{\ln(1+x)} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

Wykaż, że $a_0 = 1$ oraz

$$a_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-2} & \frac{1}{n-3} & \cdots & 1 \\ \frac{1}{n+1} & \frac{1}{n} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-2} & \cdots & \frac{1}{2} \end{vmatrix}$$

dla $n \geq 1$.

Zadanie 8.26. Zdefiniujmy *liczby Eulera* $(E_n)_{n=0}^{\infty}$ za pomocą rozwinięcia w szereg

$$\frac{1}{\cos x} = \sum_{n=0}^{\infty} E_n \frac{x^n}{n!}.$$

Udowodnij, że $E_0 = 1$, $E_{2n-1} = 0$ oraz

$$E_{2n} = (2n)! \begin{vmatrix} \frac{1}{2!} & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{4!} & \frac{1}{2!} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{6!} & \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{(2n-2)!} & \frac{1}{(2n-4)!} & \frac{1}{(2n-6)!} & \frac{1}{(2n-8)!} & \cdots & 1 \\ \frac{1}{(2n)!} & \frac{1}{(2n-2)!} & \frac{1}{(2n-4)!} & \frac{1}{(2n-6)!} & \cdots & \frac{1}{2!} \end{vmatrix}$$

dla $n \geq 1$.

Zadanie 8.27. Zdefiniujmy *liczby Bernoulliego* $(B_n)_{n=0}^{\infty}$ za pomocą rozwinięcia w szereg

$$\frac{x}{e^x - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{x^n}{n!}.$$

Dowiedź, że $B_0 = 1$, $B_1 = -\frac{1}{2}$, $B_{2n+1} = 0$ oraz

$$B_{2n} = (2n)! \begin{vmatrix} \frac{1}{2!} & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{4!} & \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{(2n)!} & \frac{1}{(2n-1)!} & \frac{1}{(2n-2)!} & \frac{1}{(2n-3)!} & \cdots & 1 \\ \frac{1}{(2n+1)!} & \frac{1}{(2n)!} & \frac{1}{(2n-1)!} & \frac{1}{(2n-2)!} & \cdots & \frac{1}{2!} \end{vmatrix}$$

dla $n \geq 1$.

Zadanie 8.28. Niech $n \geq 1$ oraz $\varphi \in \mathbb{R}$. Oblicz wyznaczniki macierzy $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$ oraz $B = [b_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$, gdzie

$$a_{ij} = \sin((i-1)n + j)\varphi \quad \text{oraz} \quad b_{ij} = \cos((i-1)n + j)\varphi$$

dla $1 \leq i, j \leq n$.

Zadanie 8.29. Niech $n \geq 1$. Przypuśćmy, że $x_{ij}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dla $1 \leq i, j \leq n$ są funkcjami różniczkowalnymi. Niech $X(t) = [x_{ij}(t)] \in M_n(\mathbb{R})$ dla $t \in \mathbb{R}$. Pokaż, że funkcja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dana wzorem $f(t) = \det X(t)$, jest różniczkowalna oraz

$$f'(t) = \sum_{j=1}^n \det \begin{bmatrix} x_{11}(t) & \cdots & x'_{1j}(t) & \cdots & x_{1n}(t) \\ x_{21}(t) & \cdots & x'_{2j}(t) & \cdots & x_{2n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1}(t) & \cdots & x'_{nj}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{bmatrix}.$$

Stosując powyższą równość udowodnij, że $\frac{d}{dt} \det(I + tA)|_{t=0} = \text{tr } A$ dla $A \in M_n(\mathbb{R})$.

Zadanie 8.30 (metoda kondensacyjna Chiò). Załóżmy, że K jest ciałem, $n \geq 2$ oraz $A = [a_{ij}] \in M_n(K)$. Wykaż, że gdy $a_{11} \neq 0$, to

$$\det A = \frac{1}{a_{11}^{n-2}} \begin{vmatrix} b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix},$$

gdzie

$$b_{ij} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{1j} \\ a_{i1} & a_{ij} \end{vmatrix} \in K \quad (2 \leq i, j \leq n).$$

Zadanie 8.31. Załóżmy, że $n \geq 1$ oraz $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. Rozważmy macierz $M \in M_{2n}(\mathbb{R})$ daną w postaci blokowej

$$M = \begin{bmatrix} A & -B \\ B & A \end{bmatrix}.$$

Uzasadnij, że $\det M = |\det(A + iB)|^2$. W szczególności $\det M \geq 0$.

Zadanie 8.32. Załóżmy, że $n \geq 1$ oraz $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. Dowiedz, że gdy $AB = BA$, to $\det(A^2 + B^2) \geq 0$ oraz $\det(A^2 + AB + B^2) \geq 0$. Czy teza pozostanie prawdziwa bez założenia $AB = BA$?

Zadanie 8.33. Załóżmy, że $n \geq 1$ oraz $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$. Udowodnij, że gdy macierze A, B, C są parami przemienne, to

$$\det(A^2 + B^2 + C^2 - AB - BC - CA) \geq 0.$$

Zadanie 8.34. Zdefiniujemy *normę* wektora $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ za pomocą wzoru $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$. Niech $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$. Oznaczmy przez $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ wiersze macierzy A , tzn. $v_i = (a_{i1}, \dots, a_{in})$ dla $1 \leq i \leq n$. Dowiedz, że

$$|\det A| \leq \|v_1\| \cdots \|v_n\| = \prod_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Uwaga. Powyższa nierówność jest zwykle nazywana *nierównością Hadamarda*. Gdy np. $|a_{ij}| \leq 1$ dla $1 \leq i, j \leq n$, to $|\det A| \leq n^{\frac{n}{2}}$. Oszacowanie to jest znacznie lepsze od prostego oszacowania $|\det A| \leq n!$ (wynikającego z nierówności trójkąta i wzoru permutacyjnego na wyznacznik). Co więcej oszacowanie $|\det A| \leq n^{\frac{n}{2}}$ jest w wielu sytuacjach optymalne.

Zadanie 8.35. Niech $n \geq 1$. Mówimy, że $H = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{Z})$ jest *macierzą Hadamarda*, gdy $a_{ij} \in \{-1, 1\}$ dla $1 \leq i, j \leq n$ oraz $H^t H = nI$.

- (1) Sprawdź, że gdy $H \in M_n(\mathbb{Z})$ jest macierzą Hadamarda, to $|\det H| = n^{\frac{n}{2}}$.
- (2) Dla $n \in \{1, 2, 4\}$ podaj przykład macierzy Hadamarda $H \in M_n(\mathbb{Z})$.
- (3) Wykaż, że nie istnieje macierz Hadamarda rozmiaru 3×3 . Ogólniej, jeżeli $n > 2$ oraz istnieje macierz Hadamarda rozmiaru $n \times n$, to n jest podzielne przez 4.

Uwaga. Problem odwrócenia implikacji w punkcie (3) powyższego zadania (tzn. czy dla dowolnej liczby $n = 4k$, gdzie $k \geq 1$ istnieje macierz Hadamarda rozmiaru $n \times n$?) pozostaje do dziś nierozstrzygnięty (tzw. *hipoteza Hadamarda*). Aktualnie najmniejszą liczbą, dla której nie znamy odpowiedzi jest $n = 668$.

Zadanie 8.36. Załóżmy, że K jest ciałem, $n \geq 2$ oraz $x_1, \dots, x_n \in K$. Niech

$$M(x_1, \dots, x_n) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{bmatrix} \in M_n(K).$$

- (1) Wykaż, że $V(x_1, \dots, x_n) = \det M(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$.
- (2) Wyznacz macierz odwrotną $M(x_1, \dots, x_n)^{-1}$ zakładając, że $x_i \neq x_j$ dla $i \neq j$.

Uwaga. Macierz $M(x_1, \dots, x_n)$ nosi nazwę *macierzy Vandermonde'a*, zaś wyznacznik $V(x_1, \dots, x_n)$ nazywany jest *wyznacznikiem Vandermonde'a* lub *vandermondianem*.

Zadanie 8.37. Niech $n \geq 1$. Załóżmy, że liczby $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$ spełniają $z_1^k + \dots + z_n^k = 0$ dla dowolnego $1 \leq k \leq n$. Udowodnij, że $z_1 = \dots = z_n = 0$.

Zadanie 8.38. Niech $n \geq 2$ oraz $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Dowiedz, że liczba $\prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{a_j - a_i}{j - i}$ jest całkowita.

Zadanie 8.39. Niech $n \geq 1$. Załóżmy, że $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$ oraz $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{N}$. Niech

$$A = \begin{bmatrix} a_1^{k_1} & a_2^{k_1} & \cdots & a_n^{k_1} \\ a_1^{k_2} & a_2^{k_2} & \cdots & a_n^{k_2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{k_n} & a_2^{k_n} & \cdots & a_n^{k_n} \end{bmatrix} \in M_n(\mathbb{Z}).$$

Wykaż, że liczba $\det A \in \mathbb{Z}$ jest podzielna przez $n!$.

Zadanie 8.40. Niech $n \geq 1$ oraz $a > 0$. Oblicz wyznacznik macierzy $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$, gdzie $a_{ij} = a^{|i-j|}$ dla $1 \leq i, j \leq n$.

Zadanie 8.41. Niech $n \geq 1$. Oblicz wyznacznik

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2^3 & 3^3 & \cdots & n^3 \\ 1 & 2^5 & 3^5 & \cdots & n^5 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2^{2n-1} & 3^{2n-1} & \cdots & n^{2n-1} \end{vmatrix}.$$

Zadanie 8.42. Niech $1 \leq n \leq m$. Pokaż, że

$$\begin{vmatrix} \binom{m}{1} & \binom{2m}{1} & \cdots & \binom{nm}{1} \\ \binom{m}{2} & \binom{2m}{2} & \cdots & \binom{nm}{2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \binom{m}{n} & \binom{2m}{n} & \cdots & \binom{nm}{n} \end{vmatrix} = m^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

Zadanie 8.43. Niech K będzie ciałem oraz $n \geq 2$. Załóżmy, że $x_1, \dots, x_n \in K$ są parami różne, zaś $y_1, \dots, y_n \in K$ są dowolne. Udowodnij, że istnieje dokładnie jeden wielomian $P \in K[x]$ spełniający $\deg P < n$ oraz $P(x_i) = y_i$ dla $1 \leq i \leq n$. Uzasadnij, że wielomian P jest postaci

$$P(x) = \sum_{i=1}^n y_i \left(\prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right).$$

Uwaga. Wielomian P nosi nazwę *wielomianu interpolacyjnego Lagrange'a*.

Zadanie 8.44. Niech $n \geq 1$. Pokaż, że nie istnieją takie funkcje $f_1, \dots, f_n \in \text{Map}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ oraz $g_1, \dots, g_n \in \text{Map}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, że $e^{xy} = \sum_{i=1}^n f_i(x)g_i(y)$ dla dowolnych $x, y \in \mathbb{R}$.

Zadanie 8.45. Załóżmy, że K jest ciałem, $n \geq 2$ oraz $x_1, \dots, x_n \in K$. Udowodnij, że dla dowolnych wielomianów $f_1, \dots, f_n \in K[x]$ postaci $f_i(x) = \sum_{j=1}^n a_{ij}x^{j-1}$ dla $1 \leq i \leq n$ zachodzi

$$\det \begin{bmatrix} f_1(x_1) & f_1(x_2) & \cdots & f_1(x_n) \\ f_2(x_1) & f_2(x_2) & \cdots & f_2(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n(x_1) & f_n(x_2) & \cdots & f_n(x_n) \end{bmatrix} = (\det A)V(x_1, \dots, x_n),$$

gdzie $A = [a_{ij}] \in M_n(K)$, zaś $V(x_1, \dots, x_n)$ jest wyznacznikiem Vandermonde'a.

Zadanie 8.46. Załóżmy, że K jest ciałem oraz $n \geq 2$. Niech $x_1, \dots, x_n \in K$ oraz

$$p_k = p_k(x_1, \dots, x_n) = x_1^k + \cdots + x_n^k \quad (k \geq 0)$$

(gdzie $k = 0$, to równość tę rozumiemy jako $p_0 = n$). Wykaż, że

$$\det \begin{bmatrix} p_0 & p_1 & \cdots & p_{n-1} \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n-1} & p_n & \cdots & p_{2n-2} \end{bmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2.$$

Zadanie 8.47. Niech $n \geq 1$ oraz $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$. Dowiedz, że

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_1 \end{vmatrix} = \prod_{j=1}^n f(\omega^j),$$

gdzie $f(x) = \sum_{j=1}^n a_j x^{j-1} \in \mathbb{C}[x]$ oraz $\omega = e^{\frac{2\pi i}{n}} \in \mathbb{C}$.

Zadanie 8.48 (wielomiany Schura). Niech $n \geq 1$. Każdy ciąg $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{N}_0^n$, gdzie $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ nazywamy *partycją* liczby $m = \sum_{i=1}^n \lambda_i \in \mathbb{N}_0$ (piszemy wtedy $\lambda \vdash m$). Dla dowolnej partycji $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ definiujemy wielomian

$$w_\lambda(x_1, \dots, x_n) = \det \begin{bmatrix} x_1^{\lambda_1+n-1} & x_2^{\lambda_1+n-1} & \cdots & x_n^{\lambda_1+n-1} \\ x_1^{\lambda_2+n-2} & x_2^{\lambda_2+n-2} & \cdots & x_n^{\lambda_2+n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{\lambda_n} & x_2^{\lambda_n} & \cdots & x_n^{\lambda_n} \end{bmatrix} \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n].$$

(1) Uzasadnij, że funkcja wymierna

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_n) = \frac{w_\lambda(x_1, \dots, x_n)}{w_{(0, \dots, 0)}(x_1, \dots, x_n)}$$

jest w istocie wielomianem oraz udowodnij, że wielomian ten jest *symetryczny*, tzn. $s_\lambda(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = s_\lambda(x_1, \dots, x_n)$ dla dowolnej permutacji $\sigma \in S_n$.

(2) Niech $\varepsilon_i = (\delta_{ij})_{j=1}^n$ dla $1 \leq i \leq n$. Uzasadnij, że gdy $\lambda = \varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_k$ dla pewnego $1 \leq k \leq n$, to

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_n) = e_k(x_1, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} \cdots x_{i_k}.$$

(3) Uzasadnij, że gdy $\lambda = k\varepsilon_1$ dla pewnego $k \in \mathbb{N}$, to

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_n) = h_k(x_1, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_k \leq n} x_{i_1} \cdots x_{i_k}.$$

(4) Połóżmy $e_0(x_1, \dots, x_n) = h_0(x_1, \dots, x_n) = 1$. Pokaż, że

$$\prod_{i=1}^n (1 + x_i) = \sum_{k=0}^n e_k(x_1, \dots, x_n), \quad \prod_{i=1}^n \frac{1}{1 - x_i} = \sum_{k=0}^{\infty} h_k(x_1, \dots, x_n)$$

i wywnioskuj stąd, iż

$$\sum_{j=0}^{\min\{n, k\}} (-1)^j e_j(x_1, \dots, x_n) h_{k-j}(x_1, \dots, x_n) = 0 \quad (k \geq 1).$$

- (5) Przyjmując konwencję, że $h_k = h_k(x_1, \dots, x_n)$ dla $k \geq 0$ oraz $h_k = 0$ dla $k < 0$ dowiedź, że gdy $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ jest partycją, to

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_n) = \det \begin{bmatrix} h_{\lambda_1} & h_{\lambda_1+1} & \cdots & h_{\lambda_1+n-1} \\ h_{\lambda_2-1} & h_{\lambda_2} & \cdots & h_{\lambda_2+n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{\lambda_n-n+1} & h_{\lambda_n-n+2} & \cdots & h_{\lambda_n} \end{bmatrix}.$$

Uwaga. Wielomian s_λ nazywamy *wielomianem Schura* partycji λ . Natomiast wielomiany e_k oraz h_k nazywamy, odpowiednio, *k-tym elementarnym wielomianem symetrycznym* oraz *k-tym zupełnym jednorodnym wielomianem symetrycznym*. Równość w punkcie (5) nazywana jest *tożsamością Jacobiego–Trudiego*.

Zadanie 8.49. Niech $n \geq 3$ oraz $f, g \in \mathbb{R}[x]$. Załóżmy, że punkty $P_k = (f(k), g(k)) \in \mathbb{R}^2$ dla $1 \leq k \leq n$ są wierzchołkami n -kąta foremnego. Wykaż, że $\max\{\deg f, \deg g\} \geq n - 1$.

Zadanie 8.50. Niech $n \geq 1$ oraz $f(x) = 1 + a_1x^{k_1} + \cdots + a_nx^{k_n} \in \mathbb{R}[x]$ dla pewnych $0 < k_1 < \cdots < k_n$. Przypuśćmy, że $f(x) = (1-x)^n g(x)$ dla pewnego $g \in \mathbb{R}[x]$. Pokaż, że

$$g(1) = \frac{1}{n!} \prod_{i=1}^n k_i.$$

Zadanie 8.51. Niech $n \geq 1$. Przypuśćmy, że $f_1, \dots, f_n \in C^\infty(\mathbb{R})$ i zdefiniujemy funkcję $W(f_1, \dots, f_n): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ wzorem

$$W(f_1, \dots, f_n)(x) = \det \begin{bmatrix} f_1(x) & f_2(x) & \cdots & f_n(x) \\ f_1'(x) & f_2'(x) & \cdots & f_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)}(x) & f_2^{(n-1)}(x) & \cdots & f_n^{(n-1)}(x) \end{bmatrix}.$$

- (1) Uzasadnij, że $W(f_1, \dots, f_n) \in C^\infty(\mathbb{R})$.
- (2) Sprawdź, że gdy funkcje f_1, \dots, f_n są liniowo zależne, to $W(f_1, \dots, f_n) = 0$. Czy implikacja odwrotna jest prawdziwa?
- (3) Niech $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ oraz $f_j(x) = e^{a_j x}$ dla $1 \leq j \leq n$. Oblicz $W(f_1, \dots, f_n)(0)$.

Uwaga. Funkcja $W(f_1, \dots, f_n)$, a także sam wyznacznik $W(f_1, \dots, f_n)(x)$ dla $x \in \mathbb{R}$, nazywana jest *wyznacznikiem Wrońskiego* lub *wrońskianem* funkcji f_1, \dots, f_n .

Zadanie 8.52. Załóżmy, że K jest ciałem, $n \geq 1$ oraz $a_1, \dots, a_n \in K$. Zdefiniujmy $A = [a_{ij}] \in M_n(K)$, gdzie $a_{ij} = \sum_{k|\gcd(i,j)} a_k$ (suma po wszystkich $1 \leq k \leq n$ dzielących $\gcd(i, j)$) dla $1 \leq i, j \leq n$. Dowiedź, że $A = PDP^t$, gdzie $D = \text{diag}(a_1, \dots, a_n) \in M_n(K)$ oraz $P = [p_{ij}] \in M_n(K)$, gdzie

$$p_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{gdy } j \mid i, \\ 0 & \text{gdy } j \nmid i \end{cases}$$

dla $1 \leq i, j \leq n$. Sprawdź, że $\det P = 1$ i wywnioskuj stąd, że $\det A = \prod_{k=1}^n a_k$.

Zadanie 8.53. Niech $n \geq 1$ oraz $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{Z})$, gdzie $a_{ij} = \gcd(i, j)$ dla $1 \leq i, j \leq n$. Udowodnij, że $\det A = \prod_{k=1}^n \varphi(k)$.

Uwaga. Funkcja Eulera $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ zdefiniowana jest wzorem

$$\varphi(k) = |\{j \in \mathbb{N} : j \leq k \text{ oraz } \gcd(j, k) = 1\}|.$$

Można pokazać (potrafisz to zrobić?), że $m = \sum_{k|m} \varphi(k)$ dla dowolnego $m \in \mathbb{N}$.

Zadanie 8.54. Niech $n \geq 2$. Załóżmy, że liczby $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ są parami różne. Niech $D = [d_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$, gdzie $d_{ij} = |a_i - a_j|$ dla $1 \leq i, j \leq n$. Dowiedz, że $\det D \neq 0$.

Zadanie 8.55. Załóżmy, że $n \geq 1$ oraz $A \in M_n(\mathbb{R})$. Zdefiniujmy odwzorowanie liniowe $f: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R})$ wzorem $f(X) = AX$. Oblicz $\det f$.

Zadanie 8.56. Niech K będzie ciałem oraz $n, m \geq 1$. Wielomianem charakterystycznym macierzy $M \in M_n(K)$ nazywamy wielomian

$$\chi_M(x) = \det(M - xI) \in K[x].$$

Udowodnij, że gdy $A \in M_{n,m}(K)$ oraz $B \in M_{m,n}(K)$, to $(-x)^m \chi_{AB}(x) = (-x)^n \chi_{BA}(x)$. W szczególności gdy $n = m$, to $\chi_{AB}(x) = \chi_{BA}(x)$.

Zadanie 8.57. Niech $n \geq 1$ oraz $A, B \in M_n(\mathbb{Z})$. Przypuśćmy, że macierze $A + jB$ dla $0 \leq j \leq 2n$ są odwracalne, zaś ich odwrotności mają całkowite wyrazy. Uzasadnij, że macierz $A + (2n + 1)B$ jest również odwracalna, zaś jej odwrotność ma całkowite wyrazy.

Zadanie 8.58. Niech K będzie ciałem oraz $n \geq 1$. Czy przestrzeń wektorowa $M_n(K)$ posiada bazę złożoną z macierzy odwracalnych? Jeśli tak, to wskaż taką bazę.

Zadanie 8.59. Załóżmy, że $n \geq 1$ oraz $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. Udowodnij, że gdy $A + B = I$ oraz $A^2 + B^2 = 0$, to macierze A, B są odwracalne oraz $A^{-1} + B^{-1} = 2I$.

Zadanie 8.60. Niech K będzie ciałem oraz $n \geq 1$. Przypuśćmy, że macierz $A \in M_n(K)$ spełnia $A^2 = \lambda A$ dla pewnego $\lambda \in K$. Pokaż, że gdy $\lambda \neq -1$, to macierz $I + A$ jest odwracalna oraz $(I + A)^{-1} = I - (\lambda + 1)^{-1}A$. Co w przypadku $\lambda = -1$?

Zadanie 8.61. Niech $n \geq 2$ oraz $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{Q})$, gdzie $a_{ij} = 1 - \delta_{ij}$ dla $1 \leq i, j \leq n$. Oblicz $\det A$ i uzasadnij, że macierz A jest odwracalna. Następnie sprawdź, że

$$A^{-1} = \frac{1}{n-1}A - \frac{n-2}{n-1}I.$$

Zadanie 8.62. Niech $n \geq 1$ oraz $A, B \in GL_n(\mathbb{Q})$. Załóżmy, że $A + B \in GL_n(\mathbb{Q})$ oraz przypuśćmy, iż $A^{-1} + B^{-1} = (A + B)^{-1}$. Wykaż, że $\det A = \det B$. Czy teza pozostanie prawdziwa gdy ciało \mathbb{Q} zastąpimy innym ciałem, np. $\mathbb{F}_3, \mathbb{F}_7, \mathbb{Q}(i\sqrt{3}), \mathbb{R}$ lub \mathbb{C} ?

Zadanie 8.63. Niech K będzie ciałem oraz $n, m \geq 1$. Załóżmy, że pewnych $A \in M_{n,m}(K)$ oraz $B \in M_{m,n}(K)$ macierz $I_n - AB$ jest odwracalna. Dowiedz, że macierz $I_m - BA$ także jest odwracalna oraz zachodzi równość

$$(I_m - BA)^{-1} = I_m + B(I_n - AB)^{-1}A.$$

Zadanie 8.64. Niech $n \geq 1$ oraz

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \in M_n(\mathbb{R}).$$

- (1) Oblicz $\det P$ oraz sprawdź, że $P^{-1} = P^t = P$.
- (2) Opisz macierz PAP^{-1} dla dowolnej macierzy $A \in M_n(\mathbb{R})$.

Zadanie 8.65. Niech K będzie ciałem oraz $n \geq 2$. Przypomnijmy, że *macierzą dołączoną* macierzy $A \in M_n(K)$ nazywamy macierz $\text{adj } A \in M_n(K)$, której (i, j) -ty wyraz równy jest $(-1)^{i+j} \det A_{ji}$, gdzie A_{ji} to $(n-1) \times (n-1)$ podmacierz A powstała przez wykreślenie j -tego wiersza oraz i -tej kolumny w macierzy A . Przypomnijmy również, że

$$A(\text{adj } A) = (\text{adj } A)A = (\det A)I.$$

Niech $A, B \in M_n(K)$. Udowodnij, że:

- (1) $\text{rank } A = n \iff \text{rank}(\text{adj } A) = n$.
- (2) $\text{rank } A = n - 1 \iff \text{rank}(\text{adj } A) = 1$.
- (3) $\text{rank } A < n - 1 \iff \text{rank}(\text{adj } A) = 0$.
- (4) $\det(\text{adj } A) = (\det A)^{n-1}$.
- (5) $\text{adj}(\text{adj } A) = (\det A)^{n-2}A$.
- (6) $\text{adj}(AB) = (\text{adj } B)(\text{adj } A)$.
- (7) $\text{adj}(PAP^{-1}) = P(\text{adj } A)P^{-1}$ dla dowolnej macierzy $P \in \text{GL}_n(K)$.
- (8) jeśli $AB = BA$, to $(\text{adj } A)B = B(\text{adj } A)$.

Uwaga. Zauważmy, że z punktów (1)–(3) wynika, że $\text{rank}(\text{adj } A) \in \{0, 1, n\}$ dla dowolnej macierzy $A \in M_n(K)$. W szczególności gdy $n \geq 3$ oraz $B \in M_n(K)$ jest macierzą rzędu $1 < r < n$, to $B \neq \text{adj } A$ dla każdej macierzy $A \in M_n(K)$.

Zadanie 8.66. Załóżmy, że K jest ciałem oraz $n \geq 1$. Przypuśćmy $A \in M_{n,1}(K)$ oraz $B \in M_{1,n}(K)$. Identyfikując macierz BA z odpowiadającym jej skalarom dowiedz, że

$$\text{adj}(I - AB) = AB + (1 - BA)I.$$

Zadanie 8.67. Załóżmy, że K jest ciałem oraz $n \geq 1$. Rozważmy macierz $M \in M_{n+1}(K)$ daną w postaci blokowej

$$M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix},$$

gdzie $A \in M_n(K)$, $B \in M_{n,1}(K)$, $C \in M_{1,n}(K)$ oraz $D \in M_1(K)$. Identyfikując macierze $C(\text{adj } A)B$ oraz D z odpowiadającymi im skalarom uzasadnij, że

$$\det M = (\det A)D - C(\text{adj } A)B.$$

Zadanie 8.68. Niech $n \geq 1$. Załóżmy, że $A_n = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{Q})$ oraz $B_n = [b_{ij}] \in M_n(\mathbb{Q})$, gdzie

$$a_{ij} = \max\{i, j\} \quad \text{oraz} \quad b_{ij} = \frac{1}{\min\{i, j\}}$$

dla $1 \leq i, j \leq n$.

- (1) Oblicz $\det A_n$ oraz $\det B_n$ dla $n \geq 1$.
- (2) Wyznacz macierze odwrotne A_n^{-1} oraz B_n^{-1} dla $n = 3$ posługując się wzorem $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj } A$ dla $A \in \text{GL}_n(\mathbb{Q})$.

Zadanie 8.69. Niech

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & t \\ t & 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & t & 2 \end{bmatrix} \in M_4(\mathbb{R}).$$

Znajdź wartości parametru $t \in \mathbb{R}$, dla których macierz A jest odwracalna. Następnie dla każdego takiego t wyznacz macierz A^{-1} posługując się wzorem $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj } A$.

Zadanie 8.70. Niech $n \geq 2$. Załóżmy, że liczby $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$ oraz $w_1, \dots, w_n \in \mathbb{C}$ spełniają $z_j + w_k \neq 0$ dla $1 \leq j, k \leq n$. Niech $A = [a_{jk}] \in M_n(\mathbb{C})$, gdzie $a_{jk} = \frac{1}{z_j + w_k}$ dla $1 \leq j, k \leq n$. Dowiedz, że

$$\det A = \frac{\prod_{1 \leq j < k \leq n} (z_j - z_k)(w_j - w_k)}{\prod_{1 \leq j, k \leq n} (z_j + w_k)}.$$

Zadanie 8.71. Niech K będzie ciałem oraz $n \geq 1$. Wykaż, że gdy macierz $A \in M_n(K)$ nie jest odwracalna, to istnieją takie niezerowe macierze $B, C \in M_n(K)$, że $AB = 0$ oraz $CA = 0$.

Zadanie 8.72. Załóżmy, że K jest ciałem oraz $n \geq 1$. Niech $A, B, C, D \in M_n(K)$ oraz $M \in M_{2n}(K)$ będzie macierzą daną w postaci blokowej

$$M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}.$$

- (1) Pokaż, że gdy macierz A jest odwracalna, to $\det M = (\det A) \det(D - CA^{-1}B)$.
- (2) Udowodnij, że gdy macierz A spełnia $AC = CA$, to $\det M = \det(AD - CB)$. Czy równość ta pozostaje prawdziwa bez założenia $AC = CA$?

Zadanie 8.73. Załóżmy, że K jest ciałem, $n \geq 1$ oraz $A, B, C \in M_n(K)$.

- (1) Jakie warunki musi spełniać trójka macierzy A, B, C , aby macierz $M \in M_{2n}(K)$, dana w postaci blokowo-trójkątnej

$$M = \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & C \end{bmatrix},$$

była odwracalna? Dla każdej takiej trójki wyznacz M^{-1} .

(2) Uzasadnij, że macierz $N \in M_{3n}(K)$, dana w postaci blokowo-trójkątnej

$$N = \begin{bmatrix} I & A & B \\ 0 & I & C \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix},$$

jest odwracalna i wyznacz jej odwrotność N^{-1} .

Zadanie 8.74. Załóżmy, że $n \geq 1$ oraz $A, B, C, D \in M_n(\mathbb{C})$. Niech $M \in M_{2n}(\mathbb{C})$ będzie macierzą daną w postaci blokowej

$$M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}.$$

Udowodnij, że:

(1) gdy $\text{rank } M = n$ oraz $A \in GL_n(\mathbb{C})$, to $D = CA^{-1}B$.

(2) gdy $\text{rank } M = n$, to macierz

$$N = \begin{bmatrix} \det A & \det B \\ \det C & \det D \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{C})$$

jest osobliwa.

Zadanie 8.75. Rozważmy permutacje

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 5 & 7 & 4 & 6 & 2 & 9 & 8 & 1 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 4 & 5 & 8 & 3 & 7 & 9 & 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

(1) Oblicz znaki permutacji σ oraz τ .

(2) Wyznacz permutacje $\sigma\tau$, $\tau\sigma$, σ^{-1} oraz τ^{-1} .

(3) Przedstaw permutacje σ oraz τ jako iloczyny cykli rozłącznych.

(4) Przedstaw permutacje σ oraz τ jako iloczyny transpozycji.

Zadanie 8.76. Niech $n \geq 1$ oraz $\sigma \in S_n$. Wykaż, że $\text{sgn } \sigma = (-1)^{|S|}$, gdzie

$$S = \{(i, j) \in \mathbb{N}^2 : 1 \leq i < j \leq n \text{ oraz } \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

Uwaga. Każdą parę $(i, j) \in S$ nazywamy *inwersją* permutacji σ .

Zadanie 8.77. Niech $n, m \geq 1$ oraz

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & n & n+1 & \cdots & n+m \\ m+1 & \cdots & m+n & 1 & \cdots & m \end{pmatrix} \in S_{n+m}.$$

Oblicz znak permutacji σ .

Zadanie 8.78. Niech K będzie ciałem oraz $n \geq 1$. Pokaż, że dla dowolnej macierzy $A = [a_{ij}] \in M_n(K)$ oraz dowolnej funkcji $\pi: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ zachodzi

$$\sum_{\sigma \in S_n} (\text{sgn } \sigma) a_{\pi(1)\sigma(1)} \cdots a_{\pi(n)\sigma(n)} = \begin{cases} (\text{sgn } \pi)(\det A) & \text{gdy } \pi \in S_n, \\ 0 & \text{gdy } \pi \notin S_n. \end{cases}$$

Zadanie 8.79. Korzystając ze wzoru permutacyjnego oblicz wyznacznik macierzy

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & -3 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 2 & -3 \end{bmatrix} \in M_5(\mathbb{F}_{13}).$$

Zadanie 8.80. Niech $n \geq 3$. Korzystając ze wzoru permutacyjnego oblicz wyznacznik macierzy

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \in M_n(\mathbb{R}).$$

Zadanie 8.81. Załóżmy, że K jest ciałem oraz $n \geq 1$. Niech $A = [a_{ij}] \in M_n(K)$ oraz

$$S = \{(i, j) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, n\} : a_{ij} = 0\}.$$

Uzasadnij, że gdy $|S| > n(n-1)$, to $\det A = 0$.

Zadanie 8.82. Niech $n \geq 1$ oraz $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$. Oblicz sumę

$$\sum_{1 \leq j_1, \dots, j_n \leq n} \det \begin{bmatrix} a_{1j_1} & \cdots & a_{1j_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{nj_1} & \cdots & a_{nj_n} \end{bmatrix}.$$

Zadanie 8.83. Dla jakich $n \geq 1$ istnieje taka macierz $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$, że każdy składnik $(\operatorname{sgn} \sigma) a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)}$ sumy

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} (\operatorname{sgn} \sigma) a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)}$$

jest dodatni?

Zadanie 8.84. Załóżmy, że $n \geq 1$ jest liczbą nieparzystą.

- (1) Dowiedz, że gdy permutacja $\sigma \in S_n$ spełnia $\sigma^2 = \operatorname{id}$, to σ ma *punkt stały* (tzn. istnieje takie $k \in \{1, \dots, n\}$, że $\sigma(k) = k$).
- (2) Wywnioskuj z punktu (1), że gdy dla macierzy *symetrycznej* $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{Z})$ (tzn. spełniającej $A^t = A$) zachodzi $a_{11} = \cdots = a_{nn} = 0$, to $\det A \in \mathbb{Z}$ jest liczbą parzystą.

Zadanie 8.85. Załóżmy, że $n \geq 1$ oraz $\sigma_0, \dots, \sigma_n \in S_n$. Uzasadnij, że macierz

$$\begin{bmatrix} 1 & \sigma_0(1) & \cdots & \sigma_0(n) \\ 1 & \sigma_1(1) & \cdots & \sigma_1(n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \sigma_n(1) & \cdots & \sigma_n(n) \end{bmatrix} \in M_{n+1}(\mathbb{Q})$$

jest osobliwa.

Zadanie 8.86. Dla jakich $a \in \mathbb{F}_7$ układ równań

$$\begin{cases} x + ay + z = 1 \\ 2x + y + z = a \\ x + y + az = a^2 \end{cases}$$

posiada dokładnie jedno rozwiązanie? Dla każdego takiego a wyznacz jedyne rozwiązanie posługując się wzorami Cramera.

Zadanie 8.87. Rozważmy układ równań

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 4 \\ 3x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 4 \\ 4x_1 + 4x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 3 \\ 5x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 5x_4 = 3. \end{cases}$$

Stosując wzory Cramera wyznacz liczby $x_2, x_3 \in \mathbb{R}$ spełniające ten układ.

Zadanie 8.88 (formuła Cauchy'ego–Bineta). Załóżmy, że K jest ciałem oraz $1 \leq n \leq m$. Niech $A = [a_{ij}] \in M_{n,m}(K)$ oraz $B = [b_{jk}] \in M_{m,n}(K)$. Niech ponadto

$$\Lambda^n(m) = \{(j_1, \dots, j_n) \in \mathbb{N}^n : 1 \leq j_1 < \dots < j_n \leq m\}$$

(ile elementów ma zbiór $\Lambda^n(m)$?) oraz

$$A_J = \begin{bmatrix} a_{1j_1} & a_{1j_2} & \cdots & a_{1j_n} \\ a_{2j_1} & a_{2j_2} & \cdots & a_{2j_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{nj_1} & a_{nj_2} & \cdots & a_{nj_n} \end{bmatrix}, \quad B_J = \begin{bmatrix} b_{j_11} & b_{j_12} & \cdots & b_{j_1n} \\ b_{j_21} & b_{j_22} & \cdots & b_{j_2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{j_n1} & b_{j_n2} & \cdots & b_{j_nn} \end{bmatrix}$$

dla $J = (j_1, \dots, j_n) \in \Lambda^n(m)$ (oczywiście $A_J, B_J \in M_n(K)$). Dowiedz, że

$$\det(AB) = \sum_{J \in \Lambda^n(m)} (\det A_J)(\det B_J).$$

Dlaczego w założeniach ograniczyliśmy się do przypadku $n \leq m$?

Zadanie 8.89. Załóżmy, że K jest ciałem, $n \geq 1$ oraz $A = [a_{ij}] \in M_n(K)$. Niech ponadto $1 \leq p, q \leq n$. Dla $I = (i_1, \dots, i_p) \in \Lambda^p(n)$ oraz $J = (j_1, \dots, j_q) \in \Lambda^q(n)$ zdefiniujmy

$$A_{IJ} = \begin{bmatrix} a_{i_1 j_1} & a_{i_1 j_2} & \cdots & a_{i_1 j_q} \\ a_{i_2 j_1} & a_{i_2 j_2} & \cdots & a_{i_2 j_q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i_p j_1} & a_{i_p j_2} & \cdots & a_{i_p j_q} \end{bmatrix} \in M_{p,q}(K).$$

Pokaż, że gdy $A_{IJ} = 0$ dla pewnych $I \in \Lambda^p(n)$ oraz $J \in \Lambda^q(n)$, gdzie $p, q \geq 1$ spełniają $p + q > n$, to $\det A = 0$.

Zadanie 8.90. Niech $n, m \geq 1$ oraz $A \in M_{n,m}(\mathbb{C})$. Wykaż, że $\det(A^h A) \geq 0$.

Zadanie 8.91. Niech $n \geq 1$ oraz $a_j, b_j, c_j, d_j \in \mathbb{C}$ dla $1 \leq j \leq n$. Udowodnij, że zachodzi następująca *tożsamość Cauchy'ego–Bineta*

$$\left(\sum_{j=1}^n a_j \bar{c}_j \right) \left(\sum_{j=1}^n b_j \bar{d}_j \right) - \left(\sum_{j=1}^n a_j \bar{d}_j \right) \left(\sum_{j=1}^n b_j \bar{c}_j \right) = \sum_{1 \leq j < k \leq n} (a_j b_k - a_k b_j) \overline{(c_j d_k - c_k d_j)}.$$

W szczególności gdy $a_j = c_j$ oraz $b_j = d_j$ dla $1 \leq j \leq n$, to otrzymujemy *tożsamość Lagrange'a*

$$\left(\sum_{j=1}^n |a_j|^2 \right) \left(\sum_{j=1}^n |b_j|^2 \right) - \left| \sum_{j=1}^n a_j \bar{b}_j \right|^2 = \sum_{1 \leq j < k \leq n} |a_j b_k - a_k b_j|^2,$$

z której wynika *nierówność Cauchy'ego–Buniakowskiego–Schwarza*

$$\left| \sum_{j=1}^n a_j \bar{b}_j \right|^2 \leq \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^2 \right) \left(\sum_{j=1}^n |b_j|^2 \right).$$

Uwaga. Tożsamość Cauchy'ego–Bineta można również interpretować w języku iloczynów skalarnych. Mianowicie rozważmy $V = \mathbb{C}^n$ wraz z bazą standardową $\{e_1, \dots, e_n\}$. Iloczyn skalarny wektorów $u = \sum_{j=1}^n u_j e_j \in V$ oraz $v = \sum_{j=1}^n v_j e_j \in V$ definiujemy jako

$$\langle u, v \rangle = \sum_{j=1}^n u_j \bar{v}_j.$$

Podobnie definiujemy iloczyn skalarny 2-wektorów $\omega = \sum_{1 \leq j < k \leq n} \omega_{jk} e_j \wedge e_k \in \Lambda^2 V$ oraz $\eta = \sum_{1 \leq j < k \leq n} \eta_{jk} e_j \wedge e_k \in \Lambda^2 V$ jako

$$\langle \omega, \eta \rangle = \sum_{1 \leq j < k \leq n} \omega_{jk} \bar{\eta}_{jk}.$$

Przy tak przyjętych definicjach tożsamość Cauchy'ego–Bineta, to nic innego jak równość

$$\langle u_1 \wedge u_2, v_1 \wedge v_2 \rangle = \det \begin{bmatrix} \langle u_1, v_1 \rangle & \langle u_1, v_2 \rangle \\ \langle u_2, v_1 \rangle & \langle u_2, v_2 \rangle \end{bmatrix}$$

dla dowolnych $u_1, u_2 \in V$ oraz $v_1, v_2 \in V$.

Zadanie 8.92. Załóżmy, że liczby $a, b, c \in \mathbb{R}$ spełniają $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Udowodnij, że $a + b + ac \leq \sqrt{3}$. Czy potrafisz znaleźć lepsze oszacowanie?

Zadanie 8.93. Niech $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Dowiedz, że:

(1) gdy $a^2 + b^2 + c^2 = 3$, to $a + ab + bc + c \leq 4$.

(2) gdy $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1$, to $(a + b)(c + d) \leq 1$.

Zadanie 8.94. Niech $n \geq 2$ oraz $a_1, \dots, a_n > 0$. Załóżmy, że liczby $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ oraz $y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}$ spełniają $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$ oraz $\sum_{i=1}^n x_i y_i = 0$. Pokaż, że

$$\left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{a_i} \right) \left(\sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j (x_i y_j - x_j y_i)^2 \right) \geq \sum_{i=1}^n a_i y_i^2.$$

Zadanie 8.95 (uogólnione rozwinięcie Laplace'a). Niech K będzie ciałem, $1 \leq n < m$ oraz $A \in M_m(K)$. Gdy $I = (i_1, \dots, i_n) \in \Lambda^n(m)$, to połóżmy $|I| = i_1 + \dots + i_n$ oraz $I' = (i_{n+1}, \dots, i_m) \in \Lambda^{m-n}(m)$, gdzie $\{i_1, \dots, i_n\} \cap \{i_{n+1}, \dots, i_m\} = \emptyset$. Wykaż, że

$$\det A = \sum_{J \in \Lambda^n(m)} (-1)^{|I|+|J|} (\det A_{IJ}) (\det A_{I'J'})$$

dla dowolnego $I \in \Lambda^n(m)$.

Zadanie 8.96 (formuła Schura). Załóżmy, że K jest ciałem oraz $n, m \geq 1$. Przypuśćmy, że macierz $A \in M_{nm}(K)$ jest dana w postaci blokowej

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix},$$

gdzie $A_{ij} \in M_m(K)$ dla $1 \leq i, j \leq n$. Udowodnij, że gdy $A_{ij} A_{kl} = A_{kl} A_{ij}$ dla dowolnych $1 \leq i, j, k, l \leq n$, to

$$\det A = \det \left(\sum_{\sigma \in S_n} (\text{sgn } \sigma) A_{1\sigma(1)} \cdots A_{n\sigma(n)} \right).$$

Zadanie 8.97. Niech $n, m \geq 1$. Załóżmy, że $f_{jk} \in \mathbb{C}[x]$ dla $1 \leq j, k \leq n$ oraz $A \in M_m(\mathbb{C})$. Dowiedz, że gdy $f(x) = \det[f_{jk}(x)] \in \mathbb{C}[x]$ oraz $\chi_A(x) = \prod_{j=1}^m (\lambda_j - x) \in \mathbb{C}[x]$, to

$$\det \begin{bmatrix} f_{11}(A) & \cdots & f_{1n}(A) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n1}(A) & \cdots & f_{nn}(A) \end{bmatrix} = \prod_{j=1}^m f(\lambda_j).$$

Zadanie 8.98. Załóżmy, że K jest ciałem charakterystyki $\neq 2$ oraz $n \geq 1$. Udowodnij, że gdy macierz $A \in M_n(K)$ jest antysymetryczna (tzn. spełnia $A^t = -A$), to $\det A = a^2$ dla pewnego $a \in K$. Ponadto gdy n jest liczbą nieparzystą, to $\det A = 0$.

Zadanie 8.99. Załóżmy, że K jest ciałem charakterystyki zero oraz $n \geq 1$. Pfaffianem macierzy antysymetrycznej $A = [a_{ij}] \in M_{2n}(K)$ nazywamy skalar

$$\text{pf } A = \sum_{\pi \in P_n} (\text{sgn } \pi) a_{\pi(1)\pi(2)} \cdots a_{\pi(2n-1)\pi(2n)},$$

gdzie

$$P_n = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & 2n-1 & 2n \\ i_1 & j_1 & \cdots & i_n & j_n \end{pmatrix} \in S_{2n} : i_1 < \cdots < i_n \text{ oraz } i_k < j_k \text{ dla } 1 \leq k \leq n \right\}.$$

- (1) Ile elementów ma zbiór P_n ? Wyznacz wzór na $\text{pf } A$ dla $n \in \{1, 2, 3\}$.
- (2) Udowodnij, że

$$\text{pf } A = \frac{1}{2^n n!} \sum_{\sigma \in S_{2n}} (\text{sgn } \sigma) a_{\sigma(1)\sigma(2)} \cdots a_{\sigma(2n-1)\sigma(2n)}.$$

- (3) Dowiedz, że $\text{pf}(PAP^t) = (\det P)(\text{pf } A)$ dla dowolnej macierzy $P \in M_{2n}(K)$.
- (4) Wykaż, że $\det A = (\text{pf } A)^2$.
- (5) Załóżmy, że $M \in M_n(K)$. Pokaż, że macierz $A \in M_{2n}(K)$ dana w postaci blokowej

$$A = \begin{bmatrix} 0 & M \\ -M^t & 0 \end{bmatrix}$$

jest antysymetryczna oraz $\text{pf } A = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \det M$.

Zadanie 8.100. Przypuśćmy, że K jest ciałem oraz $n \geq 1$. Udowodnij, że gdy macierz $A \in M_n(K)$ jest odwracalna, to macierz transponowana A^t jest również odwracalna oraz $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$. Sprawdź ponadto, że macierz

$$M = \begin{bmatrix} 1 & i \\ j & k \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{H})$$

jest odwracalna (oblicz M^{-1}), ale macierz M^t odwracalna nie jest. Wyznacz też rząd wierszowy/kolumnowy (tzn. liczbę liniowo niezależnych wierszy/kolumn) macierzy M .

Uwaga. Zastanów się które pojęcia i twierdzenia dla macierzy kwadratowych nad ciałem mają sens/dadzą się uogólnić na macierze nad ciałem nieprzemienne (np. \mathbb{H}).

Podręczniki, wykłady i zbiory zadań

Zbiory zadań zostały oznaczone kolorem [niebieskim](#).

Strony WWW zawierające wykłady/zadania zostały oznaczone kolorem [zielonym](#).

- [1] T. Andreescu, *Essential Linear Algebra with Applications. A Problem-Solving Approach*, Birkhäuser, 2014.
- [2] G. Banaszak, W. Gajda, *Elementy algebry liniowej: część I*, Wydawnictwo WNT, 2002.
- [3] A. Białynicki-Birula, *Algebra liniowa z geometrią*, Polskie Wydawnictwo Naukowe, 1976.
- [4] F. Broglia, E. Fortuna, D. Luminati, *Problemi Risolti di Algebra Lineare*, Zanichelli, 1995.
- [5] J. Chaber, R. Pol, *GAL*, 2015 ([online](#)).
- [6] K. Conrad, *Expository papers* ([online](#)).
- [7] H. Dym, *Linear Algebra in Action*, American Mathematical Society, 2014.
- [8] J. M. Erdman, *Exercises and Problems in Linear Algebra*, 2014 ([online](#)).
- [9] D. K. Faddeev, I. Sominsky, *Problems in Higher Algebra*, Mir Publishers, 1972.
- [10] J. Gancarzewicz, *Algebra liniowa i jej zastosowania* (wyd. 2), Wydawnictwo UJ, 2009.
- [11] J. S. Golan, *The Linear Algebra a Beginning Graduate Student Ought to Know* (3rd ed.), Springer, 2012.
- [12] P. R. Halmos, *Linear Algebra Problem Book*, Mathematical Association of America, 1995.
- [13] A. Herdegen, *Algebra liniowa i geometria* (wyd. 3 popr.), eigenspace.pl, 2018 ([online](#)).
- [14] T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, *Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania* (wyd. 21 zm.), Oficyna Wydawnicza GiS, 2017 (starsze wyd. [online](#)).
- [15] T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, *Algebra liniowa. Przykłady i zadania* (wyd. 7 popr.), Oficyna Wydawnicza GiS, 2017 (starsze wyd. [online](#)).
- [16] J. Komorowski, *Od liczb zespolonych do tensorów, spinorów, algebr Liego i kwadryk*, Polskie Wydawnictwo Naukowe, 1978.
- [17] T. Koźniewski, *Wykłady z algebry liniowej I* (wyd. 5), Wydawnictwo UW, 2012.
- [18] T. Koźniewski, *Wykłady z algebry liniowej II*, Wydawnictwo UW, 2012.
- [19] A. I. Kostrikin, *Zbiór zadań z algebry* (wyd. 3), Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
- [20] A. I. Kostrikin, Y. I. Manin, *Linear Algebra and Geometry*, Gordon and Breach Science Publishers, 1997.
- [21] C. Krattenthaler, *Advanced Determinant Calculus*, preprint (1999) ([online](#)).
- [22] A. Męcel, *Dla studentów* ([online](#)).
- [23] V. Prasolov, *Problems and Theorems in Linear Algebra*, American Mathematical Society, 1994 ([online](#)).
- [24] I. V. Proskuryakov, *Problems in Linear Algebra*, Mir Publishers, 1978.
- [25] S. Roman, *Advanced Linear Algebra* (3rd ed.), Springer, 2008.
- [26] J. Rutkowski, *Algebra liniowa w zadaniach*, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
- [27] A. Strojnowski, *Geometria z Algebrą Liniową* ([online](#)).
- [28] K. Szymiczek, *Referaty, prace, wykłady* ([online](#)).
- [29] A. Weber, *Dydaktyka* ([online](#)).
- [30] F. Zhang, *Linear Algebra. Challenging Problems for Students* (2nd ed.), Johns Hopkins Studies in the Mathematical Sciences, 1996.