

## RP WNE 2012/2013, XV seria zadań

1. Macierz przejścia jednorodnego łańcucha Markowa  $(X_n)_{n \geq 0}$  na przestrzeni  $E = \{1, 2, 3, 4\}$  dana jest następująco:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{2}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix}.$$

- Jakie jest prawdopodobieństwo dojścia w dwóch krokach ze stanu 1 do stanu 2? (tzn. policzyć  $p_{12}(2)$ ).
- Zakładając, że  $X_0 = 1$  p.n. obliczyć prawdopodobieństwo tego, że  $X_n$  będzie w stanie 2 przed stanem 4.
- Zakładając, że  $X_0 = 3$  p.n. obliczyć wartość oczekiwaną czasu dojścia do stanu 2.
- Wyznaczyć rozkład stacjonarny. Czy łańcuch jest okresowy? Czy jest nieprzywiedlny?
- Obliczyć przybliżone prawdopodobieństwo tego, że  $X_{10000} = 1$ .

2. Rzucamy kostką tak długo, aż pojawi się ciąg 16 lub 66. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ciąg 16 pojawi się wcześniej?

3. Po wierzchołkach pięciokąta ABCDE porusza się pionek. W chwili początkowej znajduje się w punkcie A, a w każdym kolejnym ruchu przesuwa się w sposób niezależny od poprzednich ruchów z prawdopodobieństwem  $1/2$  do jednego z sąsiednich wierzchołków. Obliczyć

- prawdopodobieństwo, że pionek powróci do punktu A przed dotarciem do punktu C,
- wartość oczekiwaną liczby ruchów, jakie wykona pionek przed powrotem do punktu A.

4. Rzucamy symetryczną monetą aż do momentu, gdy wyrzucimy serię 3 orłów. Obliczyć wartość oczekiwaną liczby przeprowadzonych rzutów.

### Przykładowe dalsze zadanie

1. Macierz przejścia jednorodnego łańcucha Markowa  $(X_n)_{n \geq 0}$  na przestrzeni  $E = \{1, 2, 3\}$  dana jest następująco:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Jakie jest prawdopodobieństwo, że startując ze stanu 2, po dwóch krokach łańcuch będzie znów w stanie 2?
- Zakładając, że  $X_0 = 1$  p.n. obliczyć prawdopodobieństwo, że łańcuch powróci do 1 przed dojściem do stanu 3.
- Zakładając, że  $X_0 = 3$  p.n. obliczyć wartość oczekiwaną czasu dojścia do stanu 1.
- Wyznaczyć rozkład stacjonarny. Czy łańcuch jest okresowy? Czy jest nieprzywiedlny?
- Obliczyć przybliżone prawdopodobieństwo, że  $X_{10000} = 1$ .