

Logika i teoria typów

Wykład 3

2 listopada 2020

Przypomnijmy, że:

- ▶ Formuła jest twierdzeniem intuicjonistycznym wtedy i tylko wtedy, gdy jest prawdziwa w każdej algebrze pseudoboole'owskiej (Heytinga);
- ▶ Rodzina zbiorów otwartych przestrzeni topologicznej tworzy algebrę Heytinga.

Przykład przestrzeni topologicznej

Niech $\langle A, \leq \rangle$ - częściowy porządek.

Zbiór $B \subseteq A$ jest otwarty, gdy z $a \geq b \in B$ wynika $a \in B$.

Na przykład $a \uparrow = \{b \mid a \leq b\}$.

Przykład przestrzeni topologicznej

Niech $\langle A, \leq \rangle$ - częściowy porządek.

Zbiór $B \subseteq A$ jest otwarty, gdy z $a \geq b \in B$ wynika $a \in B$.

Na przykład $a\uparrow = \{b \mid a \leq b\}$.

To jest przestrzeń topologiczna:

Zbiory \emptyset , A , suma i iloczyn otwartych są otwarte.

Przykład przestrzeni topologicznej

Niech $\langle A, \leq \rangle$ - częściowy porządek.

Zbiór $B \subseteq A$ jest otwarty, gdy z $a \geq b \in B$ wynika $a \in B$.

Na przykład $a\uparrow = \{b \mid a \leq b\}$.

To jest przestrzeń topologiczna:

Zbiory \emptyset , A , suma i iloczyn otwartych są otwarte.

Wnętrze: $\text{Int}(A) = \{a \mid a\uparrow \subseteq A\}$.

Przykład przestrzeni topologicznej

Niech $\langle A, \leq \rangle$ - częściowy porządek.

Zbiór $B \subseteq A$ jest otwarty, gdy z $a \geq b \in B$ wynika $a \in B$.

Na przykład $a\uparrow = \{b \mid a \leq b\}$.

To jest przestrzeń topologiczna:

Zbiory \emptyset , A , suma i iloczyn otwartych są otwarte.

Wnętrze: $\text{Int}(A) = \{a \mid a\uparrow \subseteq A\}$.

Pseudodopełnienie:

$$A \Rightarrow B = \text{Int}(-A \cup B) = \{a \mid a\uparrow \subseteq -A \cup B\} = \{a \mid A \cap a\uparrow \subseteq B\}$$

$$A \Rightarrow B = \{a \mid \forall x (a \leq x \in A \rightarrow x \in B)\}$$

Semantyka Kripkego

Semantyka Kripkego

Definicja: *Model Kripkego:* struktura $\mathcal{C} = \langle C, \leq, \Vdash \rangle$, gdzie:

- ▶ C jest zbiorem *stanów*;
- ▶ \leq jest częściowym porządkiem;
- ▶ $\Vdash \subseteq C \times \{p, q, r, \dots\}$;
- ▶ jeśli $c \Vdash p$ i $c \leq c'$, to $c' \Vdash p$.

Wymuszanie

Definicja: Rozszerzamy \Vdash na dowolne formuły:

- ▶ $c \Vdash \varphi \vee \psi \quad \equiv \quad c \Vdash \varphi \text{ lub } c \Vdash \psi;$
- ▶ $c \Vdash \varphi \wedge \psi \quad \equiv \quad c \Vdash \varphi \text{ i } c \Vdash \psi;$
- ▶ $c \Vdash \varphi \rightarrow \psi \quad \equiv \quad \text{jeśli } c \leq c' \Vdash \varphi, \text{ to } c' \Vdash \psi;$
- ▶ $c \not\Vdash \perp;$
- ▶ $c \Vdash \neg\varphi \quad \equiv \quad \text{jeśli } c \leq c', \text{ to } c' \not\Vdash \varphi.$

Wymuszanie


Definicja: Rozszerzamy \Vdash na dowolne formuły:

- ▶ $c \Vdash \varphi \vee \psi \quad \equiv \quad c \Vdash \varphi \text{ lub } c \Vdash \psi;$
- ▶ $c \Vdash \varphi \wedge \psi \quad \equiv \quad c \Vdash \varphi \text{ i } c \Vdash \psi;$
- ▶ $c \Vdash \varphi \rightarrow \psi \quad \equiv \quad \text{jeśli } c \leq c' \Vdash \varphi, \text{ to } c' \Vdash \psi;$
- ▶ $c \not\Vdash \perp;$
- ▶ $c \Vdash \neg\varphi \quad \equiv \quad \text{jeśli } c \leq c', \text{ to } c' \not\Vdash \varphi.$


Monotoniczność:

Jeśli $c \Vdash \varphi$ oraz $c \leq c'$, to $c' \Vdash \varphi$.

Przykład




Przykład



$$c \not\models p \vee \neg p$$


Przykład



$$c \not\models p \vee \neg p$$

$$c \models (p \rightarrow q) \rightarrow q,$$

Przykład



$$c \not\models p \vee \neg p$$

$$c \models (p \rightarrow q) \rightarrow q,$$

$$c \models \neg\neg(p \vee q)$$

Spełnianie w sensie Kripkego

- ▶ $\mathcal{C} \Vdash \varphi$, gdy $c \Vdash \varphi$, dla wszystkich $c \in \mathcal{C}$.
- ▶ $\mathcal{C} \Vdash \Gamma$, gdy $\mathcal{C} \Vdash \varphi$, dla wszystkich $\varphi \in \Gamma$.
- ▶ $\Gamma \Vdash \varphi$, gdy $\mathcal{C} \Vdash \Gamma$ zawsze pociąga $\mathcal{C} \Vdash \varphi$
- ▶ $\Vdash \varphi$, gdy $\mathcal{C} \Vdash \varphi$, dla wszystkich \mathcal{C} .

Poprawność

Fakt: *Jeśli $\Gamma \vdash \varphi$, to $\Gamma \Vdash \varphi$.*

Dowód: Indukcja ze względu na dowód $\Gamma \vdash \varphi$.

Np. jeśli $\Gamma \Vdash \alpha \vee \beta$ oraz $\Gamma, \alpha \Vdash \gamma$ i $\Gamma, \beta \Vdash \gamma$,
to łatwo widzieć, że $\Gamma \Vdash \gamma$.

Pozostałe przypadki też łatwe (ćwiczenia?).

Inaczej: Model Kripkego to w istocie pewna topologia.

Pełność w sensie Kripkego

Twierdzenie: $\Gamma \vdash \varphi$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\Gamma \Vdash \varphi$

Pełność w sensie Kripkego

Twierdzenie: $\Gamma \vdash \varphi$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\Gamma \Vdash \varphi$

Możliwy dowód: Pokazać, że $\Gamma \Vdash \varphi$ implikuje $\Gamma \vdash \varphi$
i skorzystać z pełności w sensie Heytinga.

Pełność w sensie Kripkego

Twierdzenie: $\Gamma \vdash \varphi$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\Gamma \Vdash \varphi$

Możliwy dowód: Pokazać, że $\Gamma \Vdash \varphi$ implikuje $\Gamma \vdash \varphi$ i skorzystać z pełności w sensie Heytinga.

W tym celu buduje się model Kripkego z *filtrów* danej algebry Heytinga.

Pełność w sensie Kripkego

Twierdzenie: $\Gamma \vdash \varphi$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\Gamma \Vdash \varphi$

Możliwy dowód: Pokazać, że $\Gamma \Vdash \varphi$ implikuje $\Gamma \vdash \varphi$ i skorzystać z pełności w sensie Heytinga.

W tym celu buduje się model Kripkego z *filtrów* danej algebry Heytinga.

Ale my to zrobimy inaczej. . .

Rachunek zdań jako gra (politycznie niepoprawna)

Rachunek zdań jako gra (politycznie niepoprawna)

Mamy dwoje graczy: \forall frodytę i \exists rosa. \exists ros próbuje skonstruować dowód, \forall frodyta szuka błędu.

Rachunek zdań jako gra (politycznie niepoprawna)

Mamy dwoje graczy: \forall frodytę i \exists rosa. \exists ros próbuje skonstruować dowód, \forall frodyta szuka błędu.

Przykład: $(p \rightarrow \neg q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg q$

Rachunek zdań jako gra (politycznie niepoprawna)

Mamy dwoje graczy: \forall frodytę i \exists rosa. \exists ros próbuje skonstruować dowód, \forall frodyta szuka błędu.

Przykład: $(p \rightarrow \neg q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg q$

Inaczej: $x : p \rightarrow \neg q, \quad y : \neg p \rightarrow \neg q, \quad z : q \quad \vdash \quad \perp$

Rachunek zdań jako gra (politycznie niepoprawna)

Mamy dwoje graczy: \forall frodytę i \exists rosa. \exists ros próbuje skonstruować dowód, \forall frodyta szuka błędu.

Przykład: $(p \rightarrow \neg q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg q$

Inaczej: $x : p \rightarrow \neg q, \quad y : \neg p \rightarrow \neg q, \quad z : q \quad \vdash \quad \perp$

Player (\exists): *I will prove \perp using assumption y !*

Rachunek zdań jako gra (politycznie niepoprawna)

Mamy dwoje graczy: \forall frodytę i \exists rosa. \exists ros próbuje skonstruować dowód, \forall frodyta szuka błędu.

Przykład: $(p \rightarrow \neg q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg q$

Inaczej: $x : p \rightarrow \neg q, \quad y : \neg p \rightarrow \neg q, \quad z : q \quad \vdash \quad \perp$

Player (\exists): *I will prove \perp using assumption y !*

Opponent (\forall): *Can you prove the 1st assumption $\neg p$ of y ?
That is, can you prove \perp using an assumption $v : p$?*

Rachunek zdań jako gra (politycznie niepoprawna)

Mamy dwoje graczy: \forall frodytę i \exists rosa. \exists ros próbuje skonstruować dowód, \forall frodyta szuka błędu.

Przykład: $(p \rightarrow \neg q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg q$

Inaczej: $x : p \rightarrow \neg q, \quad y : \neg p \rightarrow \neg q, \quad z : q \quad \vdash \quad \perp$

Player (\exists): *I will prove \perp using assumption y !*

Opponent (\forall): *Can you prove the 1st assumption $\neg p$ of y ?
That is, can you prove \perp using an assumption $v : p$?*

Player (\exists): *Yes, I will use assumption x !*

Rachunek zdań jako gra (politycznie niepoprawna)

Mamy dwoje graczy: \forall frodytę i \exists rosa. \exists ros próbuje skonstruować dowód, \forall frodyta szuka błędu.

Przykład: $(p \rightarrow \neg q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg q$

Inaczej: $x : p \rightarrow \neg q, \quad y : \neg p \rightarrow \neg q, \quad z : q \quad \vdash \quad \perp$

Player (\exists): *I will prove \perp using assumption y !*

Opponent (\forall): *Can you prove the 2nd assumption q of x ?*

Rachunek zdań jako gra (politycznie niepoprawna)

Mamy dwoje graczy: \forall frodytę i \exists rosa. \exists ros próbuje skonstruować dowód, \forall frodyta szuka błędu.

Przykład: $(p \rightarrow \neg q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg q$

Inaczej: $x : p \rightarrow \neg q, \quad y : \neg p \rightarrow \neg q, \quad z : q \quad \vdash \quad \perp$

Player (\exists): *I will prove \perp using assumption y !*

Opponent (\forall): *Can you prove the 2nd assumption q of x ?*

Player (\exists): *Sure, take z !*

Rachunek zdań jako gra (politycznie niepoprawna)

Mamy dwoje graczy: \forall frodytę i \exists rosa. \exists ros próbuje skonstruować dowód, \forall frodyta szuka błędu.

Przykład: $(p \rightarrow \neg q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg q$

Inaczej: $x : p \rightarrow \neg q, \quad y : \neg p \rightarrow \neg q, \quad z : q \quad \vdash \quad \perp$

Player (\exists): *I will prove \perp using assumption y !*

Opponent (\forall): *Can you prove the 1st assumption $\neg p$ of y ?
That is, can you prove \perp using an assumption $v : p$?*

Player (\exists): *Yes, I will use assumption x !*

Opponent (\forall): *Can you prove the 2nd assumption q of x ?*

Player (\exists): *Sure, take z !*

Proof = strategy = inhabitant: $\lambda xyz. y(\lambda v. xvz)z$

Inny przykład: $\neg\neg(p \vee \neg p)$

\exists : $\neg\neg(p \vee \neg p)$!

Inny przykład: $\neg\neg(p \vee \neg p)$

\exists : $\neg\neg(p \vee \neg p)$!

\forall : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp \vdash \perp$?

Inny przykład: $\neg\neg(p \vee \neg p)$

\exists : $\neg\neg(p \vee \neg p)$!

\forall : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp \vdash \perp$?

\exists : `apply` x !

Inny przykład: $\neg\neg(p \vee \neg p)$

\exists : $\neg\neg(p \vee \neg p)$!

\forall : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp \vdash \perp$?

\exists : `apply` x !

\forall : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp \vdash p \vee \neg p$?

Inny przykład: $\neg\neg(p \vee \neg p)$

\exists : $\neg\neg(p \vee \neg p)$!

\forall : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp \vdash \perp$?

\exists : `apply` x !

\forall : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp \vdash p \vee \neg p$?

\exists : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp \vdash \neg p$!

Inny przykład: $\neg\neg(p \vee \neg p)$

\exists : $\neg\neg(p \vee \neg p)$!

\forall : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp \vdash \perp$?

\exists : `apply` x !

\forall : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp \vdash p \vee \neg p$?

\exists : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp \vdash \neg p$!

\forall : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp, y : p \vdash \perp$?

Inny przykład: $\neg\neg(p \vee \neg p)$

\exists : $\neg\neg(p \vee \neg p)$!

\forall : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp \vdash \perp$?

\exists : `apply` x !

\forall : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp \vdash p \vee \neg p$?

\exists : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp \vdash \neg p$!

\forall : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp, y : p \vdash \perp$?

\exists : `apply` x !

Inny przykład: $\neg\neg(p \vee \neg p)$

\exists : $\neg\neg(p \vee \neg p)$!

\forall : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp \vdash \perp$?

\exists : `apply` x !

\forall : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp \vdash p \vee \neg p$?

\exists : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp \vdash \neg p$!

\forall : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp, y : p \vdash \perp$?

\exists : `apply` x !

\forall : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp, y : p \vdash p \vee \neg p$?!

Inny przykład: $\neg\neg(p \vee \neg p)$

\exists : $\neg\neg(p \vee \neg p)$!

\forall : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp \vdash \perp$?

\exists : `apply` x !

\forall : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp \vdash p \vee \neg p$?

\exists : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp \vdash \neg p$!

\forall : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp, y : p \vdash \perp$?

\exists : `apply` x !

\forall : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp, y : p \vdash p \vee \neg p$?!

\exists : $x : (p \vee \neg p) \rightarrow \perp, y : p \vdash p$!

Rachunek zdań jako gra

Rachunek zdań jako gra

Pozycja w grze to osąd $\Gamma \vdash \tau$. Jeśli $\tau = \alpha \vee \beta$, to α i β nazywamy *celami* w tej pozycji, w przeciwnym przypadku całe τ jest *celem*.

Rachunek zdań jako gra

Pozycja w grze to osąd $\Gamma \vdash \tau$. Jeśli $\tau = \alpha \vee \beta$, to α i β nazywamy *celami* w tej pozycji, w przeciwnym przypadku całe τ jest *celem*.

Mamy dwoje graczy: \forall frodytę i \exists rosa. \exists ros próbuje skonstruować dowód, \forall frodyta szuka błędu.

Rachunek zdań jako gra

Pozycja w grze to osąd $\Gamma \vdash \tau$. Jeśli $\tau = \alpha \vee \beta$, to α i β nazywamy *celami* w tej pozycji, w przeciwnym przypadku całe τ jest *celem*.

Mamy dwoje graczy: \forall frodytę i \exists rosa. \exists ros próbuje skonstruować dowód, \forall frodyta szuka błędu.

Każda runda gry to ruch \exists rosa i odpowiedź \forall frodyty. \exists ros wybiera (a) założenie $\alpha \in \Gamma$, lub (b) cel α w τ , po czym \forall frodyta ustala następną pozycję.

Rachunek zdań jako gra

Pozycja w grze to osąd $\Gamma \vdash \tau$. Jeśli $\tau = \alpha \vee \beta$, to α i β nazywamy *celami* w tej pozycji, w przeciwnym przypadku całe τ jest *celem*.

Mamy dwoje graczy: \forall frodytę i \exists rosa. \exists ros próbuje skonstruować dowód, \forall frodyta szuka błędu.

Każda runda gry to ruch \exists rosa i odpowiedź \forall frodyty. \exists ros wybiera (a) założenie $\alpha \in \Gamma$, lub (b) cel α w τ , po czym \forall frodyta ustala następną pozycję.

\exists ros wygrywa w *pozycji końcowej*: gdy $\perp \in \Gamma$, lub $\tau \in \Gamma$ (można żądać aby τ było atomem).

\forall frodyta wygrywa, jeśli rozgrywka jest *nieskończona*.

Reguły gry

- a1) If α is an assumption $\beta \rightarrow \gamma$ then \forall phrodite chooses between positions $\Gamma, \gamma \vdash \tau$ and $\Gamma \vdash \beta$.

Reguły gry

- a1) If α is an assumption $\beta \rightarrow \gamma$ then \forall phrodite chooses between positions $\Gamma, \gamma \vdash \tau$ and $\Gamma \vdash \beta$.
- a2) If α is an assumption $\beta \vee \gamma$ then \forall phrodite chooses between positions $\Gamma, \beta \vdash \tau$ and $\Gamma, \gamma \vdash \tau$.

Reguły gry

- a1) If α is an assumption $\beta \rightarrow \gamma$ then \forall phrodite chooses between positions $\Gamma, \gamma \vdash \tau$ and $\Gamma \vdash \beta$.
- a2) If α is an assumption $\beta \vee \gamma$ then \forall phrodite chooses between positions $\Gamma, \beta \vdash \tau$ and $\Gamma, \gamma \vdash \tau$.
- a3) If α is an assumption $\beta \wedge \gamma$ then \forall phrodite has no choice and the next position is $\Gamma, \beta, \gamma \vdash \tau$.

Reguły gry

- a1) If α is an assumption $\beta \rightarrow \gamma$ then \forall phrodite chooses between positions $\Gamma, \gamma \vdash \tau$ and $\Gamma \vdash \beta$.
- a2) If α is an assumption $\beta \vee \gamma$ then \forall phrodite chooses between positions $\Gamma, \beta \vdash \tau$ and $\Gamma, \gamma \vdash \tau$.
- a3) If α is an assumption $\beta \wedge \gamma$ then \forall phrodite has no choice and the next position is $\Gamma, \beta, \gamma \vdash \tau$.
- b1) If α is a goal $\beta \rightarrow \gamma$ then \forall phrodite has no choice and the next position is $\Gamma, \beta \vdash \gamma$.

Reguły gry

- a1) If α is an assumption $\beta \rightarrow \gamma$ then \forall phrodite chooses between positions $\Gamma, \gamma \vdash \tau$ and $\Gamma \vdash \beta$.
- a2) If α is an assumption $\beta \vee \gamma$ then \forall phrodite chooses between positions $\Gamma, \beta \vdash \tau$ and $\Gamma, \gamma \vdash \tau$.
- a3) If α is an assumption $\beta \wedge \gamma$ then \forall phrodite has no choice and the next position is $\Gamma, \beta, \gamma \vdash \tau$.
- b1) If α is a goal $\beta \rightarrow \gamma$ then \forall phrodite has no choice and the next position is $\Gamma, \beta \vdash \gamma$.
- b2) If α is a goal $\beta \wedge \gamma$ then \forall phrodite chooses between positions $\Gamma \vdash \beta$ and $\Gamma \vdash \gamma$.

Reguły gry

- a1) If α is an assumption $\beta \rightarrow \gamma$ then \forall phrodite chooses between positions $\Gamma, \gamma \vdash \tau$ and $\Gamma \vdash \beta$.
- a2) If α is an assumption $\beta \vee \gamma$ then \forall phrodite chooses between positions $\Gamma, \beta \vdash \tau$ and $\Gamma, \gamma \vdash \tau$.
- a3) If α is an assumption $\beta \wedge \gamma$ then \forall phrodite has no choice and the next position is $\Gamma, \beta, \gamma \vdash \tau$.
- b1) If α is a goal $\beta \rightarrow \gamma$ then \forall phrodite has no choice and the next position is $\Gamma, \beta \vdash \gamma$.
- b2) If α is a goal $\beta \wedge \gamma$ then \forall phrodite chooses between positions $\Gamma \vdash \beta$ and $\Gamma \vdash \gamma$.
- b3) If α is an atom or a disjunction goal then \forall phrodite has no choice and the next position is $\Gamma \vdash \alpha$.

Strategia \exists rosa to dowód

W pozycji $\Gamma \vdash \tau$:

- ▶ wybór założenia $\alpha \in \Gamma$ to wybór dowodu przez eliminację typu zmiennej $x : \alpha$.
- ▶ wybór celu α w τ , to wybór dowodu przez wprowadzenie (konstrukcję) α .

Strategia \exists rosa to dowód

Indukcja ze względu na rozmiary strategii \exists rosa:

Strategia \exists rosa to dowód

Indukcja ze względu na rozmiary strategii \exists rosa:

Pozycje końcowe:

- ▶ $\Gamma, x : \tau \vdash x : \tau$;
- ▶ $\Gamma, x : \perp \vdash \varepsilon_\tau(x) : \tau$;

Strategia \exists rosa to dowód

Indukcja ze względu na rozmiary strategii \exists rosa.

\exists ros wybiera założenie $(x : \alpha) \in \Gamma$:

- a1) If α is an assumption $\beta \rightarrow \gamma$ then \forall phrodite chooses between positions $\Gamma, \gamma \vdash \tau$ and $\Gamma \vdash \beta$.

Strategia \exists rosa to dowód

Indukcja ze względu na rozmiary strategii \exists rosa.

\exists ros wybiera założenie $(x : \alpha) \in \Gamma$:

a1) If α is an assumption $\beta \rightarrow \gamma$ then \forall phrodite chooses between positions $\Gamma, \gamma \vdash \tau$ and $\Gamma \vdash \beta$.

Jeśli \exists ros wygrywa w obu pozycjach $\Gamma, \gamma \vdash \tau$ i $\Gamma \vdash \beta$, to są termy $\Gamma, y : \gamma \vdash M : \tau$ oraz $\Gamma \vdash N : \beta$.

Strategia \exists rosa to dowód

Indukcja ze względu na rozmiary strategii \exists rosa.

\exists ros wybiera założenie $(x : \alpha) \in \Gamma$:

a1) If α is an assumption $\beta \rightarrow \gamma$ then \forall phrodite chooses between positions $\Gamma, \gamma \vdash \tau$ and $\Gamma \vdash \beta$.

Jeśli \exists ros wygrywa w obu pozycjach $\Gamma, \gamma \vdash \tau$ i $\Gamma \vdash \beta$, to są termny $\Gamma, y : \gamma \vdash M : \tau$ oraz $\Gamma \vdash N : \beta$.

Wtedy $\Gamma \vdash M[y := x^{\beta \rightarrow \gamma} N] : \tau$.

Strategia \exists rosa to dowód

Indukcja ze względu na rozmiary strategii \exists rosa:

\exists ros wybiera założenie $(x : \alpha) \in \Gamma$:

a2) If α is an assumption $\beta \vee \gamma$ then \forall phrodite chooses between positions $\Gamma, \beta \vdash \tau$ and $\Gamma, \gamma \vdash \tau$.

Strategia \exists rosa to dowód

Indukcja ze względu na rozmiary strategii \exists rosa:

\exists ros wybiera założenie $(x : \alpha) \in \Gamma$:

a2) If α is an assumption $\beta \vee \gamma$ then \forall phrodite chooses between positions $\Gamma, \beta \vdash \tau$ and $\Gamma, \gamma \vdash \tau$.

Jeśli \exists ros wygrywa w obu pozycjach $\Gamma, \beta \vdash \tau$ i $\Gamma, \gamma \vdash \tau$, to są termy $\Gamma, y : \beta \vdash M : \tau$ oraz $\Gamma, z : \gamma \vdash N : \tau$

Wtedy $\Gamma \vdash \text{case } x^{\beta \vee \gamma} \text{ of } [y] M \text{ or } [z] N : \tau$.

Strategia \exists rosa to dowód

Indukcja ze względu na rozmiary strategii \exists rosa.

\exists ros wybiera założenie $(x : \alpha) \in \Gamma$:

- a3) If α is an assumption $\beta \wedge \gamma$ then \forall phrodite has no choice and the next position is $\Gamma, \beta, \gamma \vdash \tau$.

Strategia \exists rosa to dowód

Indukcja ze względu na rozmiary strategii \exists rosa.

\exists ros wybiera założenie $(x : \alpha) \in \Gamma$:

a3) If α is an assumption $\beta \wedge \gamma$ then \forall phrodite has no choice and the next position is $\Gamma, \beta, \gamma \vdash \tau$.

Jeśli $\Gamma, y : \beta, z : \gamma \vdash M : \tau$, to

$$\Gamma \vdash M[y := x^{\beta \wedge \gamma} \{1\}][z := x^{\beta \wedge \gamma} \{2\}] : \tau.$$

Strategia \exists rosa to dowód

Indukcja ze względu na rozmiary strategii \exists rosa.

\exists ros chooses a goal α in position $\Gamma \vdash \alpha \vee \rho$:

b1) If α is a goal $\beta \rightarrow \gamma$ then \forall phrodite has no choice and the next position is $\Gamma, \beta \vdash \gamma$.

Strategia \exists rosa to dowód

Indukcja ze względu na rozmiary strategii \exists rosa.

\exists ros chooses a goal α in position $\Gamma \vdash \alpha \vee \rho$:

b1) If α is a goal $\beta \rightarrow \gamma$ then \forall phrodite has no choice and the next position is $\Gamma, \beta \vdash \gamma$.

Przypuśćmy że $\Gamma, y : \beta \vdash M : \gamma$. Wtedy $\Gamma \vdash \lambda x : \beta. M^y : \alpha$.

Jeśli $\tau = \alpha \vee \rho$, to $\Gamma \vdash \text{in}_1(\lambda x : \beta. M) : \tau$.

Strategia \exists rosa to dowód

Indukcja ze względu na rozmiary strategii \exists rosa.

\exists ros chooses a goal α in position $\Gamma \vdash \alpha \vee \rho$:

b2) If α is a goal $\beta \wedge \gamma$ then \forall phrodite chooses between positions $\Gamma \vdash \beta$ and $\Gamma \vdash \gamma$.

Strategia \exists rosa to dowód

Indukcja ze względu na rozmiary strategii \exists rosa.

\exists ros chooses a goal α in position $\Gamma \vdash \alpha \vee \rho$:

b2) If α is a goal $\beta \wedge \gamma$ then \forall phrodite chooses between positions $\Gamma \vdash \beta$ and $\Gamma \vdash \gamma$.

Jeśli $\Gamma \vdash M : \beta$ oraz $\Gamma \vdash N : \gamma$, to $\Gamma \vdash \langle M, N \rangle : \alpha$.

Dla $\tau = \alpha \vee \rho$ mamy $\Gamma \vdash \text{in}_1(\langle M, N \rangle) : \tau$.

Strategia \exists rosa to dowód

Indukcja ze względu na rozmiary strategii \exists rosa.

\exists ros chooses a goal α in position $\Gamma \vdash \alpha \vee \rho$:

- b3) If α is an atom or a disjunction then \forall phrodite has no choice and the next position is $\Gamma \vdash \alpha$.

Strategia \exists rosa to dowód

Indukcja ze względu na rozmiary strategii \exists rosa.

\exists ros chooses a goal α in position $\Gamma \vdash \alpha \vee \rho$:

b3) If α is an atom or a disjunction then \forall phrodite has no choice and the next position is $\Gamma \vdash \alpha$.

Jeśli $\Gamma \vdash M : \alpha$ oraz $\tau = \alpha \vee \rho$, to $\Gamma \vdash \text{in}_1(M) : \tau$.

A jeśli \exists ros nie ma strategii?

Co to znaczy, że \exists ros ma strategię w pozycji \mathcal{P} ?

A jeśli \exists ros nie ma strategii?

Co to znaczy, że \exists ros ma strategię w pozycji \mathcal{P} ?

- ▶ Pozycja \mathcal{P} jest końcowa, **lub istnieje** taki ruch \exists rosa, że **każda** odpowiedź \forall frodyty prowadzi do pozycji, w której \exists ros ma strategię.

A jeśli \exists ros nie ma strategii?

Co to znaczy, że \exists ros ma strategię w pozycji \mathcal{P} ?

- ▶ Pozycja \mathcal{P} jest końcowa, **lub istnieje** taki ruch \exists rosa, że **każda** odpowiedź \forall frodyty prowadzi do pozycji, w której \exists ros ma strategię.

Co to znaczy, że \exists ros nie ma strategii w pozycji \mathcal{P} ?

A jeśli \exists ros nie ma strategii?

Co to znaczy, że \exists ros ma strategię w pozycji \mathcal{P} ?

- ▶ Pozycja \mathcal{P} jest końcowa, **lub istnieje** taki ruch \exists rosa, że **każda** odpowiedź \forall frodyty prowadzi do pozycji, w której \exists ros ma strategię.

Co to znaczy, że \exists ros nie ma strategii w pozycji \mathcal{P} ?

- ▶ Pozycja \mathcal{P} nie jest końcowa, **oraz dla każdego** ruchu \exists rosa, **istnieje** odpowiedź \forall frodyty, która prowadzi do pozycji, gdzie \exists ros nie ma strategii.

A jeśli \exists ros nie ma strategii?

Co to znaczy, że \exists ros ma strategię w pozycji \mathcal{P} ?

- ▶ Pozycja \mathcal{P} jest końcowa, **lub istnieje** taki ruch \exists rosa, że **każda** odpowiedź \forall frodyty prowadzi do pozycji, w której \exists ros ma strategię.

Co to znaczy, że \exists ros nie ma strategii w pozycji \mathcal{P} ?

- ▶ Pozycja \mathcal{P} nie jest końcowa, **oraz dla każdego** ruchu \exists rosa, **istnieje** odpowiedź \forall frodyty, która prowadzi do pozycji, gdzie \exists ros nie ma strategii.

To znaczy, że \forall frodyta umie grać nieskończenie długo. Czyli to ona ma strategię. Ta gra jest *zdeteminowana*.

Strategia \forall frodyty, czyli *refutacja*

Strategia \forall frodyty, to drzewo S etykietowane pozycjami niekończącymi, spełniające taki warunek:

- ▶ Dla każdego ruchu \exists rosa w dowolnym wierzchołku \mathcal{P} , istnieje odpowiedź \forall frodyty, prowadząca do pewnego następnika wierzchołka \mathcal{P} w drzewie S .

Dygresja: własność skończonej strategii

Strategia \forall frodyty jest nieskończonym drzewem zbudowanym ze skończenie wielu różnych pozycji. Na każdej gałęzi pozycje się od pewnego miejsca powtarzają. Po pierwszym takim powtórzeniu sędziego powinien przerwać grę.

Zatem strategia (refutacja) to w istocie skończony obiekt.

Strategia \forall frodyty: notacja

Niech S będzie strategią wygrywającą \forall frodyty.

- ▶ Jeśli $\mathcal{P} = (\Gamma \vdash \tau)$, to $\Gamma_{\mathcal{P}} = \Gamma$ i $\tau_{\mathcal{P}} = \tau$.
- ▶ Jeśli pozycja \mathcal{P}' jest w S następnikiem pozycji \mathcal{P} , to piszemy $S : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}'$.

Strategia \forall frodyty to kontrmodel Kripkego

Strategia \forall frodyty to kontrmodel Kripkego

Pierwsze kody za pŁoty:

- Stany modelu to pozycje w strategii;
- porzadek to \rightarrow ;
- wymuszanie $\mathcal{P} \Vdash p$, gdy $p \in \Gamma_P$;
- chcemy $\mathcal{P} \Vdash \alpha$, gdy $\alpha \in \Gamma_P$.

Strategia \forall frodyty to kontrmodel Kripkego

Pierwsze kody za pŁoty:

- Stany modelu to pozycje w strategii;
- porzadek to \rightarrow ;
- wymuszanie $\mathcal{P} \Vdash p$, gdy $p \in \Gamma_P$;
- chcemy $\mathcal{P} \Vdash \alpha$, gdy $\alpha \in \Gamma_P$.

Tak jest niedobrze: Niech $\mathcal{P} = (p \rightarrow q, p \vdash r)$.
Wtedy $\mathcal{P} \not\Vdash p \rightarrow q$, bo $\mathcal{P} \Vdash p$, ale $\mathcal{P} \not\Vdash q$.

Strategia \forall frodyty to kontrmodel Kripkego

Pierwsze kody za pŁoty:

- Stany modelu to pozycje w strategii;
- porzadek to \rightarrow ;
- wymuszanie $\mathcal{P} \Vdash p$, gdy $p \in \Gamma_P$;
- chcemy $\mathcal{P} \Vdash \alpha$, gdy $\alpha \in \Gamma_P$.

Tak jest niedobrze: Niech $\mathcal{P} = (p \rightarrow q, p \vdash r)$.

Wtedy $\mathcal{P} \not\Vdash p \rightarrow q$, bo $\mathcal{P} \Vdash p$, ale $\mathcal{P} \not\Vdash q$.

Dopiero w następnjej pozycji $\mathcal{P}' = (p \rightarrow q, p, q \vdash r)$ mamy $\mathcal{P}' \Vdash p \rightarrow q$.

Pozycja nasycona

Pozycja \mathcal{P} jest *nasycona*, gdy każda runda „statyczna” (bez zmiany tezy) jest trywialna (nie wprowadza nowych założeń).

Lemat: *W strategii wygrywającej \forall frodyty, dla dowolnej pozycji \mathcal{P} istnieje taka nasycona pozycja \mathcal{Q} , że $\mathcal{P} \rightarrow_s \mathcal{Q}$ i $\tau_{\mathcal{Q}} = \tau_{\mathcal{P}}$.*

Dowód: Strategia przewiduje wszystkie ruchy \exists rosa. Jest ścieżka, gdzie każda runda jest statyczna. Dodawanie nowych założeń musi się skończyć.

Model

- ▶ Stany modelu to pozycje nasycone w strategii.
- ▶ Porządek to \rightarrow .
- ▶ Wymuszanie $\mathcal{P} \Vdash p$, gdy $p \in \Gamma_p$.

Model

- ▶ Stany modelu to pozycje nasycone w strategii.
- ▶ Porządek to \rightarrow .
- ▶ Wymuszanie $\mathcal{P} \Vdash p$, gdy $p \in \Gamma_P$.

Lemat: *Let $\mathcal{P} = (\Gamma \vdash \tau)$ be a saturated position
in a winning strategy S .*

*If α is an assumption in \mathcal{P} then $\mathcal{P} \Vdash \alpha$,
and if α is a goal in \mathcal{P} , then $\mathcal{P} \nVdash \alpha$.*

Dowód: Indukcja ze względu na α .

Dowód lematu

Lemat: *Jeśli \mathcal{P} nasycona, to $\mathcal{P} \Vdash \Gamma_{\mathcal{P}}$ i $\mathcal{P} \not\Vdash \tau_{\mathcal{P}}$*

Dowód: Przypadek założenia $\alpha = \beta \rightarrow \gamma$.

Dowód lematu

Lemat: *Jeśli \mathcal{P} nasycona, to $\mathcal{P} \Vdash \Gamma_{\mathcal{P}}$ i $\mathcal{P} \not\Vdash \tau_{\mathcal{P}}$*

Dowód: Przypadek założenia $\alpha = \beta \rightarrow \gamma$.

Niech $\mathcal{P} \leq \mathcal{Q}$ i $\mathcal{Q} \Vdash \beta$. Formuła α jest założeniem w \mathcal{Q} , więc \exists ros może wskazać α w pozycji \mathcal{Q} . Jeśli \forall frodyta odpowie $\Gamma_{\mathcal{Q}} \vdash \beta$, to istnieje taka nasycona pozycja $\mathcal{R} \geq \mathcal{Q}$, że $\tau_{\mathcal{R}} = \tau_{\mathcal{Q}} = \beta$. Wtedy $\mathcal{R} \not\Vdash \beta$ z założenia indukcyjnego o β oraz $\mathcal{R} \Vdash \beta$, ponieważ $\mathcal{Q} \leq \mathcal{R}$. Sprzeczność.

Dowód lematu

Lemat: Jeśli \mathcal{P} nasycona, to $\mathcal{P} \Vdash \Gamma_{\mathcal{P}}$ i $\mathcal{P} \nVdash \tau_{\mathcal{P}}$

Dowód: Przypadek założenia $\alpha = \beta \rightarrow \gamma$.

Niech $\mathcal{P} \leq \mathcal{Q}$ i $\mathcal{Q} \Vdash \beta$. Formuła α jest założeniem w \mathcal{Q} , więc \exists ros może wskazać α w pozycji \mathcal{Q} . Jeśli \forall frodyta odpowie $\Gamma_{\mathcal{Q}} \vdash \beta$, to istnieje taka nasycona pozycja $\mathcal{R} \geq \mathcal{Q}$, że $\tau_{\mathcal{R}} = \tau_{\mathcal{Q}} = \beta$. Wtedy $\mathcal{R} \nVdash \beta$ z założenia indukcyjnego o β oraz $\mathcal{R} \Vdash \beta$, ponieważ $\mathcal{Q} \leq \mathcal{R}$. Sprzeczność.

Zatem \forall frodyta musi przejść do $\Gamma_{\mathcal{Q}}, \gamma \vdash \tau_{\mathcal{P}}$.

To jest runda statyczna, a \mathcal{Q} jest nasycona, więc $\gamma \in \Gamma_{\mathcal{Q}}$.

Zatem $\mathcal{Q} \Vdash \gamma$ z założenia indukcyjnego o γ .

Dowód lematu

Lemat: *Jeśli \mathcal{P} nasycona, to $\mathcal{P} \Vdash \Gamma_{\mathcal{P}}$ i $\mathcal{P} \not\Vdash \tau_{\mathcal{P}}$*

Dowód: Przypadek celu postaci $\beta \wedge \gamma$. Wtedy jedna z pozycji $\Gamma \vdash \beta$, $\Gamma \vdash \gamma$ należy do strategii i rozszerza się do nasyconej pozycji \mathcal{R} , gdzie $\tau_{\mathcal{R}} = \beta$ (lub odpowiednio $\tau_{\mathcal{R}} = \gamma$).

Z założenia indukcyjnego $\mathcal{R} \not\Vdash \beta$ lub $\mathcal{R} \not\Vdash \gamma$.

Ponieważ $\mathcal{P} \leq \mathcal{R}$, więc tym bardziej $\mathcal{P} \not\Vdash \beta$ lub $\mathcal{P} \not\Vdash \gamma$.

Dowód lematu

Lemat: Jeśli \mathcal{P} nasycona, to $\mathcal{P} \Vdash \Gamma_{\mathcal{P}}$ i $\mathcal{P} \not\Vdash \tau_{\mathcal{P}}$

Dowód: Przypadek celu postaci $\beta \wedge \gamma$. Wtedy jedna z pozycji $\Gamma \vdash \beta$, $\Gamma \vdash \gamma$ należy do strategii i rozszerza się do nasyconej pozycji \mathcal{R} , gdzie $\tau_{\mathcal{R}} = \beta$ (lub odpowiednio $\tau_{\mathcal{R}} = \gamma$).

Z założenia indukcyjnego $\mathcal{R} \not\Vdash \beta$ lub $\mathcal{R} \not\Vdash \gamma$.

Ponieważ $\mathcal{P} \leq \mathcal{R}$, więc tym bardziej $\mathcal{P} \not\Vdash \beta$ lub $\mathcal{P} \not\Vdash \gamma$.

Przypadek celu atomowego p : pozycja należy do strategii wygrywającej \forall frodyty, więc $p \notin \Gamma_{\mathcal{P}}$.

Dowód lematu

Lemat: Jeśli \mathcal{P} nasycona, to $\mathcal{P} \Vdash \Gamma_{\mathcal{P}}$ i $\mathcal{P} \not\Vdash \tau_{\mathcal{P}}$

Dowód: Przypadek celu postaci $\beta \wedge \gamma$. Wtedy jedna z pozycji $\Gamma \vdash \beta$, $\Gamma \vdash \gamma$ należy do strategii i rozszerza się do nasyconej pozycji \mathcal{R} , gdzie $\tau_{\mathcal{R}} = \beta$ (lub odpowiednio $\tau_{\mathcal{R}} = \gamma$).

Z założenia indukcyjnego $\mathcal{R} \not\Vdash \beta$ lub $\mathcal{R} \not\Vdash \gamma$.

Ponieważ $\mathcal{P} \leq \mathcal{R}$, więc tym bardziej $\mathcal{P} \not\Vdash \beta$ lub $\mathcal{P} \not\Vdash \gamma$.

Przypadek celu atomowego p : pozycja należy do strategii wygrywającej \forall frodyty, więc $p \notin \Gamma_{\mathcal{P}}$.

Inne przypadki podobnie.

Główny lemat

Lemat: *Jeśli \forall frodyta ma strategię w pozycji $\mathcal{P} = (\Gamma_{\mathcal{P}} \vdash \tau_{\mathcal{P}})$,
to $\Gamma_{\mathcal{P}} \not\vdash \tau_{\mathcal{P}}$.*

Dowód: Istnieje pozycja nasycona $\mathcal{Q} \geq \mathcal{P}$.

Główny lemat

Lemat: *Jeśli \forall frodyta ma strategię w pozycji $\mathcal{P} = (\Gamma_{\mathcal{P}} \vdash \tau_{\mathcal{P}})$, to $\Gamma_{\mathcal{P}} \not\vdash \tau_{\mathcal{P}}$.*

Dowód: Istnieje pozycja nasycona $\mathcal{Q} \geq \mathcal{P}$.

Uwaga:

I na odwrót: kontrmodel wyznacza pewną strategię \forall frodyty.

Pełność Kripkego

Twierdzenie: Dla dowolnego osądu $\Gamma \vdash \tau$:

- albo istnieje dowód $\Gamma \vdash M : \tau$,
- albo istnieje kontrmodel, tj. $\Gamma \not\vdash \tau$.

Wniosek: Jeśli $\Gamma \Vdash \tau$, to $\Gamma \vdash \tau$.

Własność skończonego modelu

Twierdzenie:

Jeśli $\mathcal{C} \models \varphi$ dla wszystkich skończonych modeli \mathcal{C} , to $\models \varphi$.

Dowód: Model otrzymany ze strategii \forall frrodyty jest nieskończony, ale od pewnego miejsca stany się powtarzają. Można obcinać nieskończone gałęzie po pierwszych powtórzeniach.

Twierdzenie Gliwienki

Twierdzenie:

Formuła zdaniowa α jest klasyczną tautologią wtedy i tylko wtedy, gdy $\neg\neg\alpha$ jest twierdzeniem intuicjonistycznym.

Twierdzenie Gliwienki

Twierdzenie:

Formuła zdaniowa α jest klasyczną tautologią wtedy i tylko wtedy, gdy $\neg\neg\alpha$ jest twierdzeniem intuicjonistycznym.

Dowód: (\Leftarrow) Oczywiste.

Twierdzenie Gliwienki

Twierdzenie:

Formuła zdaniowa α jest klasyczną tautologią wtedy i tylko wtedy, gdy $\neg\neg\alpha$ jest twierdzeniem intuicjonistycznym.

Dowód: (\Leftarrow) Oczywiste.

(\Rightarrow) Wtedy α jest wymuszona w każdym stanie końcowym.

Prawo alternatywy (disjunction property)

Twierdzenie: *Jeśli $\vdash \alpha \vee \beta$, to $\vdash \alpha$ lub $\vdash \beta$.*

Prawo alternatywy (disjunction property)

Twierdzenie: *Jeśli $\vdash \alpha \vee \beta$, to $\vdash \alpha$ lub $\vdash \beta$.*

Dowód: Przypuśćmy, że $\not\vdash \alpha$ i $\not\vdash \beta$.

Wtedy są kontrprzykłady Kripkego: $\mathcal{C}_1, c_1 \not\vdash \alpha$ i $\mathcal{C}_2, c_2 \not\vdash \beta$.

Prawo alternatywy (disjunction property)

Twierdzenie: *Jeśli $\vdash \alpha \vee \beta$, to $\vdash \alpha$ lub $\vdash \beta$.*

Dowód: Przypuśćmy, że $\not\vdash \alpha$ i $\not\vdash \beta$.

Wtedy są kontrprzykłady Kripkego: $\mathcal{C}_1, c_1 \not\vdash \alpha$ i $\mathcal{C}_2, c_2 \not\vdash \beta$.

Nowy model: $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2 \cup \{c_0\}$, gdzie c_0 nowy i najmniejszy.

Relacja \Vdash jest sumą relacji z \mathcal{C}_1 i \mathcal{C}_2 . W stanie c_0 nie są wymuszane żadne zmienne zdaniowe.

Prawo alternatywy (disjunction property)

Twierdzenie: *Jeśli $\vdash \alpha \vee \beta$, to $\vdash \alpha$ lub $\vdash \beta$.*

Dowód: Przypuśćmy, że $\not\vdash \alpha$ i $\not\vdash \beta$.

Wtedy są kontrprzykłady Kripkego: $\mathcal{C}_1, c_1 \not\vdash \alpha$ i $\mathcal{C}_2, c_2 \not\vdash \beta$.

Nowy model: $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2 \cup \{c_0\}$, gdzie c_0 nowy i najmniejszy.

Relacja \Vdash jest sumą relacji z \mathcal{C}_1 i \mathcal{C}_2 . W stanie c_0 nie są wymuszane żadne zmienne zdaniowe.

Jeśli $\vdash \alpha \vee \beta$, to także $c_0 \Vdash \alpha \vee \beta$, skąd $c_0 \Vdash \alpha$ lub $c_0 \Vdash \beta$.

Ale wtedy także $c_1 \Vdash \alpha$ lub $c_2 \Vdash \beta$.

Własność podformuł dla gier

Lemat: *Wszystkie formuły używane w grze rozpoczętej w pozycji początkowej $\emptyset \vdash \tau$ są podformułami formuły τ .*

W szczególności spójniki logiczne występujące w takiej grze to są tylko te spójniki, które są w τ .

Dowód: Indukcja.

Konserwatywność

Wniosek: *Jeśli \exists ros ma strategię w pozycji $\emptyset \vdash \tau$, gdzie τ jest formułą implikacyjną (typem prostym), to τ ma inhabitanta w zwykłym rachunku lambda.*

Konserwatywność

Wniosek: *Jeśli \exists ros ma strategię w pozycji $\emptyset \vdash \tau$, gdzie τ jest formułą implikacyjną (typem prostym), to τ ma inhabitanta w zwykłym rachunku lambda.*

Dowód: Wszystkie formuły są implikacyjne, więc każda runda ma postać (a1) lub (b1). Term, który opisuje strategię \exists rosa zawiera więc tylko abstrakcje i aplikacje.

Konserwatywność

Wniosek: *Jeśli \exists ros ma strategię w pozycji $\emptyset \vdash \tau$, gdzie τ jest formułą implikacyjną (typem prostym), to τ ma inhabitanta w zwykłym rachunku lambda.*

Dowód: Wszystkie formuły są implikacyjne, więc każda runda ma postać (a1) lub (b1). Term, który opisuje strategię \exists rosa zawiera więc tylko abstrakcje i aplikacje.

Wniosek: *Typ prosty jest niepusty wtedy i tylko wtedy, gdy jest tautologią intuicjonistyczną.*

Jakie termy są strategiami \exists rosa?

Jakie termy są strategiami \exists rosa?

W przypadku implikacyjnym możliwe strategie są takie:

- ▶ zmienne;
- ▶ $M[y := xN]$, gdzie M, N – strategie;
- ▶ $\lambda x : \beta. M$, gdzie M – strategia.

To są dokładnie postaci normalne beta:

- ▶ Abstrakcje: $\lambda x : \beta. M$;
- ▶ Eliminatory: $xN_1 \dots N_k$.

Typ eliminatora jest “końcówką” typu zmiennej czołowej.

Pełność i „normalizacja” w jednym

Twierdzenie: Dla dowolnego osądu $\Gamma \vdash \tau$:

- albo istnieje *normalny* inhabitant $\Gamma \vdash M : \tau$,
- albo istnieje kontrmodel, tj. $\Gamma \not\vdash \tau$.

Wniosek: Jeśli osąd ma dowód, to ma dowód normalny.

Inaczej:

Jeśli jakkolwiek term M ma typ τ w otoczeniu Γ ,
to istnieje term tego typu w postaci normalnej.

Postaci normalne (fragment implikacyjny)

Konstruktory: $\lambda x : \alpha. N$

Dobre eliminatory: $xN_1 \dots N_k$

Poszukiwanie dowodu normalnego:

To prove τ , use an assumption with suffix τ .

Otherwise proof is a constructor.

Algorytm Ben-Yellesa

Algorytm Ben-Yellesa

To answer $\Gamma \vdash ? : \alpha$, apply one of the following tactics:

Algorytm Ben-Yellesa

To answer $\Gamma \vdash ? : \alpha$, apply one of the following tactics:

- ▶ For $\alpha = \beta \rightarrow \gamma$, ask $\Gamma \cup \{x : \beta\} \vdash ? : \gamma$ (fresh x).

(Solution $M = \lambda x:\beta. N^\gamma$.)

Algorytm Ben-Yellea

To answer $\Gamma \vdash ? : \alpha$, apply one of the following tactics:

- ▶ For $\alpha = \beta \rightarrow \gamma$, ask $\Gamma \cup \{x : \beta\} \vdash ? : \gamma$ (fresh x).

(Solution $M = \lambda x:\beta. N^\gamma$.)

- ▶ Find $x : \beta_1 \rightarrow \dots \rightarrow \beta_k \rightarrow \alpha$ in Γ ,
then ask $\Gamma \vdash ? : \beta_i$, for all i . Success if $k = 0$.

(Solution $M = xN_1^{\beta_1} \dots N_k^{\beta_k}$.)

W drugim przypadku można żądać aby α była zmienną.